

Scolytidae

Taphrorychus bicolor (HBST.): 1 spécimen femelle sur grumes de *Fagus sylvatica* à Izel (Prov. Luxembourg), le 18.III.1990.

3. M. F. CHÉROT présente les communications suivantes.

Notices hémiptérologiques. IV.

**Pentatomoidea (Hemiptera Heteroptera) intéressants
pour la faune belge**

par Frédéric CHÉROT

Avenue de la Forêt 23 bte 3, B-1050 Bruxelles, Belgique.

En identifiant les collections de messieurs DELEDICQUE (coll. D.) et ROUARD (coll. R.), j'eus la chance de trouver certaines espèces intéressantes pour notre faune. Il s'agit de:

Coptosoma scutellatum GEOFFROY, 1762 (Platapsidae): 2 ex. (coll. D.), Couvin (FR 14, MOMT), le 15.VIII.1979.

On connaissait cette espèce auparavant de Torgny (BOSMANS, 1975) (4 données dont 3 antérieures à 1950) et récemment, de Treignes, de Han-Sur-Lesse (PETIT, 1989) (2 données, début des années 70), de Frasnes, Grandcourt, Ruelle et Herbeumont (BOSMANS et MERCKEN, 1989) (4 données, milieu des années 70).

Au vu de ce qui précède, l'espèce paraît en expansion. Elle resterait néanmoins limitée au sud de notre pays.

Aethus flavicornis (FABRICIUS, 1794) (Cydnidae): 6 ex. (coll. D. et R.), Westhoek, La Panne (DS 76, MOMK), 9 et 20.VI.1983.

Cette espèce n'avait été découverte en Belgique que 2 fois depuis 1950 et une seule fois durant la première moitié du siècle. Elle l'avait toujours été à la côte.

Il ne s'agirait en fait pas d'une espèce uniquement côtière mais bien d'un *Aethus* typique des milieux sablonneux. En effet, WAGNER (1955, 1966) l'a quasi systématiquement pris sur ce type de sol, en France et en Allemagne.

Pour les Pays-Bas, AUKÉMA (1989) cite plus de 20 localités concernant cet hémiptère, dont certaines dans le Limbourg néerlandais. Il ne semble donc pas exclu que l'on découvre prochainement cet insecte dans le nord-est de notre pays.

Sehirus luctosus (MULSANT & REY, 1886) (Cydnidae): 3 ex. (coll. D. et R.), Westhoek, La Panne, 9 et 20.VI.1983.

Sehirus biguttatus (LINNÉ, 1758): 1 ex. (coll. D.), Torgny (FQ 78, MOMU), le 16.VI.1976.

Odontoscelis lineola RAMBUR, 1839 (= *dorsalis* F.) (Scutelleridae): 3 ex. (coll.

R.), Westhoek, La Panne, le 20.VI.1983.

Tout comme *A. flavicornis*, *O. lineola* est, en Belgique, uniquement connu de notre côte mais semble plus généralement spécifique des terrains sablonneux.

Remerciements

Je remercie messieurs DELEDICQUE et ROUARD qui ont bien voulu me remettre leur collection pour mon travail de cartographie.

Références

- AUKÉMA, B., 1989. - Annotated checklist of Hemiptera-Heteroptera of the Netherlands. *Tijdschr. Ent.*, 132: 1-104.
 BOSMANS, R., 1975. - Voorkomen van de Belgische wantsen. I. *Biol. Jb. Dodo-naea*, 43: 78-87.
 BOSMANS, R. & MERCKEN, L., 1989. - Research on Belgian Heteroptera: a review. *Comptes rendus du Symposium "Invertébrés de Belgique"*: 279-285.
 PETIT, J., 1989. - Notes faunistiques et éthologiques sur les Hémiptères Hétéroptères de la Belgique et des régions limitrophes (Hemiptera Heteroptera) I. *Lambillionea*, LXXXIX, 3-4: 28-35.
 WAGNER, E., 1955. - Contribution à la faune des Hémiptères Hétéroptères de France. *Vie et Milieu*, 6 fasc. 2: 248-283.
 WAGNER, E., 1966. - Wanzen oder Heteroptera. I. In: *Die tierwelt Deutschlands*, 54. Fischer Verlag, Iéna.

Notices hémiptérologiques. V.

**Sur la présence de
Calocoris (Lophyromiris) sexguttatus (Fabricius, 1776)
dans la faune de Belgique (Hemiptera, Heteroptera, Miridae)**

par Frédéric CHÉROT

Avenue de la Forêt 23 bte 3, B-1050 Bruxelles, Belgique.

Ce *Calocoris* serait selon EHANNO (1987) "un miride distribué dans l'Europe centrale et septentrionale, lié aux milieux en altitude" se trouvant principalement sur la strate herbacée de biotopes hygrophiles ou méso-hygrophiles.

En France, il est surtout connu de la moitié est, étant cité des Vosges, du Jura, des Alpes et du Massif Central.

L'espèce semble inconnue de Hollande (AUKÉMA, 1989) et de Grande-Bretagne (KLOET & HINCKS, 1964) mais fut capturée en Allemagne (WAGNER & WEBER, 1964) et en Suède (OSSIANNILSSON, 1947).

La seconde espèce du sous-genre, *C. (L.) stysi* WAGNER, 1968 [= *sexnotatus* (TURTON, 1806)] n'est encore connue que de Normandie, de Bretagne, d'Angleterre et d'Espagne.

On devrait s'attendre à découvrir plutôt *C. (L.) stysi* W. que *C. (L.) sexguttatus* (F.) dans notre pays, *C. (L.) stysi* n'étant pas localisé dans les régions montagneuses. C'est à tel point vrai qu'EHANNO (1987) doute de la validité d'anciennes citations de *C. (L.) sexguttatus* du nord de la France, les deux espèces ayant longtemps été confondues.

Or *C. (L.) sexguttatus* n'est pas rare en Belgique. Les données suivantes se rapportent à cette espèce: BRABANT: Overijse (FS 02, MOMQ), 8.VI.1978 (coll. DELEDICQUE); HAINAUT: Enghien (ES 71, MOMO), 8.VIII.1987 (coll. BOOSTEN); Ronquières -bord du vieux canal- (ES 80, MOMO), 2.VII.1988 (coll. pers.); NAMUR: Blaimont (FR 36, MOMT), 8.VIII.1986 (coll. Univ. de Liège); St-Martin (FR 19, MOMT), 25.VI.1943 (coll. de Gembloux). De plus ce Mirini se trouve dans les collections de l'I.R.Sc.N.B.

On peut conclure de toutes ces captures que l'espèce est bien présente dans notre pays et ce malgré l'absence de citations dans les listes anciennes. Elle est donc présente dans l'étage collinéen (le point le plus élevé de la Belgique n'atteignant même pas la limite -800 m- de l'étage montagnard).

Remerciements

Je remercie messieurs BOOSTEN, DELEDICQUE, MAGIS (Univ. de Liège) et VERSTRAETEN (Gembloux) de m'avoir confié leur matériel et de m'avoir autorisé à citer leurs données.

Références

- AUKÉMA, B., 1989. - Annotated checklist of Hemiptera-Heteroptera of the Netherlands. *Tijdschr. Ent.*, 132: 1-104.
- EHANNO, B., 1987. - Les Hétéroptères Mirides de France. Tome II.B. Inventaire biogéographique et atlas. *Inventaire de Faune et de Flore*. Fasc. 42. Secrétariat de la Faune et de la Flore, pp. 649-1076.
- KLOET, G. S. & HINKS, D., 1964. - *A checklist of British Insects*. Part I: Small orders and Hemiptera. Handbooks for the identification of British Insects. Vol. 11. Part I.. Royal Ent. Soc. of London, 118 pp.
- OSSIANNILSSON, F., 1947. - *Catalogus Insectorum Sueciae*. VII. Hemiptera-Heteroptera. *Opusc. Entomol.*, XII, H.1-3: 1-33.
- WAGNER, E. & WEBER, H. H., 1964. - Hétéroptères Miridae. *Faune Fr.*, 67: 1-591.

4. Monsieur N. MAGIS présente la communication suivante.

Additions et compléments à l'inventaire des Hyménoptères Symphytes du département de l'Ardèche (France)

par Noël MAGIS

Université de Liège, Laboratoire de Morphologie, Systématique et Ecologie animales, 22 quai Ed. Van Beneden, B - 4020 Liège.

Introduction

On doit au docteur Hubert CLEU (1953) une étude intéressante sur le peuplement entomologique de l'Ardèche. Parmi les différents groupes d'insectes envisagés, figure une liste commentée des 92 espèces de mouches à scie observées. Ce matériel a été réétudié dernièrement par CHEVIN (1989), qui a incorporé à cette révision une série d'observations récentes et inédites, qui portent à 137 le nombre des taxons reconnus dans ce département.

En 1986 et 1987, mon collègue R. WAHIS a séjourné au Dausseron, hameau de Saint-Thomé et m'a fait l'amabilité de me soumettre ses récoltes, parmi lesquelles figuraient des espèces non encore signalées de l'Ardèche. J'y joins d'autres données originales provenant des collections de la Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux.

Le Dausseron (abrégié en Da dans le texte) appartient à la basse région calcaire et, à une altitude de 140 m, s'inscrit dans l'étage de la garrigue. Les récoltes de R. WAHIS ont été faites complémentaiement au filet (F.), à l'aide d'un piège Malaise (P.M.) et au moyen de plateaux colorés de teinte jaune (B.J.), posés à même le sol.

Dans la liste suivante, chaque taxon déjà reconnu porte le numéro qui est le sien dans l'inventaire de CHEVIN (loc. cit.), tandis que les espèces inédites sont précédées du signe *.

Relevé des espèces

CEPHIDAE

8. *Calameuta filiformis* (EVERSMANN, 1847): Da: 1 m. 1 f., 1 juin 1986, F.; 1 f., 3 juin 1986, P.M.; 4 m. 1 f., entre le 8 et le 11 juin 1986, P.M. - Col de l'Escrinet, 787 m: 1 m., 28 juin 1986 (J. LECLERCQ).

12. *Cephus pygmaeus* (LINNÉ, 1767): Da: 1 m. 3 f., 1 juin 1986, F.; 2 m., 1 au 3 juin 1986, P.M.; 1 f., 1 au 12 juin 1986, B.J.