

réalité d'un exemplaire de l'espèce citée par le FHL sous le nom de *Lithocharis ochraceus* (GRAVENHORST, 1802). Il proposa donc de rebaptiser celle-ci : *Lithocharis tricolor* (FABRICIUS, 1787). Quant au véritable *Xantholinus tricolor*, sensu auctorum nec FABRICIUS, son interprétation n'ayant cessé de varier au cours de son histoire, il fut impossible à DRUGMAND, d'en découvrir un exemplaire valablement décrit et qui ne donne prise à aucune contestation. Il ne restait qu'une solution : redécrire l'espèce comme *sp.n.*, ce qu'il fit sous le nom de *Xantholinus meyeri*, hommage au Directeur du Musée d'Histoire Naturelle de Luxembourg qui était à l'origine de la révision. (*Bull. Soc. ent. France*, 99 (3), 1994 : 241-252).

La procédure étant parfaitement correcte et légitime, ce changement de noms aurait dû être admis comme le précédent. Or, en 1998, aussi bien dans le 4ème Supplément du FHL que dans le nouveau "Verzeichnis der Käfer Deutschlands", les deux espèces s'appellent toujours : *Lithocharis ochraceus* (GRAV.) et *Xantholinus tricolor* (F.)

Et ceci ne concerne pas que les "petits" pays : la publication de Didier DRUGMAND a paru dans la plus importante des revues entomologiques de France !

En dépit de toute l'estime et de la considération que nous avons pour eux et pour la qualité exceptionnelle de leur travail, c'est ce type de comportement que nous ne pouvons accepter de la part de nos collègues allemands.

Nous espérons qu'ils auront l'élégance de le comprendre et voudront bien entamer, à ce sujet, l'effort de réflexion nécessaire. L'Europe unie, c'est sur tous les plans qu'il faut la faire !

Hubert BRUGE

Récoltes intéressantes de coléoptères dans la région de Torgny

par Maurice DELWAIDE


rue des Augustins 16, B-4000 Liège.

Depuis 1990, je récolte des coléoptères dans la région de Torgny. J'entends par "région de Torgny", un cercle de 20 kms de rayon avec le village de Torgny pour centre.

Dans ce périmètre, j'identifie trois types de biotopes prospectés.

- Les forêts de Virton, Ethe jusqu'à Chatillon (faisant partie de la forêt gauloise), à prédominance de feuillus et de sol sablonneux, dans lesquelles se trouvent de petits vallons humides de très grande richesse biologique, ainsi que des sablières.
- Les pelouses calcaires, qui se situent sur les cuestas de la Lorraine. En Lorraine belge, ce biotope ne se trouve plus guère, à ma connaissance, qu'à Torgny (réserve naturelle R. MAYNÉ). De l'autre côté de la Chiers, en France, les sites de ce type sont encore assez fréquents ("La Ramonette" à Velosnes-Othe; "Le Mont" à Villécloye; "La côte Saint-Germain" à Murvaux).
- La plaine de la Woëvre, qui s'étend entre les côtes de Meuse et de Moselle en Lorraine française. Il s'agit d'un biotope à sol argileux imperméable, où se rencontrent de nombreux rus, mares, étangs et deux rivières, affluents de la Chiers, l'Othain et le Loison. Elle comprend aussi de grandes forêts humides (forêts de Woëvre, de Merles,...).

Comme l'intitulé l'indique, la liste qui suit n'est nullement exhaustive. Elle reprend des récoltes considérées comme intéressantes, avec des commentaires sur les circonstances des captures.



Zone 1 : partie de la forêt gaumaise; zone 2 : pelouses calcaires; zone 3 : forêt de Merles.

Caraboidea

- Calosoma inquisitor* LINNÉ : Merles s/Loison (19.V.1997). Un mâle occupé à descendre le tronc d'un gros chêne sis dans un pré bordant la forêt.
- Carabus convexus* FABRICIUS : Velosnes (26.V.1991, 02.V.1993, 17.V.1994). Toujours sous des pierres, sur les terrains secs de la troisième cuesta.
- Cychrus attenuatus* FABRICIUS : Buzenol (06.IV.1997). En forêt de feuillus, sous une pierre.
- Cychrus caraboides* LINNÉ : Buzenol (31.III.1997). Dans la forêt d'épicéas conduisant au Laclaireau. Sous l'écorce d'une souche.

- Leistus rufescens* FABRICIUS : Bazeilles s/Othain (23.VI.1996, 28.VI.1996). Les 2 individus récoltés ont été piégés au bac jaune, dans une zone marécageuse bordant l'Othain.
- Notiophilus aquaticus* LINNÉ : Villécloye (09.III.1997, 31.III.1997). Trouvés dans un champ cultivé, au-dessus de la pelouse calcaire de Villécloye.
- Brosicus cephalotes* LINNÉ : Buzenol (02.X.1994). Trouvé dans une ancienne carrière sablonneuse où il avait creusé un terrier très profond.
- Cicindela silvicola* LATREILLE : Velosnes (1 couple le 15.V.1991 et une femelle le 02.VI.1991). Une petite colonie, que j'évalue à une trentaine d'individus, stationnait sur le talus bordant le versant sud de la réserve naturelle de la Ramonette. Seul un individu (femelle) était encore présent quinze jours plus tard. Je n'ai jamais revu l'espèce à cet endroit depuis.
- Agonum viridicupreum* GOEZE : Othe (2 individus le 16.III.1997). Sous des pierres dans une prairie descendant vers l'Othain.
- Harpalus dimidiatus* ROSSI : Othe (3 individus le 16.III.1997). Sous des pierres dans une prairie descendant vers l'Othain.
- Chlaeniellus nigricornis* FABRICIUS : Meix-devant-Virton (18.V.1995, 16.VII.1995); Bazeilles s/Othain (21.VII.1996); Lissey (3 individus le 08.VI.1996). Toujours en milieux très humides au bord des rivières, rus ou étangs.
- Odacantha melanura* LINNÉ : Bazeilles s/Othain (08.VI.1996, 06.VII.1996). Il circule près de l'eau à l'extrême limite des berges de l'Othain dans les zones à typha.
- Lamprias chlorocephalus* HOFFMANN : Laclaireau (29.VI.1997); Meix-devant-Virton (06.VII.1997). Sur les plantes basses en milieux humides.
- Demetrius monostigma* SAMOUELLE : Marville (06.VII.1996); Merles s/Loison (18.V.1997, 08.VI.1997). L'exemplaire récolté à Marville a été pris au filet troubleau parmi les plantes bordant le plan d'eau alors que les individus récoltés à Merles ont été pris au filet fauchoir dans les allées herbeuses traversant la forêt.
- Philorhizus quadrinotatus* PANZER : Velosnes (27.IV.1991); Villécloye (18.V.1997). L'exemplaire récolté à Velosnes courait sur un tas de troncs de pins abattus. L'individu trouvé à Villécloye a été pris en battant les branches d'un pin.
- Drypta dentata* ROSSI : Grand-Failly (24.III.1996); Romagne sous les Côtes (24.III.1996). L'individu récolté à Romagne circulait dans les galeries (creusées par d'autres insectes) de l'écorce très épaisse et humide d'un pin abattu depuis plusieurs années. Le second, à Grand-Failly, se trouvait sous des branches coupées, à proximité de l'Othain, en compagnie de *Panagaeus crux-major*.
- Brachinus crepitans* LINNÉ : Velosnes (19.V.1991, 19.IX.1993, 15.V.1994). Toujours sous des pierres, sur les terrains secs de la troisième cuesta.
- Brachinus expلودens* DUFTSCHMIDT : Velosnes (19.V.1991, 19.IX.1993); sous des pierres, sur les terrains secs de la troisième cuesta. Othe (04.VIII.1996, 9 individus le 16.III.1997); sous des pierres, dans une prairie descendant vers l'Othain.

Hygrobioidea

Hygrobia tarda HERBST. : Merles s/Loison (1 individu le 25.V.1997, 2 individus le 1.VI.1997, 4 individus le 21.IX.1997). Capturés dans l'eau, au filet troubleau, dans les bordures vaseuses des mares.

Dytiscoidea

Ilybius ater DE GEER : Merles s/Loison (1 individu le 19.V.1997, 2 individus le 25.V.1997, 2 individus le 02.VI.1997). Capturés au filet troubleau, dans l'eau des mares.

Colymbetes fuscus LINNÉ : Merles s/Loison (3 individus le 14.IX.1997, 2 individus le 21.IX.1997). Pris au filet troubleau dans l'eau des mares.

Hydaticus seminiger DE GEER : Merles s/Loison (19.V.1997, 21.IX.1997). Pris au filet troubleau dans l'eau des mares.

Hydaticus transversalis PONTOPPIDAN : Merles s/Loison (2 individus le 14.IX.1997, 1 individu le 21 septembre 1997). Pris au filet troubleau dans l'eau des mares.

Acilius canaliculatus NICOLAI : Merles s/Loison (4 individus : 3 femelles et 1 mâle le 14.IX.1997, 3 individus : 1 femelle et 2 mâles le 21.IX.1997). Trouvés au filet troubleau dans l'eau des mares.

Acilius sulcatus LINNÉ : Merles s/Loison (2 femelles le 19.V.1997, 5 individus : 3 femelles et 2 mâles le 14.IX.1997). Très commun. Pris au filet troubleau dans l'eau des mares.

Dytiscus dimidiatus BERGSTRÄESSER : Merles s/Loison (3 individus : 1 femelle et 2 mâles le 14.IX.1997, 1 mâle le 21.IX.1997). Pris au filet troubleau dans l'eau des mares.

Dytiscus marginalis LINNÉ : Merles s/Loison (1 mâle le 25.V.1997, 1 mâle le 01.VI.1997, 7 individus : 4 mâles, 3 femelles le 14.IX.1997). Pris au filet troubleau dans l'eau des mares. Très commun.

Dytiscus semisulcatus MÜLLER : Merles s/Loison (1 mâle le 14.IX.1997, 1 mâle le 21 septembre 1997). Pris au filet troubleau dans l'eau d'une mare.

Cybister lateralimarginalis DE GEER : Merles s/Loison (1 femelle le 14.IX.1997). Pris au filet troubleau dans l'eau d'une mare.

Gyrinoidea

Aulonogyrus concinnus KLUG : Bazeilles s/Othain. L'insecte est commun par places sur l'Othain dans les anses calmes et couvertes de végétation aquatique de la rivière. On le trouve alors en groupes compacts. Ainsi, le 21.VII.1996, j'ai dénombré 30 individus en un seul coup de filet troubleau.

Hydrophilidae

Hydrophilus caraboides LINNÉ : Merles s/Loison (1 individu le 19.V.1997, 5 individus le 14.IX.1997). Trouvés au filet troubleau dans l'eau des mares.

Très commun à la surface de l'eau nageant au milieu de la végétation aquatique.

Hydrous piceus LINNÉ : Merles s/Loison (1 mâle le 21.IX.1997). Trouvé au filet troubleau dans l'eau d'une grande mare.

Scarabaeoidea

Trox perlatus GEOFFROY : Murvaux (2 individus le 23.IV.1995, 11 individus le 30.IV.1995).

Trouvés sur la côte-Saint-Germain à Murvaux sur ce qui m'a paru être des excréments de renard.

Le 23.IV, les excréments étaient frais, et il n'y avait que deux individus en compagnie d'*Aphodius*, *Onthophagus*, *Hister* et *Ontholestes*. Une semaine plus tard, il ne restait que des poils sur lesquels de nombreux *Trox* étaient attablés.

Amphimallon ater HERBST. : Villécloye (29.VI.1997). Trouvé un mâle mort sur la pelouse calcaire.

Hoplia argenta PODA : Velosnes (23.VI.1991, 31.V.1993); Bazeilles s/Othain (25.VI.1994, 08.VI.1996, 16.VI.1996). Commun les journées chaudes de fin de printemps et de début d'été sur les fleurs (rosiers sauvages, ombellifères, tilleuls,...).

Gnorimus nobilis LINNÉ : Meix-devant-Virton (16.VII.1995); Laclaireau (29.VI.1997, 06.VII.1997). Une femelle à Meix sur une reine des prés, deux autres sur des ombellifères à Laclaireau. L'espèce semble affectionner les milieux humides et sauvages (où l'on trouve également *Cetonia aurata* et *Oxythyrea funesta*).

Cerambycidae

Rhagium sycophanta SCHRANK : Merles s/Loison (02.VI.1997). Femelle trouvée sur un gros tronc de chêne fraîchement abattu dans la forêt.

Anoplodera sexguttata FABRICIUS : Merles s/Loison (25.V.1997, 01.VI.1997, 08.VI.1997); Meix-devant-Virton (22.VI.1997) et Laclaireau (06.VII.1997). Commun l'année 1997 sur les fleurs, surtout dans la forêt de Merles.

Anastrangalia dubia (SCOPOLI) (Belg. sp. n.) : Bazeilles s/Othain (21.VII.1996); Meix-devant-Virton (01.VI.1998). Trouvé une femelle (forme totalement mélanique) sur une fleur de jonc le long de l'Othain. Une autre femelle à Meix sur des fleurs de viorne. Cette espèce n'est pas renseignée par MUYLAERT (1990) dans sa faune des Cérambycides. Il s'agirait donc d'une espèce nouvelle pour la faune belge.

Leptura aurulenta FABRICIUS : Merles s/Loison (06.VII.1997). Trouvé un mâle sur les feuilles d'un noisetier dans la forêt.

Cerambyx scopoli FUESSLER : Bazeilles s/Othain (16.VI.1996); Merles s/Loison (25.V.1997).

L'individu récolté à Bazeilles a été trouvé sur une ombellifère le long de l'Othain en pleine journée. L'individu trouvé à Merles se trouvait, en fin de journée, dans la forêt sur un tas de bûches.

- Rusticochlytus rusticus* LINNÉ : Merles s/Loison (4 individus le 08.VI.1997). L'espèce court agilement et très vite sur les tas de bûches de peuplier fraîchement coupées.
- Plagionotus detritus* LINNÉ : Merles s/Loison (1 couple le 06.VI.1998). Trouvé dans la forêt entre les cannelures de l'écorce d'un gros chêne abattu.
- Anaglyptus mysticus* LINNÉ : Torgny (1 individu le 24.V.1991); Velosnes (1 individu le 26.V.1992). L'individu trouvé à Torgny s'est posé sur ma veste alors que j'étais attablé dans un jardin. L'exemplaire trouvé à Velosnes était posé sur des feuilles de noisetier.
- Agapanthia violacea* FABRICIUS : Villécloye (1 individu le 28.VI.1996). Récolté au filet fauchoir dans une pelouse laissée à l'abandon.
- Lamia textor* Linné : LISSEY (1 individu le 08.VI.1996). Trouvé marchant au sol à proximité de l'Etang de la Reine en pleine journée.
- Eupogonocherus hispidus* LINNÉ : Damvillers (22.VI.1997). Récolté par battage des branches d'un vieux pommier.
- Eupogonocherus hispidulus* PILLER : Laclaireau (2 individus le 06.VII.1997). Trouvé sur des troncs de feuillus entreposés.
- Exocentrus lusitanus* LINNÉ : Merles s/Loison (06.VII.1997). Trouvé accroché à l'extrémité d'une herbe dans la forêt.
- Saperda scalaris* LINNÉ : Merles s/Loison (25.V.1997, 08.VI.1997). Dans la forêt, sur troncs et bûches de feuillus fraîchement coupés.
- Compsidia populnea* LINNÉ : Meix-devant-Virton (7 individus le 16.VI.1996). Sur branches et feuilles de très jeunes trembles.
- Oberea oculata* LINNÉ : Meix-devant-Virton (2 individus le 16.VII.1995). Le premier individu a été récolté sur les tiges d'un saule, le second sur des fleurs de reine des prés.

Malacodermoidea

- Phosphaenus hemipterus* GEOFFROY : Villécloye (1 individu mâle le 23.VI.1996). Capturé au filet fauchoir dans la pelouse calcaire.

Meloidea

- Meloe brevicollis* PANZER : Velosnes (2 individus le 19.IX.1993). Trouvés dans un champ cultivé enclavé dans la pelouse calcaire de "La Ramonette".
- Meloe proscarabaeus* LINNÉ : Velosnes (2 mâles le 11.IV.1992); Chatillon (1 femelle le 26.IV.1992); Velosnes (1 femelle le 14.III.1993). Commun au premier printemps, dans les pelouses calcaires, marchant au sol.

Cleroidea

- Trichodes atvearius* FABRICIUS : Merles s/Loison (1 individu le 24.V.1997). Trouvé par M. SEGHERS dans le bois de Merles.
- Trichodes apiarius* LINNÉ : Bazeilles s/Othain (1 individu le 16.VI.1996). Trouvé sur une ombelle au bord de l'Othain, un jour de beau temps.

Dascillidae

- Dascillus cervinus* LINNÉ : Villécloye (23.VI.1996, 28.VI.1996). Très commun dans la pelouse calcaire de Villécloye. Mis en évidence par battage des arbres et fauchage de la pelouse, au début de l'été 1996.

Eucnemidae

- Melasis buprestoides* LINNÉ : Merles s/Loison (1 individu le 19.V.1997). Trouvé circulant rapidement sur un vieux piquet de clôture en bois.

Elateridae

- Selatosomus bipustulatus* LINNÉ : Merles s/Loison (1 individu le 25.V.1997; 1 individu le 02.VI.1997; 1 individu le 08.VI.1997). Les deux premiers individus ont été récoltés par fauchage d'une allée herbeuse traversant le bois de Merles. Le troisième a été pris à vue sur une bûche.

Buprestidae

- Agrilus biguttatus* FABRICIUS : Merles s/Loison (3 individus le 09.VIII.1997). Trouvés dans le bois de Merles sur des troncs de chênes abattus.
- Agrilus cyanescens* RATZ. : Merles s/Loison (1 couple le 08.VI.1997). Trouvés dans le bois de Merles sur des feuilles de rejets de souche de peupliers.
- Agrilus guerini* LACORDAIRE : Meix-devant-Virton (1 individu le 22.VI.1997). Trouvé en milieu humide, sur une feuille de saule marsault le long d'un ru, lors d'une brève éclaircie un jour pluvieux.
- Agrilus roberti* CHEVROLAT : Merles s/Loison (2 individus le 08.VI.1997; 3 individus le 06.VII.1997). Trouvés dans le bois de Merles sur des feuilles de rejets de souches de peupliers.

Bostrychidae

- Bostrychus capucinus* LINNÉ : Merles s/Loison (3 individus le 25.V.1997; 1 individu le 08.VI.1997). Trouvés dans le bois de Merles circulant sur des troncs de chênes fraîchement abattus.

Chrysomelidae

- Plateumaris sericea* LINNÉ : Commun au printemps sur les plantes aquatiques croissant au bord des mares, des étangs et de l'Othain (Merles s/Loison le 08.VI.1997, Lissey le 23.V.1995, Bazeilles le 23.V.1995).
- Donaciella cinerea* HERBST : Commun le printemps au bord des mares de Merles s/Loison (18.V.1997), et à l'Etang de la Reine à Lissey (28.V.1995).
- Donacia aquatica* LINNÉ : Commun au printemps au bord des mares à Merles (18.V.1997), et le long de l'Othain à Bazeilles (23.V.1995).

- Donacia bicolor* ZSCHACH : Très commun sur typha dans l'Othain à Bazeilles (23.VI.1996). Présent également à Merles (11.V.1997) en bord de mares.
- Donacia impressa* PAYKULL : Trouvé 1 individu le 23.V.1995 à Bazeilles le long de l'Othain.
- Donacia marginata* HOPPE : Merles s/Loison. Commun du printemps jusqu'à fin septembre à Merles (13.V, 19.V et 14.IX.1997) sur les plantes aquatiques en bord de mares.
- Donacia semicuprea* PANZER : Très commun au bord de l'Othain, et au bord des mares à Merles. Printemps et début de l'été.
- Donacia simplex* FABRICIUS : Très commun au printemps et en été au bord de l'Othain (Bazeilles, 29.V.1994 et 23.VI.1996), et au bord des mares à Merles.
- Donacia vulgaris* ZSCHACH : Merles s/Loison (2 individus le 18.V.1997; 1 individu le 19.V.1997). Espèce présente sur les plantes aquatiques en bord de mares.
- Cryptocephalus biguttatus* SCOPOLI : Villécloye (1 individu le 23.VI.1996). Sur des graminées dans la pelouse calcaire.
- Cryptocephalus sexpunctatus* LINNÉ : Velosnes (1 individu le 19.V.1991). Trouvé sur une feuille de noisetier.
- Phyllobrotica quadrimaculata* LINNÉ : Meix-devant-Virton (1 individu le 16.VII.1995). Trouvé sur plantes en zone très humide le long d'un ru.
- Hispella atra* LINNÉ : Bazeilles s/Othain (1 individu le 04.VIII.1996). Trouvé à terre dans une prairie à proximité de l'Othain.
- Galerucella nymphaeae* LINNÉ : Bazeille s/Othain. Très commun sur les nénuphars recouvrant par endroit l'Othain.

Curculionidae

- Byctiscus populi* LINNÉ : Merles s/Loison (1 mâle le 08.VI.1997). Laclaireau (1 femelle le 06.VII.1997). Trouvés sur des feuilles de jeunes trembles.
- Cleonus piger* SCOPOLI : Commun à la fin du printemps sur les cirses, aussi bien en milieu humide (Lissey) que pelouse calcaire (Velosnes).
- Lepyryus capucinus* SCHALLER : Chatillon (1 individu le 26.IV.1992). Trouvé marchant au sol en zone sablonneuse et humide.
- Plinthus caliginosus* FABRICIUS : Othe (1 individu le 26.V.1991). Trouvé au sol sur le talus bordant le versant sud de la réserve naturelle de la Ramonette.
- Anthonomus varians* PAYKULL : Villécloye, le 31.III.1997. Nombreux exemplaires par battage des branches des pins croissant sur la pelouse calcaire.
- Brachonyx pineti* PAYKULL : Villécloye, le 31.III.1997. Nombreux exemplaires par battage des branches des pins croissant sur la pelouse calcaire.
- Cionus olens* FABRICIUS : Othe (2 individus le 23.VI.1991). Trouvés sur les plantes du talus bordant le versant sud de la réserve naturelle de la Ramonette.
- Cionus scrophulariae* LINNÉ : Bazeilles s/Othain (2 individus prélevés le 23.V.1995). De nombreux individus stationnaient sur une plante (sans doute

une scrophulaire) croissant en zone humide le long de l'Othain. J'en ai prélevé deux exemplaires.

Scolytidae

- Platypus cylindrus* FABRICIUS : Merles s/Loison (2 individus le 09.IX.1997). Trouvés sur des troncs de chênes abattus, occupés à creuser leur galerie.

Conclusions

Quatre-vingt huit espèces sont citées. Parmi celles-ci, une est nouvelle pour la faune belge (*Anastrangalia dubia* SCOPOLI). Quelques autres, trouvées en France à quelques kilomètres de la frontière, sont rares ou non encore citées de Belgique : *Cicindela silvicola* LATREILLE; *Drypta dentata* ROSSI; *Trox perlatius* GEOFFROY; *Rusticoclytus rusticus* LINNÉ; *Exocentrus lusitanus* LINNÉ; *Plagionotus detritus* LINNÉ. Un certain nombre d'entre elles pourraient à mon avis être recherchées avec succès dans la forêt gaumaise ou le long de certaines rivières de Lorraine belge (Ton, Vire, Chevratte).

Bibliographie

- COULON, G., 1995. - *Enumeratio Coleopterorum Belgicae* 1. Ed. Société royale belge d'Entomologie, 63 pp.
- FRENNET, L., 1920. - Note sur les coléoptères de la région jurassique belge. *Bull. Soc. ent. Belg.* 2 (4-5) : 47-50.
- FREUDE, H., HARDE, K.W. & LOHSE, G.A., 1989. - Die Käfer Mitteleuropas, Ed. Goecke et Kevers, Krefeld.
- MAYNE, R., 1958. - Coléoptères et hémiptères des Réserves naturelles de Torgny. *Parcs natn.*, 13 (3) 115-117.
- MUYLAERT, A., 1990. - Longicornes (Cerambycidae). *Faune Belg.*, 1990 : 139 pp.