

LES TROIS MYRMÉLÉONIDES DE LA FAUNE BELGE

par J.-A. LESTAGE.

Si notre faune est de beaucoup moins riche en Myrméléonides que celle de la France, elle l'est, en revanche, plus que celle de l'Angleterre qui ne possède aucun représentant de cette famille, et davantage aussi que ne le font croire les catalogues dressés à ce jour.

Le Catalogue des Névroptères de DE SELYS mentionnait, en 1882, deux espèces : *formicarius* L. et *formicalynx* FAB.

La Faune de Belgique de LAMEERE n'en indique qu'une seule, le *formicaleo* L. ; quant à la synonymie donnée, elle est bien le reflet des discussions que suscitèrent les arguments pour ou contre la validité des noms linnéens.

Depuis, la critique entomologique a fini par élucider quelque peu le chaos et les faunistes belges pourront, à l'avenir, inscrire trois espèces belges certaines dans leurs catalogues.

Les caractères suivants permettront de les reconnaître :

1. Ailes ornées de taches brune nettes *Euroleon nostras* FOURCR.
- Ailes sans taches 2.
2. Insectes de grande taille ; tête noire ; pronotum brun foncé, les côtés et bord postérieur fauves ; alternance brune et blanchâtre de la nervation, surtout chez SC et R, moins régulière.

Myrmeleon formicarius L.

— Insectes plus petits ; tête jaunâtre avec des taches brunes ; pronotum brunâtre avec des taches fauves ; alternance brune et blanchâtre de la nervation, surtout SC et R, plus régulière.

Myrmeleon inconspicuus RAMB.

* * *

1. *Euroleon nostras* FOURCROY. — C'est en 1918 seulement que ESSEN-PETERSEN a séparé des *Myrmeleon* l'espèce en question, en se basant sur un caractère de nervation très net (1).

C'est le N° 1 du Catalogue de DE SELYS, et l'espèce de la Faune de LAMEERE. Le P. NAVAS a donné d'excellentes raisons pour l'adoption

(1) ESSEN-PETERSEN. *Entom. Meddel.* Bd. XII, H. 2, 1918, p. 125.

du nom du vieil entomologiste parisien (FOURCROY, 1785), et le rejet de celui de *europaeus* créé par MC LACHLAN, qui l'abandonna lui-même plus tard (1).

C'est l'espèce la plus répandue en Belgique ; DE SELYS en donne de nombreuses stations ; elle est surtout commune en Campine, d'où mon excellent collègue M. CANDEZE, le distingué lépidoptériste liégeois, m'en a envoyé de très nombreuses larves dont l'élevage réussit fort bien.

2. *Myrmeleon formicarius* L. — C'est le N° 2 du Catalogue de DE SELYS. LAMEERE ne l'a pas mentionné bien qu'il soit un des représentants remarquables de la faune jurassique belge. DE SELYS ne la connaissait que des environs d'Arlon ; M. FRENNET m'en a généreusement donné trois exemplaires élevés par lui *ex-larva* provenant de Virton.

3. *Myrmeleon inconspicuus* RAMBUR. — Bien que citée de Belgique par divers auteurs, je ne connais personnellement aucune capture de cette petite espèce. Je n'en possède qu'un exemplaire espagnol de la var. *leonina* NAVAS, caractérisée par les taches des tergites abdominaux, alors que ces taches manquent chez le type.

(1) NAVAS, *Annal. Soc. scient. de Bruxelles*, T. 39, 1919-20, fasc. 2, p. 23.