

BULLETIN

DU

Musée royal d'Histoire
naturelle de Belgique

Tome IX, n° 35.

Bruxelles, octobre 1933.

MEDEDEELINGEN

VAN HET

Koninklijk Natuurhistorisch
Museum van België

Deel IX, n° 35.

Brussel, October 1933.

COLÉOPTÈRES MALACODERMES
ET VÉSICANTS ORIENTAUX RECUEILLIS EN 1932
PAR S. A. R. LE PRINCE LÉOPOLD DE BELGIQUE,
par M. PIC (Digoïn, France).

Fam. Lampyridae.

1. — *Vesta aurantiaca* E. Olivier.

Malacca : Pahang, 10-II-1922.

2. — *Diaphanes subapicalis* Pic.

Konghoi.

3. — *Pyrophanes appendiculata* E. Olivier.

Ile Misol (Jeffbi), 26-II-1929.

Fam. Cantharidae.

4. — *Discodon Rouyeri* Pic.

Malacca : Pahang, 10-11-II-1932; Fraser's Hill, 9-II-1932.

5. — *Athemus Astridae* nov. spec.

Angustatus, parum nitidus, griseo pubescens et hirsutus, niger, elytris cyanescentibus, thorace pro majore parte rufo, coxis et femoribus ad basin albidis.

Allongé, peu brillant, orné d'une pubescence courte, grisâtre, en partie redressée, noir, élytres bleutés, métalliques, prothorax

roux, sauf sur sa partie antérieure, hanches et bases des fémurs blancs. Tête peu longue et pas très large, rétrécie derrière les yeux qui sont saillants, à ponctuation forte, peu serrée; antennes grêles et longues, foncées, articulations des articles claires; prothorax roux avec la partie antérieure noire, en carré long, sinué sur les côtés, impressionné sur les côtés en dessus et sillonné au milieu, à ponctuation assez fine et non rapprochée; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, peu atténués à l'extrémité, à ponctuation granuleuse dense, à peine costulés sur le disque; dessous du corps foncé; pattes à cuisses un peu robustes et tibias plus ou moins longs, tarses grêles, ongles non fendus mais dentés à la base.

Longueur : 10 mm.

Malacca : Fraser's Hill, 9-II-1932.

Cette espèce est des plus distinctes, soit par sa forme étroite, soit par la robustesse des cuisses dont la coloration est particulière avec leur base blanche.

6. — *Silesinus testaceicornis* nov. spec.

Elongatus, nitidus, luteo pubescens, testaceus, oculis nigris, articulo 7° antennarum monstroso, pro parte excavato.

Allongé, brillant, orné d'une pubescence jaune peu serrée, tecté avec les yeux noirs. Tête courte, pas plus large que le prothorax, à ponctuation très fine et écartée; antennes longues, aplaties sur les premiers articles, 7° difforme et particulier, long, creusé, inégal avec des parties en aspérités, 4 derniers grêles et allongés; prothorax court et large, un peu rétréci en avant, subsinué sur les côtés avec une incision près de la base, multiimpressionné en dessus, sans sillon médian distinct, très finement et éparsément ponctué; élytres un peu plus larges que le prothorax, assez longs, subparallèles, subarrondis à l'extrémité, à ponctuation forte, rapprochée et, sur chacun, deux costules raccourcies discales; pattes peu longues, ongles dentés à la base.

Longueur : 8 mm.

Malacca : Fraser's Hill, 9-II-1932.

Diffère de *S. apicicornis* Pic, en plus de la coloration claire des membres, par le 7° article de structure différente, moins contourné, le prothorax nettement incisé sur les côtés et non nettement sillonné au milieu en dessus.

Fam. **Prionoceridae.**7. — *Prionocerus caeruleipennis* Perty.

Iles Philippines, à Palawan : Monocan, 5-IV-1932.

8. — *Idgia luteipes* Champion.

Iles Philippines, à Samar : Mano River, 9-IV-1932.

Fam. **Dascillidae.**9. — *Dascillus Leopoldi* nov. spec.

Sat elongatus, antice et postice attenuatus, opacus, niger, capite medio, thorace supra et elytris ad scutellum breve pupureo pilosis, infra corpore griseo-luteo pubescente.

Assez allongé, atténué aux deux extrémités, opaque, noir avec un revêtement pubescent pourpré sur le milieu de la tête, le prothorax, côtés exceptés, et une courte portion suturale vers l'écusson, le reste des élytres à pubescence foncée, dessous du corps à pubescence d'un gris jaunâtre. Antennes longues et assez grêles; prothorax assez court, rétréci en avant, subsillonné sur son milieu postérieur, densément ponctué; élytres pas plus larges que le prothorax, longs, atténués à l'extrémité, striés; pattes un peu robustes.

Longueur : 11 mm.

Malacca : Fraser's Hill, 9-II-1932.

Par sa forme se rapproche de *D. striatus* PIC, mais tout autre par sa coloration avec la pubescence pourprée de l'avant-corps lui donnant un aspect particulier.

Fam. **Meloidae.**1. — *Zonabris pustulata* Thunberg.

Ile Bali : Tjandikoesoema, 25-27-IV-1932.

2. — *Epicauta ruficeps* Illiger.

Malacca : Pahang, 10-II-1932.

Fam. **Alleculidae.**

3. — *Allecula?* sp.

Exemplaire très mutilé, défraîchi.

Ile Bali : Tjandikoesoema, 25-IV-1932.