

# BULLETIN

DU

## Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique

Tome XII, n° 41.

Bruxelles, octobre 1936.

# MEDEDEELINGEN

VAN HET

## Koninklijk Natuurhistorisch Museum van België

Deel XII, n° 41.

Brussel, October 1936.

### MYODAIRES SUPÉRIEURS NOUVEAUX DU CONTINENT AFRICAÏN,

par J. VILLENEUVE DE JANTI (Rambouillet).

*Sous-famille des PHASIINAE.*

**Paratamiclea** n. gen. — Diffère de *Tamiclea* MACQ. par la conformation de la tête: les yeux du ♂ sont intimement joints en arrière. Le péristome est court et large car son bord inférieur est très oblique en arrière à partir de la grande vibrisse; il est formé uniquement par le médian et sa largeur atteint  $\frac{2}{5}$  d'œil environ. Le clypéus est plus creux et il porte une cloison médiane dans sa portion supérieure; les antennes, insérées en dessous du milieu de l'œil, sont un peu plus courtes, les palpes un peu plus longs; les parafaciaux sont couverts de minuscules cils noirs sans ordre, la portion antérieure oblique du péristome est bordée de soies assez serrées. L'occiput est plus renflé dans sa moitié inférieure. Le thorax est dépourvu de soies acrosticales antérieures; les soies marginales médianes font défaut sur les 3 premiers tergites abdominaux. Pattes longues. L'aile est pareille à celle de *Tamiclea*.

— **P. pallida** n. sp. ♂. — Face blanchâtre, bande frontale visible en avant sous forme d'un triangle d'un jaune pâle et mat comme le péristome; antennes jaunes, le 3<sup>e</sup> article brun; palpes jaunâtres, plus ou moins rembrunis au bout; occiput gris bleu.

Thorax et scutellum gris, ce dernier étroitement noir à sa base; le mésonotum, vu d'arrière très obliquement, montre 3 bandes noires écourtées peu après la suture, la médiane de largeur double et brièvement bifurquée en arrière. Abdomen d'un jaune

pâle sur les 3 premiers tergites qui présentent une bande longitudinale et des bandes marginales brunâtres; le tergite IV et l'hyropyge sont couverts d'une pruinosité gris blanc; enfin, le tergite I n'est que partiellement excavé. Pattes jaunâtres, les hanches grises, les fémurs plus ou moins rembrunis dans la moitié distale, les tarses bruns. Ailes hyalines; cuillerons développés, l'inférieur un peu ocracé; balanciers à massue presque blanche.

Les soies frontales formées d'une rangée de petits cils noirs; 3dc.; une seule paire de soies acrosticales: la préscutellaire; une intraalaire postérieure; une longue supraalaire; 3 humérales; st. = 1 + 1. Trois soies marginales subgales au scutellum. Tergite abdominal I nu, tergites II et III sans soies discales et sans soies marginales médianes différenciées. Soies des pattes rares et réduites à des microchètes; tibias II sans soie ventrale ni antéro-dorsale (ou celle-ci presque nulle). Griffes I modérément allongées. Aile sans épine costale; 1 long cil au nœud de la nervure III et 2-3 cils en dessous. Taille: 6 millim.

Salisbury, Rhodesia, 30.XI.1935: 3 ♂ (leg. A. CUTHBERTSON).

*Sous-famille des CALLIPHORINAE.*

***Tricyclea fuliginosa* n. sp.**

Caractérisé par 3 dc., par les ailes gris-hyalin à large bordure antérieure, plus ou moins marquée, d'un jaunâtre sale, et par la coloration générale d'un jaune rougeâtre un peu obscur. Tergite I finement bordé de noir; tergites II et III ayant une bande noire très peu large, celle du tergite II parfois dilatée en triangle médian; tergite IV sans bande ni taches et portant quelques soies disco-latérales éparses, faibles. Pleures jaunes sans macules brunes ou grises; sternopleures à pilosité noire. Cuillerons ocracés. Pattes entièrement jaunes.

Front de la ♀ noirâtre, les orbites grises en avant et la bande frontale présentant un triangle rougeâtre au-dessus de la lunule.

Le ♂ a le mésonotum noirâtre; ses yeux sont joints et à facettes supérieures un peu élargies.

Les arêtes faciales, chez *T. fuliginosa*, portent, dans leur tiers inférieur, de minuscules vibrisses serrées, identiques aux petits poils noirs du péristome. Le chète antennaire a de très longs cils jusque près de l'extrémité. La trompe est jaune.

Taille: 6 millim. 5.

Sud de la Nigeria: Oshogbo (leg. Dr. T. F. G. MAYER). Vole surtout de septembre à novembre.

**Tricyclea tridentata** n. sp.

Caractérisé par le dessin foncé du mésonotum, du scutellum et de l'abdomen.

Le mésonotum est prumineux tout à fait en avant, puis occupé par 2 bandes brunes séparées par une bande médiane rougeâtre et étendues jusqu'au scutellum, lequel présente une bande médiane noire.

Tergite II ayant une bande postérieure noire et étroite, épaisse vers les extrémités ou parfois dilatée, mais toujours en triangle allongé médian atteignant presque le bord antérieur du tergite.

Le tergite III a une bande noire postérieure large et dilatée en 3 larges macules, celle du milieu en trapèze s'avancant jusque assez près du bord antérieur du tergite, les latérales un peu moins avancées et à bord libre généralement convexe.

Le tergite IV est noirâtre, sauf un très fin liséré jaune, légèrement sinueux, le long de son bord antérieur; il porte quelques faibles soies disco-latérales éparses et une très légère pruinosité.

Pleures jaunes: une macule brune à la partie supérieure des mésopleures et une autre moins grande au-devant des soies ptéropleurales; sternopleures à pilosité pâle avec, parfois, quelques poils noirs sur le bord supérieur.

Ailes un peu jaunâtres, cuillerons ocracés.

Pattes entièrement jaunes.

Le chète antennaire est longuement dénudé vers son extrémité; les cils sont moins longs que chez *T. fuliginosa*, assez espacés, et répartis sur la portion moyenne du chète, les cils inférieurs sont encore moins longs que les supérieurs, plus faibles et leur nombre est réduit à 4 ou 5. Les antennes ont souvent leur bord antérieur rembruni plus ou moins largement sur le 3<sup>e</sup> article.

Yeux du ♂ joints et à facettes supérieures un peu élargies. Bande frontale de la ♀ brune ou brun rougeâtre; orbites d'un gris jaunâtre.

Arêtes faciales et péristome, palpes et trompe comme chez *T. fuliginosa*. Taille: 6 millim.

Sud de la Rhodesia: Inyanga (leg. A. CUTHBERTSON). Vole en novembre.

GOEMAERE, Imprimeur du Roi, Bruxelles.