

BULLETIN

DU

Musée royal d'Histoire
naturelle de Belgique

Tome X, n° 33.

Bruxelles, août 1934.

MEDEDEELINGEN

VAN HET

Koninklijk Natuurhistorisch
Museum van België

Deel X, n° 33.


Brussel, Augustus 1934.

UNE ESPÈCE NOUVELLE
DE DIPTÈRES DOLICHOPODIDES
DE LA RÉGION ETHIOPIENNE,

par l'Abbé O. PARENT (Aire-sur-la-Lys).


Hercostomus transitorius, n. sp. Figures 1 et 2.

Femelle. Front vert brillant. Face jaune brun, un peu plus large que le tubercule ocellaire. Palpes brun rouge. Cils post-oculaires inférieurs noirs. Antennes (fig. 1) jaune rouge, l'ar-



ticle 3 légèrement plus long que large, noir sur sa moitié apicale. Soie antennaire insérée au milieu du bord dorsal, à plumosité courte dont les éléments sont 1 fois 1/2 aussi longs que le travers de l'article basilaire de cette soie. Mesonotum violet brillant, 5 d. c. Flancs noir bleu, 1 prothoracique noir. Ecusson glabre. Abdomen vert bleu purpurescent. Hanches noires, à pilosité et chétosité noires. Trochanters jaunes. Pattes jaunes, fémur III noir sur les 4/5 apicaux, les derniers articles du tarse II brunis. Patte I simple. Patte II: fémur, un préapical. Tibia, face dorsale, 3 antérieurs, 2 postérieurs; face ventrale, une série de 5 chètes fins. Patte III: fémur, un préapical. Tibia, face dorsale, 3 antérieurs, 3 postérieurs: face ventrale, une série

de 6-7 chètes fins. Protarse nettement plus court que l'article suivant. Ailes (fig. 2) hyalines, nervures 3 et 4 parallèles. Ba-



lanciers jaunes. Cuillerons jaunes à cils noirs. Long : 2,25 mm.

Mâle inconnu.

Patrie : Ziuti (Mayumbe) 14. IV. 1926. A. COLLART leg.

Type au Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique.

Remarque. — La courte plumosité de la soie antennaire apparente cette espèce aux *Pelastoneurus*, mais la face est étroite et plane et les nervures longitudinales 3 et 4 sont parallèles.