

CONOPIDÆ  
(DIPTERA CYCLORRHAPHA)

PAR

P. VANSCHUYTBROECK (Bruxelles).

Sous-famille MYOPINÆ.

Genre **OCCEMYIA** ROBINEAU-DESVOIDY.

Dipt. des environs de Paris, Myod., S. 50 (1853).

1. — **Occemyia pilosa** KRÖBER.

*O. pilosa* KRÖBER, Bull. Soc. R. Ent. Egypt. (1923).

27 ex. : Kalondo (lac Ndaraga, Mokoto), 1.750 m, 22-27.III.1934; Kinyamahura (Djombu), 1.800 m, 23.VIII.1934; Rutshuru (riv. Kanzarue), 1.200 m, 16.VII.1935; Kitondo (près Gandjo), 2.000 m, 7-23.I.1935; Ruhengeri (Moruguhu), 1.800-1.825 m, 6.II.1935; Burunga (Mokoto), 2.000 m, 9-14.III.1934; Ngesho, 2.000 m, 3-6.IV.1934; Kibati, 1.900 m, 14-15.I.1934; Ruhengeri (sources Kirii), 1.800-1.825 m, 1.X.1934; mont Sesero (près Bitashimwa, Bambous), 2.000 m, 1-2.VIII.1934; S. lac Édouard: Vitshumbi, 925 m, 15.IV.1936 (Coll. L. LIPPENS).

2. — **Occemyia flavicornis** KRÖBER.

*O. flavicornis* KRÖBER, Rev. Zool. Bot. Afric., vol. XXVIII, fasc. 2 (1936).

5 ex. : Rutshuru, 1.285 m., 3-5.I.1934; Ruhengeri (Moruguhu), 1.800-1.815 m, 6.II.1935; Ruhengeri (sources Kirii), 1.800-1.825 m, 1.X.1934; Nyabitsindi (entre volc. Visoke-Musule), 2.400 m, 18.II.1935; [Ruabungu (île Idjwi, lac Kivu), 1.460 m, 17.X.1935] (Miss. H. DAMAS).

Sous-famille **STYLOGASTERINÆ**.Genre **STYLOGASTER** MACQUART.

Suites à Buffon, Diptères, 2, 38 (1835).

3. — **Stylogaster leonum** WESTWOOD.*S. leonum* WESTWOOD, Introduc., II, 574 (1840).

3 ex. : May-ya-Moto, 950 m, 6-9.XI.1934; Mayumbu (volc. Nyamuragira), 2.100 m, 14-26.VI.1935; Nyamuronge (riv.), près Mugando, 21.IV.1945.

4. — **Stylogaster obscurinotum** KRÖBER.*S. obscurinotum* KRÖBER, Rev. Zool. Bot. Afric., vol. XXVIII, fasc. 2 (1936).

7 ex. : Rutshuru, 1.285 m, 6.VII.1935; Nyasheke (volc. Nyamuragira), 1.820 m, 14-26.VI.1935; Mayumbu (volc. Nyamuragira), 2.100 m, 14-26.VI.1935; vers Kamalembe, vers 2.300 m, 7-23.I.1935; Rutshuru (riv. Fuku), 1.250 m, 2.VII.1935; S. lac Édouard : r. Rwindi, 1.000 m, 24.IV.1936 (Coll. L. LIPPENS).

5. — **Stylogaster frontalis** KRÖBER.*S. frontalis* KRÖBER, Rev. Zool. Bot. Afric., vol. XXVIII, fasc. 2 (1936).

4 ex. : Rutshuru, 1.285 m, 16.X.1934; 6.VII.1935; Rutshuru, riv. Musugereza, 1.100 m, 4.VII.1935; Kimboho, 925 m, 25.XI.1935 (Miss. H. DAMAS).

Sous-famille **CONOPINÆ**.Genre **PHYSOCEPHALA** SCHINER.

Wien. Entom. Monatsschrift, Bd. 5, S. 187 (1861).

6. — **Physocephala gigantea** KRÖBER.*P. gigantea* KRÖBER, Rev. Zool. Bot. Afric., vol. XXVIII, fasc. 2 (1936).

1 ex. : Rumangabo (riv. Bugombwa), 9.IV.1945.

Genre **CONOPS** LINNÉ.

Fauna Suecica, S. 1907 (1781).

7. — **Conops nigro-coxalis** KRÖBER.

*C. nigro-coxalis* KRÖBER, Bull. Soc. R. Ent. Egypt. (1923).

5 ex. : Rutshuru (riv. Musugereza), 1.100 m, 10.VII.1935; Ruhengeri (riv. Mugara-Kigombe), 1.800-1.825 m, 6.II.1935; Rutshuru (riv. Kanzarue), 1.200 m., 15.VII.1935; Nyongera (près Rusthuru), 1.218 m, 18.VII.1935.

\*  
\*\*

Sauf indication contraire, tous les spécimens étudiés ont été récoltés par la Miss. G. F. DE WITTE.

Les localités placées entre [ ] sont situées hors des limites du Parc National Albert.

---

