

# MALACODERMATA

PAR

M. PIC (Digoin)



# MALACODERMATA

PAR

M. PIC (Digoïn)

---

## FAM. LYCIDAE.

1. — *Ditoneces atricolor* PIC var.

Sumatra : Palembang, 14-IV-1929.

2. — *Ditua deplanata* WATERHOUSE.

Nouvelle-Guinée : Sakoemi, 12-III-1929.

3. — *D. nigricornis* BOURGEOIS.

Ile Halmaheira; baie de Djailolo, II-1929.

4. — *Bulenides indus* KIRSCH.

Sumatra : Palembang, 14-IV-1929.

5. — *Xylobanus reticulatus* GORHAM.

Sumatra : Medan, 3-V-1929.

6. — *Odontocerus ? pectinatus* BOURGEOIS var.

Sumatra : Bireun, 2-V-1929.

7. — *Cladophorus Leopoldi* nov. spec.

Elongatus, fere opacus, niger, thorace, scutello elytrisque ad basin late testaceis; antennis longe et sinuate flabellatis; thorace 7 areolato

Allongé, presque opaque, un peu pubescent de clair, noir avec le prothorax, l'écusson et les élytres, moins leur tiers apical, d'un testacé-orangé. Tête foncée, non rostrifère; antennes grêles et flabellées à partir du troisième article, les rameaux flabellés partant près de l'extrémité des articles; prothorax assez court et large, subarqué en avant et sur les côtés, dilaté vers les angles postérieurs qui sont larges, muni de 7 aréoles; élytres à peine plus larges que le prothorax, subparallèles, assez longs, ayant chacun 4 côtes régulières avec les intervalles présentant deux rangées de points subcarrés; pattes assez grêles, tibias médians un peu arqués.

Longueur : 10 mm.

Nouvelle-Guinée : Lomira, 20-III-1929.

Par ses antennes flabellées se rapproche de *C. flabellifer* Brg. dont il se reconnaît, à première vue, par le prothorax et l'écusson testacés, les antennes apparaissent plus grêles.

#### 8. — *Cladophorus amaenus* GORH.

Sumatra : Medan, 3-V-1929.

#### 9. — *Metriorrhynchus maximus* nov. spec.

Elongatus, sat latus, opacus, niger, pro parte cyanescens, elytris nigris, ad basin aurantiaco notatis; thorace 7 areolato; elytris 9 costatis, costis 2, 4, 6, 8 fortioribus, intervallis plicatis.

Allongé, assez large, opaque, en partie finement pubescent, noir, à reflets bleutés ou un peu verdâtres sur le prothorax, le dessous et les pattes, élytres noires avec environ le quart basal orangé. Tête rostrifère, à rostre assez court; antennes aplaties, larges, plus ou moins prolongées en dent au sommet antérieur des articles 3 et suivants; prothorax court et assez large, sinué sur les côtés et en avant, un peu rétréci sur sa partie antérieure médiane, angles postérieurs étroits et saillants en dehors, 7 aréolé; élytres bien plus larges que le prothorax, longs, un peu étranglés vers le milieu, ornés de 9 côtes alternativement fines ou un peu élevées avec les intervalles assez larges, ornés de plis transversaux rapprochés; pattes peu courtes, bleutées.

Longueur : 22 mm.

Sumatra : Bireun, 11-V-1929.

Espèce remarquable par sa grande taille conjointement à sa coloration en majeure partie bleutée, et la sculpture spéciale de ses élytres.

#### 10. — *Metriorrhynchus cyanopterus* REDTENBACHER.

Célèbes : forêt vierge entre Paloe et Koelawi, 4-II-1929.

11. — *M. ephippiger* GUÉRIN.

Nouvelle-Guinée : Manoi, 2-III-1929

12. — *Trichalus cyanescens* BOURGEOIS.

Nouvelle-Guinée : Sakoemi, 2-III-1929.

13. — *Trichalus Leopoldi* nov. spec.

Elongatus, opacus, niger thorace pectoreque testaceo-aurantiacis.

Allongé, opaque, noir, prothorax et poitrine d'un testacé orangé. Tête courte; antennes longues, aplaties, à articles 3 et suivants allongés, plus ou moins angulés à leur sommet antérieur; prothorax assez large, un peu rétréci en avant, sinué antérieurement, presque droit sur les côtés avec les angles postérieurs assez larges et un peu proéminents, muni d'une aréole médiane postérieure; élytres à peu près de la largeur du prothorax, assez longs, subparallèles, inégalement et multicostés en avant avec 4 fortes côtes postérieures et les intervalles à deux rangées de points fenestrés assez réguliers, séparés par des plis; pattes assez courtes et très aplaties, tibias antérieurs fortement arqués.

Longueur : 8 mm.

Iles Aroe : S. Manoembai, 26-III-1929.

Voisine de *T. pectoralis* Pic, en diffère par la forme du prothorax qui, en plus, n'est pas marqué de foncé, la tête et les pattes entièrement noires.

14. — *Trichalus fuliginosus* BOURGEOIS.

Ile Banda : Goenoeng Api, 24-II-1929.

15. — *T. communis* WATERHOUSE.

Sumatra : Medan, 3-V-1929; Java : Buitenzorg, 20-XII-1928.

## FAM. LAMPYRIDAE.

16. — *Luciola ? vespertina* FABRICIUS.

Sumatra : Atjeh entre Bireun et Takengon.

17. — *Pteroptyx cribratellum* E. OLIVIER.

Nouvelle-Guinée : Sakoemi, 12-III-1929.

18. — *Colophotia brevis* E. OLIVIER.

Java : Pendjaloë, 31-XII-1928.

19. — *Pyrophanes appendiculata* E. OLIVIER.

Nouvelle-Guinée : Sakoëmi, 12-III-1929.

20. — *P. Beccarii* E. OLIVIER var.

Iles Aroe : S. Manoëmbai, 25-III-1929.

## FAM. TELEPHORIDAE (CANTHARIDAE).

21. — *Discodon Humbolti* PIC.

Nouvelle-Guinée : Siwi, 7-III-1929.

22. — *Mimopolemius albicoxis* PIC.

Sumatra : Prapat, 1-V-1929.

23. — *Silis simplex* GORHAM.

Bornéo : Tehgaoreng, 9-II-1929.

24. — *Silis impressipennis* nov. spec.

Elongatus, nitidus, testaceus, femoribus apice tibiisque pro majore parte nigris, thorace parum lato, lateraliter minute undulato-sinuato, elytris postice impressis.

Allongé, brillant, orné d'une courte pubescence grise testacé pâle, avec partie des pattes noire. Tête assez large, rétrécie en arrière, peu et finement ponctuée ainsi que le prothorax, yeux noirs, un peu saillants; antennes longues, premier article épaissi à l'extrémité, deuxième assez court, troisième et suivants longs, un peu anguleux à l'extrémité inférieure, derniers plus grêles; thorax peu large, arqué en avant, faiblement ondulé-siné sur les côtés, à angles postérieurs un peu saillants et ciliés; élytres un peu plus larges que le prothorax, assez longs, subparallèles, marqués, près de l'extrémité, d'une impression commune sur la suture, celle-ci bordée antérieurement et sur les côtés d'une partie surélevée en forme de crête et frangée de poils; pattes allongées, crochets non bifides.

Longueur : 8 mm.

Bornéo, à l'Est de Samarinda, embouchure du Mahakam, 9-II-1929.

Espèce distincte entre toutes, au premier abord, par la curieuse impression qui orne les élytres. Peut se placer près de *S. borneensis* Pic.

25. — *Chauliognathus procerus* BOURGEOIS.

Nouvelle-Guinée : Siwi (forêts), 6-III-1929.

## FAM. MALACHIDAE.

26. — *Laius flavicornis* FABRICIUS.

Poelo Karang (îles Aroe), 22-III-1929.

27. — *Laius Leopoldi* nov. spec.

Oblongus, parum, nitidus, niger, supra cyaneus ant paulo violaceus, articulis 3 primis antennarum flavis.

Oblong, peu brillant, noir, dessus à reflets bleus, parfois un peu violacés sur les élytres, trois premiers articles des antennes testacés, orné d'une pubescence grise, fine, peu dense avec quelques poils obscurs dressés. Tête pas très large, aplatie, opaque; antennes chez ♂ à premier article long, élargi à l'extrémité, un peu impressionné sur la face antérieure, deuxième indistinct, troisième long, non, ou peu dilaté, suivants simples, assez courts, dernier plus long, acuminé à l'extrémité; chez ♀, premier article peu épaissi à l'extrémité; prothorax peu brillant, court, un peu rétréci en arrière, subarqué sur les côtés; élytres un peu brillants, bien plus larges que le prothorax, courts, faiblement élargis en arrière, à peine ponctués; pattes robustes, cuisses antérieures creusées en dessous, tibias largement élargis au milieu et amincis à l'extrémité chez ♂, pattes simples chez ♀.

Longueur : 4,5-5 mm.

Ile Weeim (N. Misol), 28-II-1929.

Voisin de *L. flavicornis* F. dont il se distingue, à première vue, par la structure différente des premiers articles des antennes.

---