

HETEROMERA (ex parte)

PAR

M. PIC (Digoin)

HETEROMERA (ex parte)

PAR

M. PIC (Digoïn)

FAM. MELOIDAE.

1. — *Cessites cephalotes* OLIVIER.

Sumatra, avril et mai 1929.

2. — *Epicauta ruficeps* ILLIGER.

Sumatra : Kepahiang, Panti, Tandjong-Karang, IV-1929; Java : Poedjou, 16-I-1929.

FAM. MORDELLIDAE.

3. — *Mordella* sp. (ex. défloré), peut-être *composita* WALK. var.

Célebes : forêt vierge entre Paloe et Koelawi, 4-II-1929.

FAM. PYROCHROIDAE.

4. — *Pseudopyrochroa Theresae* PIC.

Sumatra : Singalang, 22-IV-1929.

FAM. ANTHICIDAE.

5. — *Formicomus serdangus* MARSEUL.

Sumatra : Tandjong-Kelong, 16-IV-1929

6. — *Anthicus Confucii* MARSEUL (recte *Confuciusi*).

Sumatra : Bireun, 2-V-1929.

7. — *Macratia* ? *coniceps* PIC var.

Ins. Banda : Soenoeng Api, 24-II-1929.

FAM. OEDEMERIDAE.

8. — *Sessinia* ? *livida* FABRICIUS.

Kaimana (Nouvelle-Guinée), 19-III-1929.

9. — *Oncomera piceonotata* nov. spec.

Elongata, parum nitida, griseo pubescens, nigro-picea, pro parte flava, clytris flavis, ad basin et ante apicem late nigro-piceo fasciatis, sutura flava.

Allongé, peu brillant, orné d'une pubescence grise fine, en partie noir de poix, en partie flave. Tête longue, testacée, rembrunie entre les yeux, palpes en partie foncés, yeux grands, débordant le prothorax; antennes longues, grêles, foncées, en partie plus claires aux articulations des articles; prothorax flave, foncé de chaque côté, subarqué en avant, sinué sur les côtés, subsinué sur le bord postérieur qui est très relevé, marqué en dessus de trois impressions, une médiane basale et une de chaque côté du milieu, ces dernières bordées antérieurement d'un pli tuberculeux; écusson flave; élytres bien plus larges que le prothorax; longs, atténués à l'extrémité, à deux larges fascies noir de poix, laissant la suture flave, l'antérieure prolongée sur les côtés postérieurs, à ponctuation fine et dense, ornés chacun, sur le disque, de deux côtés dont l'interne courte; dessous du corps en majeure partie foncé; pattes grêles, flaves, tibias en partie foncés.

Longueur : 12 mm.

Takengon (Sumatra), 9-V-1929.

A placer près de *O. geniculata* Pic; espèce distincte par sa particulière coloration élytrale.

FAM. LAGRIIDAE.

10. — *Lagria Leopoldi* nov. spec.

Oblonga, parum nitida, sparse luteo pubescens, nigra, capite thoraceque paulo viridescens, antennis ad basin rufis.

Oblong, peu brillant, orné d'une pubescence jaunâtre couchée et espacée, noir avec l'avant-corps teinté de verdâtre, la base des antennes rousse. Tête assez grosse, à ponctuation ruguleuse, forte et dense, yeux un peu distants; antennes grêles, noires avec les premiers articles roux, dernier article grand, à peu près de la longueur des deux précédents; prothorax court et large, subarqué sur les côtés, rebordé sur le bord postérieur, à ponctuation ruguleuse dense, marqué

d'une petite impression postérieure médiane; élytres bien plus larges que le prothorax, assez longs, un peu élargis postérieurement puis atténués à l'extrémité, bombés sur leur milieu, marqués d'une petite impression derrière l'écusson, finement et densément ponctués avec quelques petits plis transversaux; pattes assez courtes, foncées.

Longueur : 10 mm.

Manoi (Nouvelle-Guinée), 2-III-1929.

Peut se placer près de *L. bicolor* Koll. et Red., plus foncé avec l'avant-corps plus robuste.

11. — *Sora bicoloritarsis* nov. spec.

Angustata, parum nitida, fere glabra, nigra, thorace antice et postice rufo marginato, elytris castaneis, tarsi ad basin testaceis.

Étroit, peu brillant, presque glabre, noir avec le prothorax à bords antérieur et postérieur roux, les élytres châtain, les tarsi en partie testacés. Tête assez large et courte, à cou très distinct, peu ponctuée, yeux peu écartés; antennes grêles, foncées; prothorax plus long que large, sinué sur les côtés, à angles postérieurs un peu saillants, à ponctuation pas très forte, un peu écartée; élytres plus larges que le prothorax, longs, un peu élargis postérieurement, plus atténués à l'extrémité, assez fortement strié-ponctués, intervalles étroits, un peu subconvexes; pattes assez grêles, foncées, tarsi testacés à la base.

Longueur : 10 mm.

Menado (Célèbes), ex Van Braekel.

Peut se placer près de *S. Borchmanni* Pic, en diffère par la forme bien plus allongée, le prothorax plus étroit, les antennes foncées, etc.

12. — *Sora nitidissima* PIC.

Menado (Célèbes), ex Van Braekel.

L'unique exemplaire recueilli est un ♂, différent du type ♀ par la forme un peu plus allongée, avec le prothorax moins large, les élytres plus étroits et caractérisé par les cuisses postérieures épaissies avec les tibias munis d'une petite dent près de leur base et sur le côté interne. Les antennes foncées, à base testacée, sont grêles avec le dernier article très long.

Je sépare, à titre de variété, sous le nom de var. *Braeckeli*, une ♀ de forme allongée, à coloration des élytres d'un vert obscur avec les pattes foncées. Cette ♀ provient de Menado (Célèbes).

Cette variété nouvelle se distingue de *S. nitidissima* Pic ♀ par la forme plus allongée du corps, le prothorax moins robuste, les élytres plus sombres, à stries ponctuées un peu plus marquées, ainsi que par les pattes foncées.

