

## SONDAGE DANS LE TELL D'APAMEE, SYRIE (1974)

### 3. ETUDE DES RESTES OSSEUX HUMAINS

par

Marie-Antoinette DELSAUX

#### **Inventaire**

##### Niveau V. (9-3) :

Quelques fragments de voûte crânienne, dont un de frontal et un d'occipital.

1/3 inférieur de cubitus droit, la partie supérieure de l'os est brisée au niveau d'un cal.

1/2 inférieure d'un cubitus droit, plus mince que le précédent.

Un 3<sup>e</sup> métacarpien et une 2<sup>e</sup> phalange de la main.

Un 1<sup>er</sup> et un 3<sup>e</sup> métatarsiens.

Un acromion droit.

Un fragment d'axis et deux de lombaires.

Deux fragments de côtes.

Restes provenant donc de deux adultes.

##### Niveau V. (12-3) :

Quelques fragments de voûte crânienne.

##### Niveau V. (13-3) :

Un tibia droit en 3 fragments, privé de son épiphyse supérieure et de sa malléole interne.

1/2 inférieure de diaphyse d'humérus gauche (fluet) privé de son épiphyse.

Quelques fragments d'une diaphyse d'humérus plus robuste que le précédent.

Une 2<sup>e</sup> prémolaire et une 3<sup>e</sup> molaire inférieures.

##### Niveau VA :

1 Un petit fragment de pariétal d'adulte (brûlé)

2 Deux moitiés postérieures de pariétaux d'adulte jeune et l'occipital incomplet.

Une canine supérieure droite.

Niveau VB :

Un fragment de pariétal gauche très épais (région postéro-supérieure) ; un autre fragment (angle postéro-inférieur gauche). Un fragment du temporal droit avec la racine postérieure de l'apophyse zygomatique. Deux autres petits fragments de voûte.

Les sutures n'étaient vraisemblablement pas soudées.

A part : une couronne de 2<sup>e</sup> molaire inférieure gauche.

### Commentaire

#### 1. *Les vestiges crâniens.*

Les fragments inventoriés en 9-3 sont trop épais pour être associés à ceux de 12-3.

D'autre part, les fragments 9-3, quoique épais, ne semblent pas pouvoir être rapprochés de VB.

Pas plus que les 12-3 ne peuvent être rapprochés de VA ; les lignes courbes temporales sont trop accusées et les engrenures suturales différentes.

Il n'est peut-être pas exclu que le fragment calciné VA ne provienne de la voûte incomplète VA, mais rien n'autorise à l'affirmer.

#### 2. *Les restes post-crâniens.*

Le cubitus droit (9-3), fluet, pourrait provenir du même squelette que l'humérus gauche incomplet (13-3).

Il serait plus vraisemblable d'associer le deuxième cubitus, plus robuste, au tibia (13-3), et peut-être aussi les fragments de diaphyse d'humérus recueillis dans la même couche.

On dénombre donc quatre individus adultes au moins et peut-être même cinq à partir des restes crâniens.

Les os longs proviennent de deux adultes au moins, mais pourraient aussi bien avoir appartenu à trois ou à quatre sujets différents. On peut avoir une idée de la stature d'un des individus à partir du tibia (13-3), qui est le plus complet parmi les restes des os des membres. Le fragment mesure 318 mm, c'est-à-dire du bord externe de l'extrémité inférieure à la naissance de la tubérosité antérieure. Il correspondrait à un tibia entier de 364 mm de longueur maximale ou 357 mm sans les épines. Ses diamètres antéro-postérieur et transversal, mesurés au niveau du trou nourricier, sont respectivement de 33,9 et 22,2 ; l'indice vaut donc 65,5 et correspond à la catégorie mésocnémique.

La stature de l'individu, reconstituée par la longueur de son tibia, serait, d'après les tables de Manouvrier ou de Trotter et Gleser, de 166 à 170 cm.