

UNE NOUVELLE FORME
DE CHRYSOCARABUS AURONITENS F.
SSP. SUBFESTIVUS OB. : AB. LELEUPI

par W. HANSEN (Bruxelles)

Au cours d'une chasse effectuée en 1967 dans la forêt de Lorge (France, département des Côtes-du-Nord), en compagnie de mon excellent ami et collègue N. LELEUP, nous avons trouvé, outre un grand nombre de *Car. auronitens* F. ssp. *subfestivus* OB., un nombre relativement élevé de formes mélanisantes, y compris l'ab. *bleusei* OB.

Un exemplaire diffère des autres par la coloration de ses appendices. Il s'agit d'un mâle holomélanisant, à tête et pronotum noirs avec des reflets bleuâtres, les élytres étant d'un noir luisant à reflets bronzés ; les antennes et les pattes sont entièrement d'un noir de jais profond.

Or, outre les côtes élytrales plus fines et d'un relief plus faible que l'*auronitens* F. ssp. *auronitens* s. str., par sa forme générale plus allongée et par son pronotum plus long et rétréci en arrière, la sous-espèce *subfestivus* OB. diffère encore de l'*auronitens* typique par les tibias noirs, le premier article antennaire et les fémurs étant comme chez cette dernière race d'un testacé rougeâtre. Ces derniers caractères passent pour être invariables, sinon constants.

Des variétés à pattes noirâtres ont déjà été signalées chez l'*auronitens* ssp. *auronitens*. C'est ainsi que LETZNER décrit comme var. *picipes* les exemplaires à pattes noirâtres. HEYDEN décrit comme var. *nigripes* un exemplaire de Domodossola (Italie) à antennes et pattes entièrement noires. Le D^r J. BALAZUC décrit comme ab. *bourgini* une variété de la forêt de Marly, aux environs de Paris, à premiers articles antennaires et pattes absolument noirs.

Enfin, chez *Car. auronitens* F. ssp. *festivus* DEJ., BARTHE décrit comme var. *nigrofemoratus* une forme qui a le premier article des antennes et les fémurs qui sont noirs.

La forme de la forêt de Lorge est bien tranchée et ne saurait être confondue avec aucune autre forme de *Car. auronitens* F. ; elle présente en quelque sorte, le stade extrême de mélanisme puisqu'elle est, en résumé, entièrement noire.

Cette coloration n'est nullement le fait des altérations *post mortem* dont on a parfois fâcheusement abusé et qui sont à l'origine d'une certaine méfiance, bien compréhensible d'ailleurs, de la part de quelques auteurs dont R. JEANNEL, S. BREUNING et E. BARTHE. La coloration a été constatée sur le vivant par M. N. LELEUP et moi-même.

Quoique étant peu enclin à ajouter une nouvelle variété à la liste déjà très chargée des aberrations de coloration, j'estime, eu égard à l'intérêt que les carabologues et généticiens y portent, que celle-ci mérite d'être fixée par un nom, même si les dispositions du Code ne lui sont pas applicables. Je propose pour elle le nom d'ab. *leleupi* nov. en hommage à N. LELEUP qui a attiré mon attention sur les particularités que présente cette forme. Il s'agit d'un ♂, Forêt de Lorge, 1.XI.1967, coll. W. HANSEN.