

M. SEGERS montre également un exemplaire de *Metoecus paradoxus* L. (Col. Rhipiphoridae) récolté à Wevelgem le 6.IX.1968 dans un nid de *Vespa vulgaris* L. par un membre de l'Entomologische Vereniging d'Anvers.

4. M. J. DECELLE présente un exemplaire de *Thorictus canariensis* WOLL. (Col. Thorictidae) qu'il a récolté dans un nid de fourmis à Tenerife, Agua Mansa, le 22.V.1968. Il donne quelques précisions sur la position systématique de la famille des Thorictidae et sur la biologie de ses représentants.

Assemblée mensuelle du 6 novembre 1968

Présidence de M. Em. JANSSENS, *Président*

Présenté par M. R. BRENY, M. DOUROJEANNI, Professeur à l'Université de La Molina, ancien Vice-Président de la Société d'Entomologie du Pérou, Chef du Département de la Protection et Conservation de la Nature et de l'Institut de Recherches forestières du Pérou, assiste à la séance.

Décision du Conseil. — M. Léopold ROGER, 73, rue Bâtonnier Braffort, Bruxelles 4, présenté par MM. R. DUCARME et R. WORMHOUT est admis comme membre associé. M. L. ROGER s'occupe des Macrolépidoptères et des Coléoptères de Belgique et de France.

Bibliothèque. — *Dons.* — Nous avons reçu 9 tirés à part du Carnegie Museum, Pittsburg. (Remerciements).

COMMUNICATIONS

1. M. J. KEKENBOSCH présente la note suivante :

Araignées nouvelles pour la Faune de Belgique

a) *Tetrilus macrophthalmus* (KULCZYNSKI).

Cette Araignée myrmécophile n'a, jusqu'à présent, été citée que de trois pays : Hongrie, Angleterre et France.

La capture d'une ♀ de cette espèce à Chaumont-Gistoux (prov. de Brabant) le 28.X.1966, dans un nid de *Formica rufa* (leg. M. DEHOUSE) apporte une contribution intéressante à la répartition géographique de cette espèce.

b) *Scotina gracilipes* (BLACKWALL).

Le genre *Scotina* (MENGE) était déjà représenté dans notre pays par *Sc. celans* (BLACKWALL) que l'on ne connaît que par quelques localités de captures disséminées dans la province de Brabant et datant du siècle dernier, et une ♀ recueillie à Comblain-au-Pont le 28.IX.1960 (leg. S. JACQUEMART).

J'ai capturé une ♀ de *Sc. gracilipes* (BLACKWALL) à Kalmthout le 13.IX.1956, en battant des touffes de bruyère.

J. KEKENBOSCH.

2. M. R. WORMHOUT fait circuler des cadres vitrés contenant des Lépidoptères, Coléoptères et Araignées remarquables. Il attire spécialement l'attention sur un rare exemplaire de *Papilio gynandromorpha*. Il donne enfin des précisions sur l'utilisation de l'insecticide « Strip Vapona » pour la protection des collections.

3. M. A. DE KONINCK présente des Satyrides du genre *Erebia* dont le rare *Erebia christi* RATZER pour lequel il donne les précisions suivantes :

Erebia christi RATZER

Espèce endémique de Laquintal, vallée située sur le versant sud du Simplon (Valais). Elle se rencontre entre 1.300 et 2.200 m. Sa période de vol est très courte : en moyenne, le papillon vole pendant la première quinzaine de juillet. La chenille vit sur *Festuca ovina* L. *Erebia christi* est très rare et cette rareté est accentuée par la présence d'espèces très voisines avec lesquelles on la confond facilement (cf *E. melampus*, *E. epiphron*, *E. mnestra*). Malgré le nombre important de lépidoptéristes qui viennent la rechercher, l'espèce est pratiquement inexterminable du fait que Laquintal représente une vallée très encaissée dont les versants abrupts sont inaccessibles pour la chasse aux Lépidoptères. Les amateurs doivent donc se contenter de chasser sur le chemin qui longe la vallée.

A. DE KONINCK.