

Capture de Carabidae belges

- *Ocys harpaloides* (SERV.) : Maffles (Ath), 1.XII.1968, 1 exemplaire dans le terreau d'un vieux saule.
 — *Ophonus* (*Metoponus*) *puncticeps* (STEPH.) : Virton, 14.VII.1968, 12 exemplaires.

3. M. N. LELEUP présente un Onychophore troglophile qu'il a récolté en 1965 en Ecuador. Il donne des précisions sur la position systématique, la distribution géographique et les mœurs de ces étranges animaux.

M. N. LELEUP montre également 2 exemplaires de *Leleupaussus tetramerus* LUNA DE CARVAHLO, curieux Carabidae Paussinae du Katanga dont les tarsi ne comportent que 4 articles au lieu des 5 articles habituels.

4. M. J. COOREMAN fait circuler quelques exemplaires de *Sphaericus gibboides* BOIELD. (Col. Ptinidae) capturés dans une habitation à Watermael-Boitsfort. D'après ses habitants, cette maison fut littéralement envahie par ces insectes. *Sphaericus gibboides* se développe le plus fréquemment aux dépens de substances sèches d'origine végétale. Dans le cas présent, il fut observé dans de nombreuses denrées alimentaires (farine, fruits secs, etc.) mais l'origine de l'infestation n'a pas pu être déterminée.

E R R A T A

1968. — tome 104.

- P. 407, ligne 10, remplacer : « plus peut-on dire que, statistiquement, les tempes du *leleupi* sont » par : « plus grande. Il en résulte que l'appartenance des femelles à l'une ».
 P. 458, ligne 3 à partir du bas, remplacer : « des ordres et familles composant ce super-ordre des Orthoptéroïdes. L'auteur » par : « *dea*, *Grylloblattodea*, *Isoptera* et *Zoraptera* », DERMAPTEROIDEA (*Protelytrop-* »).

CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DES STAPHYLINIDAE CVII. Sur les « Pronomaea » de la Région paléarctique occidentale

par Gaston FAGEL (Bruxelles)

Récemment notre excellent collègue, le D^r G.A. LOHSE (Hamburg) a publié la description d'une nouvelle espèce de *Pronomaea*, basée sur 3 exemplaires provenant d'Italie septentrionale (Haut Adige).

Presque en même temps nous capturions à Antalya (Anatolie méridionale) un *Pronomaea* que sur le terrain déjà nous considérons comme inédit. A l'occasion de l'étude de cette dernière espèce nous avons examiné en détail et disséqué tous les *Pronomaea* figurant dans les collections conservées à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, notamment la collection A. FAUVEL, ainsi que dans notre propre collection. Cela nous a permis de compléter la description du D^r LOHSE et d'augmenter considérablement la dispersion de son espèce, ainsi que de décrire, ci-après, trois espèces inédites provenant de Méditerranée orientale.

Pronomaea rostrata ERICHSON

Die Käfer der Mark Brandenburg I, 1, 1837, p. 379.

La description originale semble bien se rapporter à l'espèce considérée par notre collègue M. LOSHE comme étant celle de ERICHSON.

La conformation de l'édéage et de la spermathèque, tels que figurés par le D^r LOHSE, est suffisamment caractéristique pour ne pas nécessiter de remarques spéciales.

Nous ajouterons que la coloration générale est toujours brune, pattes entièrement jaune roux, antennes légèrement obscurcies ainsi que, parfois, le pénultième article des palpes labiaux, les