

CONTRIBUTION A L'ETUDE  
DES COLEOPTERES LUCANIDES

Une variété nouvelle  
d'*Hemisodorcus fulvonotatus* Parry

par Hughes E. BOMANS (Bruxelles) \*

Je possède parmi mes *Hemisodorcus fulvonotatus* un exemplaire, non tératologique, nettement différent de la forme typique et qui s'en distingue par les caractères suivants. Je propose de le nommer :

***Hemisodorcus fulvonotatus*, var. *bilineatus* nov.**

♂ — Forme générale semblable à *H. fulvonotatus*.

Bord frontal de la tête plus bombé ; canthus plus proéminents et à peine émoussés.

Prothorax plus brillant ; côtés fortement bisinués, un peu comme chez *H. bisignatus*, avec une large protubérance au milieu ; angles médians plus pointus.

Elytres très brillants, un peu plus bombés.

En dessous la saillie prosternale est élargie et non saillante. Les côtés du metasternum sont glabres.

La coloration est semblable à *fulvonotatus*, sauf en ce qui concerne les élytres. Partant de l'épaule et à environ un tiers de la largeur de l'élytre, une bande jaune continue rejoint l'apex, comme chez certains *fulvonotatus*. De plus une seconde bande jaune suit la bordure des élytres depuis les épaules jusqu'à l'apex où elle rejoint la première. Dans la forme typique il n'existe en général qu'un croissant jaune au bout des élytres, croissant qui ne touche pas l'apex.

Dimensions :

longueur totale, mandibules incluses,	31 mm
longueur des mandibules,	8,8 mm
largeur maximale aux élytres,	9,5 mm
largeur maximale au prothorax,	9,8 mm

Holotype : 1 mâle majeur, British Bootang, 1898, réc. L. Durel. Dans ma collection.

\* Adresse de l'auteur : avenue Charles Verhaegen 39, 1950 Kraainem (Belgique).

CONTRIBUTION A L'ETUDE  
DES COLEOPTERES LUCANIDES

Description d'une nouvelle espèce du Laos :  
*Aegus rondoni*

par Hughes E. BOMANS (Bruxelles) \*

Il s'agit d'une série d'un nouvel *Aegus* très caractéristique qui se trouvait parmi les récoltes effectuées au Laos par J.A. RONDON, Consul de Belgique à Vientiane, et que j'ai dédié à sa mémoire.

***Aegus rondoni* n. sp.**

♂ — Insecte de stature élancée.

Tête en forme d'hexagone élargi, rétrécie en avant et en arrière, très élargie au centre ; très finement granuleuse sauf sur les joues et le dessus des yeux qui sont couverts de grosses ponctuations irrégulières ; mate sauf un léger sillon central et une bande le long du centre du bord postérieur ; bord frontal profondément creusé et surmonté d'une gibbosité large, longue et émoussée ; épistome non visible ; angles antérieurs largement arrondis ; canthus très légèrement saillants, étroits et divisant entièrement les yeux ; joues longues, saillant fortement derrière les yeux. Antennes longues, 1<sup>er</sup> article droit, plus long que tous les autres réunis.

Mandibules longues, larges, aplaties, finement granuleuses, mates ; vues sur un plan horizontal et de profil elles apparaissent régulièrement recourbées vers le haut ; côtés externes parallèles de la base presque jusqu'à la pointe qui est émoussée ; côtés internes portant une dent assez forte et émoussée vers la moitié de la

\* Adresse de l'auteur : avenue Charles Verhaegen 39, 1950 Kraainem (Belgique).