

Dimensions des types (en mm)	Holotype	Allotype
Longueur totale, mandibules incluses	38	34
Longueur des mandibules	5,5	2,8
Largeur maximales aux élytres . . .	15,9	16
Largeur maximale au prothorax . .	15,1	15,5

HOLOTYPE : 1 ♂, Laos, Ban Van Heua, 800 m., 30 septembre 1966, réc. J.A. Rondon, in-coll. H.E. Bomans.

ALLOTYPE : 1 ♀, Laos, Ban Van Heua, 800 m., 15 décembre 1966, réc. J.A. Rondon, in-coll. H.E. Bomans.

PARATYPES : Laos, P.K. Khouai, 7 ♂ 2 ♀, 15-IX au 15-XII-1963 ; id. 2 ♂ 5 ♀, 8-IX au 16-XII-1964 ; id. 4 ♂ 2 ♀, 30-VIII au 29-X-1965 ; id. 6 ♂ 11 ♀, 30-IX au 15-XII-1966 ; Parkading, 2 ♀, 12 et 27-X-1964 ; Thong Pheng, 11 ♂ 2 ♀, 30-VIII au 30-XI-1965 ; id. 26 ♂ 14 ♀, 30-VIII au 30-XI-1966 ; Sayabourri, 1 ♀, 1966 ; Ban Van Heua, 4 ♂ 4 ♀, 15-VII au 15-XII-1965 ; id. 8 ♂ 9 ♀, 15-VII au 15-XII-1966 ; id. 10 ♂ 2 ♀, 15-VIII au 30-X-1967. Réc. J.A. Rondon. In-coll. H.E. Bomans, P. Ratti et J.P. Lacroix.

Nous présentons un schéma des têtes, des pronotum et des appareils génitaux mâles des deux espèces. Cela permet de se rendre compte immédiatement des nettes différences existant entre *Neolucanus similis* et *parryi*.

NOTICES TAXONOMIQUES*

par S.G. KIRIAKOFF**

A. Spécimens-types perdus :

D^r. E.C.G. Pinhey, National Museum of Rhodesia, Bulawago, nous informe que les spécimens-types des espèces ci-dessous, décrites par nous dans les *Bull. Ann. Soc. r. belge Ent.*, 1975, 111 : 197-203 : *Heraclia jacksoni*, *Pseudagoma pinheyi* et *Brephos sublata* (Lepidoptera : Agaristidae) ont été perdus au cours de leur voyage de retour.

B. Note taxonomique :

D^r. I.W.B. Nye, British Museum (Natural History), nous fait remarquer que *Agarista eriopis* HERRICH-SCHAEFFER est le type du genre *Pristoceraea* KARSCH, 1895. De ce fait *Eriopana* KIRIAKOFF et VIETTE (espèce-type *Agarista eriopis* HERRICH-SCHAEFFER), 1974 devient un synonyme junior de *Pristoceraea*.

D'autre part, le nom générique *Charitosemia* KIRIAKOFF, 1955, *Bull. Inst. r. Sci. nat. Belgique*, 31(69) : 1, devient disponible pour les espèces *Pristoceraea albigutta* KARSCH, 1896, et « *Protoceraea* » *geraldi* KIRBY, 1896 (espèce-type du genre *Charitosemia*), qui ne sont pas congénériques avec *P. eriopis*.

* Reçu le 4 avril 1976.

** Rijksuniversiteit Gent, Instituut voor Dierkunde, Laboratorium voor Morfologie en Systematiek, K.L. Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent.