

SUMMARY

The author redescibes three *Conostigmus* species from the Baltic amber.

BIBLIOGRAPHIE

- BRUES Ch. T., 1940. — Calliceratidae in Baltic Amber. *Proc. Amer. Acad. Arts & Sci.*, 73, 265-269.
 DESSART P., 1977. — Contribution à l'étude des Lagynodinae (Hym. Ceraphronoidea Megaspilidae). *Bull. Ann. Soc. r. belge Ent.*, 113 : 277-319.
 HORN W. & KAHLE I., 1935-1937. — Ueber entomologische Sammlungen. *Ent. Beih. Berlin-Dablem.* 1935, 2 : 1-160 ; 1936, 3 : 161-296 ; 1937, 4 : 297-536.

 ARAIGNEES NOUVELLES
 POUR LA FAUNE DE BELGIQUE*

par J. KEKENBOSCH et L. BAERT**

En procédant à la mise à jour de la liste des Araignées représentées en Belgique, en prélude à la mise en chantier d'un « Catalogue », il est apparu qu'un certain nombre d'espèces, présentes dans les collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, étaient nouvelles pour la faune de notre pays.

Ces nouveautés n'ayant pas fait l'objet de publications, bien que certaines captures soient très anciennes, nous croyons utile de les faire connaître.

Fam. *Clubionidae* :

Agraecina striata (KULCZYNSKI).

Salm-Château : 17.VII.1958, 1 ♀ (leg. et det. J. KEKENBOSCH).

Cette espèce se rencontre dans toute l'Europe centrale, mais également en Grande-Bretagne, en Finlande et en U.R.S.S.

Phrurolithus difficilis WIEHLE.

Modave, au lieu-dit : Camp Romain, 28.IV.1961, 1 ♀ (leg. J. KEKENBOSCH, det. J. BUCAR).

De découverte assez récente (WIEHLE, 1967), cette espèce n'était encore connue que d'Allemagne et de Suisse).

Fam. *Gnaphosidae* :

Zelotes pumilus (C.L. KOCH).

Aywaille : 13.V.1964, sous les pierres, 1 ♂ (leg. et det. J. KEKENBOSCH).

Répartition géographique : Europe centrale.

Fam. *Theridiidae* :

* Déposé le 2 mars 1977.

** Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

Steatoda grossa (C.L. KOCH) = *Teutana grossa* (C.L. KOCH).

Hautes-Fagnes : Baraque-Michel, VII.1879, 1 ♂ et 1 ♀ subad. (leg. et det. L. BECKER).

Il est à signaler que L. BECKER ne cite pas cette espèce dans son travail « Les Arachnides de Belgique », 1896.

Bien qu'il s'agisse de deux exemplaires subad., les dessins ornant l'abdomen ne laissent aucun doute sur la validité de la détermination.

Cette Araignée a une très large répartition géographique, pour ainsi dire cosmopolite. En effet, elle se rencontre dans toute l'Europe, l'U.R.S.S., l'Asie Mineure, l'Anatolie, l'Afrique du Nord, les îles du Pacifique, l'Amérique du Sud et les U.S.A.

Theridion impressum (C.L. KOCH).

Env. de Bruxelles : 1933, 1 ♂ (leg. CANTENS, det. L. GILTAY).

Francorchamps : 15.IX.1911, 1 ♀ (leg. G. SEVERIN, det. E. STRAND).

Cette espèce est présente dans toute l'Europe et en U.R.S.S.

Fam. *Linyphiidae*, subf. *Erigoninae*.

Minyrioloides maritimus J. CROKER et J.R. PARKER.

Décrite d'Angleterre (cf CROCKER & PARKER, 1970), cette espèce avait été déterminée et décrite par J. DENIS (1965) sous le nom de *Minyrioloides kekenboschi*, d'après une ♀ récoltée à Knokke (Zwin) le 8.VI.1961 (leg. J. KEKENBOSCH).

Le manuscrit ayant été perdu ou détruit, lors du décès de ce spécialiste, c'est le nom de *maritimus* qui a la priorité et est seul valable.

La répartition géographique de cette espèce se limite actuellement à l'Angleterre et à la Belgique.

Tapynocyboides pygmaea (MENGE).

Hotton : 10.IX.1929, 1 ♀ (leg. L. GILTAY, det. J. DENIS).

Citée d'Angleterre, de Suisse, de Tchécoslovaquie, d'Autriche, d'Allemagne, de Pologne et d'U.R.S.S.

Trichoncus hackmanni MILLIDGE.

As-en-Campine : 12.V.1958, 2 ♂♂ (leg. J. KEKENBOSCH, det. J. DENIS).

Répartition géographique : Suède, Finlande, France, Suisse, Tchécoslovaquie, Autriche, Angleterre.

Walckenaera mitrata (MENGE).

Grotte de Ramioul : 1-II-1973, 1 ♂ (leg. J.M. HUBART, det. J. KEKENBOSCH).

Répartition géographique : Europe centrale, mais également en Suède, France et Angleterre.

Fam. *Linyphiidae*, subf. *Linyphiinae* :

Centromerus serratus (CAMBRIDGE).

Forêt de Soignes : Rouge-Cloître, 1.X.1941, 1 ♀ (leg. J. KEKENBOSCH, det. J. DENIS).

Sy : 18.IV.1957, 1 ♀ (leg. A. COLLART, det. J. KEKENBOSCH).

Aire de répartition : Angleterre, France, Suisse, Pologne et Allemagne.

Hylyphantes nigrinus (SIMON).

Sy (Vieuxville) : 10.VII.1958, 1 ♀ (leg. J. KEKENBOSCH, det. J. DENIS).

Houyet : 18.VI.1936, 1 ♀ (leg. L. GILTAY, det. J. DENIS).

Hermeton-sur-Meuse : 1.VII.1965, 1 ♂ (leg. M. KERSMAEKERS, det. J. DENIS).

Torgny : 19/20.VI.1957, 1 ♀ (leg. J. KEKENBOSCH, det. J. DENIS).

Torgny : 27.V.1958, 1 ♂ (leg. E. DERENNE, det. H. CASEMIR).

Villers-devant-Orval : 11.VI.1971, 1 ♀ (leg. Y. DANSART, det. R. JOCQUÉ).

Treignes : 13.VII.1975, 1 ♀ (leg. et det. M. RANSY, coll. M. RANSY).

Répartition géographique : Europe centrale, Italie et U.R.S.S.

Meioneta simplicatarsis (SIMON).

Torgny : 22.VII.1976, dans la mousse, 1 ♀ (leg. et det. M. RANSY).

Cette espèce n'est connue que l'Angleterre et d'Allemagne.

Oreonetides firmus (CAMBRIDGE).

Rivière, Bois Castagne : 30.VII.1955, dans les éboulis rocheux, 2 ♀♀ (leg. G. DEMOULIN, det. J. KEKENBOSCH).

Hotton : 2.IX.1970, 1 ♀ (leg. J.P. SMEEKENS, det. J. KEKENBOSCH).

Cette Araignée était déjà citée d'Angleterre, de France, de Suisse, de Yougoslavie et d'Algérie.