

3. M. A. GRAFTEAUX présente une belle série d'Odonates du département des Ardennes ainsi que plusieurs exemplaires vivants de différentes espèces de *Carabus*, capturés en France, M.M. N. LELEUP et N. RADISIC sont particulièrement heureux de disposer de magnifiques spécimens pour leurs élevages.

4. M. C. VERSTRAETEN, lit la communication suivante :

Euthyneura myrtilli MACQUART (Diptera Empididae) Belg. n. sp.

par P. GROOTAERT

L'I.R.S.N.B. possède dans ses collections la seule femelle de cette espèce capturée en Belgique par A. COLLART le 26 juin 1949 à Fraineux dans les Hautes Fagnes.

Cet exemplaire, privé de ses antennes, peut-être confondu avec l'espèce *E. simillima* STROBL sensu FREY (1956) étant donné que les soies scutellaires et les métatarses postérieurs sont très foncés. Mais la comparaison des diagnoses de FREY (1956) et de COLLIN (1961) permet d'affirmer qu'il s'agit bien de *E. myrtilli* MACQUART. Par ailleurs, selon COLLIN (1961), la femelle de *E. simillima* décrite par FREY, serait, en considérant la variabilité de celle-ci, une *E. myrtilli*.

Le genre *Euthyneura* MACQUART, comprenant cinq espèces paléarctiques, est extrêmement peu représenté en Belgique. Une seule femelle de *E. gyllenbali* ZETTERSTEDT a été capturée le 15 mai 1905 à Tervuren (Brabant) par F. MEUNIER (1905). Il nous a été impossible de vérifier l'identification mais celle-ci semble correcte : c'est la seule espèce du genre qui possède une tache foncée au milieu de la partie antérieure de l'aile, s'étendant souvent telle qu'une bande transversale.

Selon FREY (1956), *E. myrtilli* abonde dans les bois de Finlande, sur *Myrtillus* ; d'autre part, elle se répartirait en Europe centrale et boréale. COLLIN la dit présente dans toute l'Angleterre mais plus fréquente en Ecosse. En Belgique, *E. myrtilli* constitue peut-être une relique de la période glaciaire ce qui expliquerait sa rareté.

Bibliographie

- COLLIN J.E., 1961. — *British flies. Empididae*. University Press Cambridge, 782 p.
 FREY R., 1956. — In E. LINDNER : *Die Fliegen der paläarktischen Region*. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung Stuttgart : 400-639.
 MEUNIER F., 1905. — IIe supplément aux chasses diptérologiques des environs de Bruxelles. *Ann. Soc. Scient. Brux.*, 29 : 291-294.

5. Au nom de notre collègue, M. N. MAGIS, dans l'impossibilité d'assister à nos réunions mensuelles, M. C. VERSTRAETEN, lit la communication suivante :

Apports à la chorologie des Hyménoptères Symphytes de Belgique

par N. MAGIS

- Pamphilius sylvaticus* (L.) (Pamphiliidae).
Beaufays, 4.VI.1980, 1 ♀ récoltée par L. POELMAN en « fauchant » l'herbe d'un terrain en jachère. L'espèce n'avait plus été enregistrée dans le carré FS 80 après 1949. (cf. carte 267 de l'Atlas provisoire des Insectes de Belgique établie par F. WOLF en 1971).
- Xeris spectrum* (L.) (Siricidae).
Bien que sensiblement moins rare que le laisse supposer sa présence dans les collections, nous signalons 1 ♂ de l'espèce pris à Arimont par J. BARLET, le 3.VIII.1980.
L'individu était posé sur l'herbe, dans un état d'engourdissement manifeste. Première mention de l'espèce dans le carré KA 98 (cf. carte 64 de l'Atlas provisoire des Insectes de Belgique établie par F. WOLF en 1970).
- Trachelus troglodyta* (F.) (Cephalidae).
Rocherath (val. du Jansbach), 29.VI.1980, 1 ♂ par temps pluvieux, fixé parallèlement à l'axe d'un chaume de graminée ; même lieu, 4.VII.1980, 1 ♂ au fauchoir, dans la strate herbacée de la plaine alluviale.
Ces deux observations constituent probablement les premières données circonstanciées sur cette espèce, citée de Belgique sans autre précision par le Dr. JACOBS (*Ann. Soc. ent. Belgique*, 28, 1884 : XXXIII) d'abord et ensuite par A. CRÈVECOEUR et P. MARÉCHAL (*Bull. Ann. Soc. ent. Belgique*, 73, 1933 : 145). L'absence d'indication de localité explique sans doute pourquoi cette espèce ne figure pas dans le relevé des Céphides que WOLF a publié en 1968 (*Bull. Rech. Agron. Gembloux, N.S.*, III : 754).
- Arge fuscipes fuscipes* (FALLEN) (Argidae).
Après examen de la collection P. MARÉCHAL, il apparaît que les renseignements relatifs à *A. fuscipes* publiés par A. CRÈVECOEUR et P. MARÉCHAL (*Bull. Ann. Soc. ent. Belgique*, 78, 1938 : 506) se rapportent à la sous-espèce nominale (1). N'ayant pas revu le matériel précité, WOLF a préféré ne pas inclure ces références dans la carte d'*Arge fuscipes fuscipes* qu'il a dressée en 1971 pour l'Atlas provisoire des Insectes de Belgique (carte 480).
Les carrés ES. 92. FS. 03, FS. 60 et FS. 81 de cette carte portent chacun le sigle « observations antérieures à 1950 ». Compte tenu des données de la collection MARÉCHAL, le même symbole doit être posé dans les carrés FS. 80 (Tilff), FR. 80 (Etalle) et GR. 00 (Arlon). La capture d'une ♀ à Sy/Ourthe (FR. 78) le 15.VI.1980 par J. BARLET offre donc un notable intérêt.
- Cimbex femorata* (L.) (Cimbicidae).
Ombret-Rausa, 29.V.1979, 1 ♀ trouvée posée sur un tronc de bouleau ; Hamois (Pickheim), 4.VI.1980, 1 ♂ trouvé par J. BARLET dans la végéta-

(1) La femelle citée de Falaën n'a pas été retrouvée.