

Résumé

Les caractères individuels de l'aire latérale du pétiole d'*Aphidius frumentarius* LATTEUR se répartissent sur sept zones. Leur description permet de supputer que certains de ces caractères pourraient servir de base à la description de sous-espèces à condition d'étudier un plus grand nombre d'individus répartis sur un territoire plus vaste.

Summary

The individual characteristics of *Aphidius frumentarius* LATTEUR petiole lateral area are classified into seven zones. Their description enable one to suppose that some of those characteristics may lead to the description of possible subspecies. This requires the study of a greater number of individuals living on a wider territory.

Bibliographie

LATTEUR G. et RASSEL A. — *Aphidius frumentarius* n.sp. LATTEUR (Hymenoptera, Aphidiidae), parasite de divers pucerons des céréales (Homoptera, Aphididae) en Belgique. *Bull. Ann. Soc. r. belge Ent.*, 115 : 311-322.

ACCOURCISSEMENT CONSIDERABLE DES STADES PREIMAGINAUX ET SEX-RATIO ANORMALE DANS UN ELEVAGE DE **CHRYSOCARABUS AURONITENS** **AURONITENS PUTZEYSI MORS**

par N. LELEUP

Corrigendum

Dans mon étude parue dans cette même revue (vol. 116, X-XII, p. 270) à la 16^{ème} ligne se situe une erreur de dates nécessitant la correction suivante :

Lire « ... soit entre le 26 mai et le 9 juin ... » au lieu de « ... soit entre le 14 avril et le 5 mai ... ».