

7. M. A. RYCKAERT présente la communication suivante :

Myolepta vara PANZER Belg. n. sp.
et *Helophilus (Parhelophilus) consimilis* MALM
(Diptera Syrphidae)

Il y a lieu d'ajouter ces 2 espèces rares au Catalogue des Diptères Syrphidae de Belgique publié par M. LECLERCQ en 1955 en raison de captures inédites faites respectivement à Tervuren (Brabant) le 8.VI.50, 1 ♀ et à Overmere (Oost-Vlaanderen) le 26.VI.44, 1 ♀.

Myolepta vara n'est pas représentée dans les collections de diptères de l'I.R.S.N.B. Du genre *Myolepta* seule l'espèce *luteola* GMEL. s'y trouve représentée par 2 spécimens en provenance de Groenendael 1878 (Jacobs) et de Ghlin 1905 (Guillaume).

Myolepta vara est connue de l'Europe centrale et méridionale. « Les larves éristaliformes vivent dans le bois décomposé ou dans les cavités plus ou moins humides de différentes espèces d'arbres » (Séguy).

Quant à *Helophilus (Parhelophilus) consimilis*, une seule capture nous est connue en provenance de Hoogstraten (Anvers) 1.VI.18 (G. Severin).

7. En l'absence de M. N. MAGIS, excusé, notre secrétaire présente la communication qui suit :

**Apports à la chorologie des Hyménoptères Symphytes
de Belgique II.**

par Noël MAGIS

7. *Arge berberidis* SCHRANK (Argidae).

F. WOLF (Bull. Rech. agr. Gembloux, N.S. III, 1968 : 763) en se référant à la littérature et en procédant à l'inventaire des collections de l'IRSNB et de la Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux, a recensé 14 exemplaires de cette *Arge*. Les stations où elle a été trouvée se situent dans six carrés du réseau U.T.M. seulement (Atlas provisoire des Insectes de Belgique, 1971 : carte 474 dressée par WOLF). Deux de ces carrés sont porteurs du sigle « observations postérieures à 1949 ».

Les données originales suivantes complètent le dossier de cette espèce indiscutablement rare en Belgique : collection Paul MARECHAL : 1 ♂ Comblain-la-Tour : 1.VIII.1934 (FR. 89) et 1 ♂ Spa : 25.V.1942 (GR.09). En plus, 1 ♀ Erezée : 31.V.1981 (FR. 87). Cette récolte, faite par notre collègue M. J. Barlet, est donc d'un notable intérêt.

8. *Endelomyia aethiops* (F.) (Tenth. Blennocampinae).

A. CREVECOEUR et P. MARECHAL (Bull. Ann. Soc. ent. Belgique, 78, 1938 : 493) ont suggéré la probabilité de la présence en Belgique de cette espèce, classée parfois dans le genre *Caliroa* O. COSTA.

Leur hypothèse est confirmée par une récolte de L. Poelman faite à Beaufays le 1.VI.1981. Cette femelle s'était noyée dans une piscine installée dans un jardin.

Les mâles étant excessivement rares, nous signalerons donc un exemplaire trouvé dans la strate herbacée d'un coupe-feu, en périphérie de la Fagne de Clefaye (Robertville), le 9.VI.1980.

A notre connaissance, aucune mention certaine n'avait encore été publiée sur cette espèce.

9. *Caliroa cinxia* (KLUG) et *varipes* (KLUG) (Tenth. Blennocampinae).

H. CHEVIN (Bull. Soc. ent. France, 79, 1974 : 158-165) a mis en évidence les caractères qui, par leur stabilité, distinguent ces deux espèces sans ambiguïté.

Nous avons revu l'exemplaire (♀) signalé de Logne par P. MARECHAL (Rev. mens. Soc. ent. namuroise, 1923, n° 3 : 15) sous le nom d'*Eriocampoides varipes* KLUG et repris ensuite comme *Caliroa varipes* (A. CREVECOEUR et P. MARECHAL, loc. cit.)

Tous les caractères diagnostiques du spécimen se rapportent en réalité à *Caliroa cinxia*.

Un *C. varipes*, cette fois authentique, a été trouvé récemment : 1 ♂ Rocherath (vallée du Jansbach) : 4.VII.1980, dans l'herbe, le long d'un sentier forestier.

10. *Tenthredo trabeata* KLUG, Belg. n. sp. (Tenth. Tenthredininae).

Cette belle tenthredine a été découverte à Rocherath, lors de l'excursion annuelle de la Société du 14.VI.1980. Il s'agit d'une ♀ prise dans la strate herbacée de la chênaie secondaire qui surplombe le vallon du Tröglichtenbach.

2 ♂ et 1 ♀ y ont été observés à nouveau le 4.VII.1980 ; enfin, le 26.V.1981, dans le même site, une ♀ a été vue butinant une ombelle de *Meum athamanticum* JACQ.

Cette espèce présente une distribution nettement montagnarde en Europe Centrale. Elle a été observée une fois à Heiderscheid au Grand Duché de Luxembourg (J. PASTEELS, Arch. Inst. Grand-Ducal Lux., 24, 1957 : 74). Avec Rocherath, cette dernière localité marque indiscutablement la limite occidentale de son aire de distribution.

8. M. M. RANSY présente la communication suivante :

**Liste des araignées capturées dans les Marais de Sècheval
(Ardennes) lors de l'excursion annuelle
de la Société royale belge d'Entomologie (13 juin 1981)**

Toutes les récoltes et les déterminations sont de l'auteur.

DITYNIDAE

Dictyne arundinacea (L.), 1 ♂

CLUBIONIDAE

Clubiona reclusa (CAMBR.), 2 ♀♀

ANYPHAENIDAE

Anypaena accentuata (WALCK.), 1 ♀

THOMISIDAE

Misumena vatia (CL.), 1 ♀ ; *Philodromus collinus* C.L.K., 1 ♀