

- localité inédite: Seraing (Vecquée): 22.III.1918, 1 ♂ (réf. UTM: MOMR FS.70)

- données supplémentaires pour la maille MOMN FS.74: 1 ♀ Munsterbilzen: 31.V.1890 et 1 ♀ Genk: 30.V.1895.

Comme ceux des autres Pamphiliidae, les adultes sont très actifs, volent haut et se posent peu. En outre, l'espèce est très printanière. Ces différents facteurs expliquent les faibles captures d'une espèce dont la rareté pourrait être plus apparente que réelle, au moins en Campine où les peuplements de pins couvrent encore de grandes étendues.

24.- *Cimbex lutea* (LINNE) (Cimbridae)

1 ♀ Muno: IX.1982 (coll. P.L.G. BENOIT).

La récolte de notre collègue est d'un grand intérêt. Elle représente, en effet, la première observation de l'espèce depuis 1945 (F. WOLF, *Bull.Rech.agr.Gembloux*, N.S. 1(2), 1966:332-341), dans une maille du réseau UTM (MOMU FR.50) où elle n'avait pas été repérée autrefois (*Atlas provisoire des Insectes de Belgique*, carte 247 dressée par F. WOLF).

25.- *Tenthredo acerrima* BENSON (Tenthredinidae, Tenthredininae)

Cette espèce, dont les larves vivent sur le lotier corniculé, appartient au complexe "*arcuata - schaefferi*"; elle a été créée par BENSON suite au démembrement de *T. arcuata* FÖRSTER.

R.B. BENSON (*Proc.r.ent.Soc.Lond. (B)*, 28(7-8), 1959: 93-102) cite la Belgique dans l'aire de répartition de l'espèce mais ne donne aucune indication des stations. A ma connaissance, cette lacune n'a pas été comblée; c'est pourquoi je crois utile de mentionner les récoltes suivantes :

1 ♀ Muno: 23.VIII.1982 (MOMU FR.50); 1 ♀ Sainte-Cécile: 21.VIII.1982 (MOMU FR.61) (coll. P.L.G. BENOIT); 1 ♀ Petit-Han: 22.VIII.1982 (MOMU FR.77) (coll.Inst.Zool.Univ.Liège).

La révision des exemplaires classés "*arcuata*" dans les différentes collections ne manquera certainement pas de fournir d'autres indications chronologiques, attestant une distribution plus vaste.

*T. acerrima*, en effet, ne paraît pas rare dans des régions voisines de notre pays: Grand-Duché de Luxembourg (J. PASTEELS, *Arch.Inst. Grand-Ducal Lux.*, 24,1957:72), Val d'Oise (J. LACOURT, *L'Entomol.*, 33(3),1977:125), Yvelines (H. CHEVIN, *Bull.Soc.versaillaise Sc.nat.*, Sér.4, 8(2), 1981:55).

26.- *Tenthredo procera* KLUG (Tenthredinidae, Tenthredininae)

1 ♂, 1 ♀ Heusden: 20.VI.1970 (MOML ES.55) (coll. P.L.G. BENOIT).

En se référant au catalogue de A. CREVECOEUR et P. MARECHAL (*Bull. Ann.Soc.ent.Belgique*, 78,1938: 479), il s'agit de la troisième récolte de l'espèce en Belgique, la dernière datant de 1938. Les trois stations connues actuellement se situent au nord du sillon Sambre-et-Meuse.

27.- *Hartigia nigra* (HARRIS) (Cephidae)

D'après l'inventaire établi par F. WOLF (*Bull.Rech.agr.Gembloux*, N.S., III(4), 1968:754-762), *Hartigia nigra* (HARRIS), avec 22 exemplaires recensés, apparaît néanmoins comme la plus fréquente des trois espèces vivant en Belgique.

Données additionnelles: 1 ♂, 3 ♀ Beaufays: 12 et 28.V., 7 et 19.VI.1979, chaque fois par fauchage au filet d'un grand massif d'orties; 1 ♂ Boma (gare): 18.V.1982, dans un taillis de feuillus (première observation dans la maille MOMU FR.78 du réseau UTM).

28.- *Calameuta filicornis* EVERSMANN (Cephidae)

Selon les mêmes sources bibliographiques, avec 17 exemplaires relevés dans 14 stations, *Calameuta filicornis* EVERSMANN est quatre fois moins fréquente que *C. pallipes* KLUG.

Données additionnelles et nouvelles pour le carré MOMR FS.80: 13 ♂ et 3 ♀ Beaufays: entre le 2 et 8.VI.1980, sur ortie et sur rumex; 1 ♂ 2 ♀ Tilff (Cortil): 31.V.1982, plantes basses colonisant un remblai récent.

Ces derniers renseignements mettent en question la représentativité de l'échantillon actuellement disponible. Des informations complémentaires sont donc absolument nécessaires pour établir correctement le statut de *C. filicornis* dans les différentes régions naturelles de notre territoire.

J. M. J. BEAULIEU présente une très longue suite de coléoptères remarquables capturés surtout dans la vallée du Viroin et lit la communication qui suit :

Quelques captures de Coléoptères au cours des années  
1980, 1981 et 1982

SCARABAEIDAE

*Onthophagus vacca* ab. *sublineolatus* (MULS): Villers-en-Fagne (Namur), 3.VI.1980 2 ex.

## CARABIDAE

*Trichotichnus nitens* (HEER): Rochehaut (Lux.), 29.V.1981, 1 ex.

*Bradytus fulvus* DEGEER: Virton, vallée du Rabais (Lux.), 12.VIII.1981, 2 ex.

*Bradytus consularis* DUFTSCHMIT: Virton, vallée du Rabais, 12.VIII.1981, 1 ex.

## CURCULIONIDAE

*Mecinus Heydeni* (WENCKER): Porcheresse (Lux.), 10.VIII.1981, 1 ex. s/ *Linaria vulgaris* (MILL.)

*Brachonyx pineti* (PAYK.): Treignes (Namur), 16.V.1982, 3 ex. s/ *Pinus silvestris* (L.).

*Trachyphloeus bifoveolatus* (BECK): Treignes, 29.V.1981, 1 ex.

*Sitona crinitus* (HERBST): Houwaart (Brabant), 25.III.1982, 2 ex. (Mme Ch. Bernard leg.).

*Pissodes pini* (L.): Vierves (Namur), 9.V.1981, 1 ex. s/ *Pinus silvestris* (L.).

*Zacladus affinis* (PAYK.): Treignes, 24.V.1981, 1 ex. s/ *Geranium*. Espèce assez commune dans l'est du pays, en altitude.

*Magdalis violacea* (L.): Treignes, 13.VII.1980, 1 ex. s/ *Pinus silvestris* (L.).

*Anthonomus bituberculatus* (THOMSON): Dourbes (Namur), 13.IV.1980, 1 ex.

*Elleschus bipunctatus* (L.): Peissant (Hainaut), 12.IV.1981, 1 ex. s/ *Salix*.

*Gymnetron melanarium* (GERM.): Treignes, 9.V.1981, 3 ex. s/ *Veronica*.

*Pachytychius haematocephalus* (GYLL.): Treignes, 5.VII.1981, 2 ex. - 4.VII.1982, 1 ex. s/ *Lotus corniculatus* (L.).

*Mecinus janthinus* (GERM.): Treignes, 9.V.1981, 1 ex. s/ *Linaria vulgaris* (MILL.).

*Apion (Eutrichapion) melancholicum* (WENCK.): Vierves, 22.VIII.1982, 1 ex. s/ *Lathyrus pratensis* (L.).

*Apion* (s. str.) *astragali* (PAYK.): Mazée (Namur), 29.VIII.1982, 5 ex. s/ *Astragalus glycyphyllos* (L.).

Ces deux espèces sont à ajouter aux listes des années précédentes (*Bull. Ann. Soc. r. belge Ent.*, 117, 1981, p. 10 et 118, 1982, p. 20).

## ANOBIIDAE

*Enicobius nigrinus* (STM.): Treignes, 13.VII.1980, 1 ex.

## CERAMBYCIDAE

*Callidostola aenea* (DEGEER): Yves-Gomezée (Namur), 28.V.1981, 1 ex.

*Agapanthia violacea* (F.): Treignes, 6.VII.1980, 1 ex.

*Phytoecia cylindrica* (L.): Loverval (Hainaut), 8.VI.1980, 1 ex.

*Obrium brunneum* (F.): Treignes, 29.V.1980, 1 ex.; Yves-Gomezée, 28.V.1981, 1 ex.

## CHRYSOMELIDAE

*Longitarsus jacobaeae* (WATH.): Knokke (W.-VI.), 12.IX.1982, 2 ex.

*Chaetocnema subcoerulea* KUTSCH: Graide (Namur), 13.VIII.1982, 6 ex. sur prairie marécageuse.

*Phyllotrotica quadrimaculata* (L.): Graide, 13.VIII.1982, 1 ex.

*Chrysomela hyperici* v. *previgna* (WEISE): Romerée (Namur), 20.VI.1982, 1 ex. (variété noire).

*Frasocuris juncei* (BRAHM): Yves-Gomezée, 9.V.1982, 2 ex. s/ *Veronica beccabunga* (L.).

4. Le Dr. F. LECHANTEUR présente quelques Coléoptères Nitidulidae africains et lit la communication suivante :

A propos des *Ecnomaeus* d'Afrique

Le genre *Ecnomaeus* ERICHSON constitue une lignée bien homogène de la famille des Nitidulidae, représenté en Afrique intertropicale par une série d'espèces que j'ai eu l'occasion d'étudier en 1955 et à laquelle j'avais ajouté trois espèces nouvelles découvertes dans l'ex-Congo Belge (actuellement le Zaïre).

Ce genre est encore représenté dans la région indienne par une espèce décrite de l'Himalaya par REITTER en 1873 ainsi que par une seconde récoltée en 1908 par GROUVELLE.

Les *Ecnomaeus* présentent des affinités plus ou moins grandes avec les *Epuraea* ERICHSON bien connus et largement répandus dans la région paléarctique. Comme pour certains de ceux-ci, il est probable que le comportement biologique soit également proche.