

membres afin que leur enquête soit basée sur le maximum de données.

Communication / Mededelingen

1. M. E. GOOSSENS nous montre une aberration et illustre la variabilité de Melitae didyma en faisant passer des exemplaires mâles et femelles de localités diverses.

2. M. G. BOOSTEN présente la communication suivante :

Coléoptères de Belgique XIII

par G. BOOSTEN

CRYPTOPHAGIDAE

Détermination et nomenclature suivant FREUDE, HARDE et LORSE "Die Käfer Mitteleuropas" et R. DAJOZ "Les espèces françaises du genre "Cryptophagus".
Détermination du genre Cryptophagus par G. COULON.

Telmatophilus typhae (FALL.) : Bra 13.VI.1977 1 ex. (M. ROUARD) ; Chimay (Etang du Merdeux) 30. VII. 1980 1 ex. (M. ROUARD) ; Forêt de Soignes 6.VII.1946 1 ex. (LEGEST) ; Sautin 1978 1 ex. (M. ROUARD).

Telmatophilus schoenherri (GYLL.) Genk (R. N. - De Maten) 16.VII.1973 1 ex. (M. ROUARD)

Cryptophagus abieti (PAYK.) : Ochamps (R. N. Fagne Roumont) 8.VIII.1975 3 ex.

Cryptophagus acutangulus GYLL. : Ath 15.V.1966 1 ex.; Frasnes - Iez - Couvin 23.VI.1974 1 ex.; Muno (Prieuré) 25.VII.1980 1 ex.; Treignes 25.V.1977 1 ex.

Cryptophagus populi PAYK. : Chimay (Bois Robert) 1.XI.1979 1 ex. (M. ROUARD)

Cryptophagus dentatus HERBS. : Ath 7.II.1970 1 mâle ; Ath (Bois du Roi) 15.IV.1968 1 mâle, Bruelette (R. N. Bolignies) 2.IV.1983 1 mâle, 12.VII.1983 1 mâle ; Bruxelles (Haren) 1.VII.1977 4 ex., 1 mâle, 1 femelle ; Buzenol 13.VIII.1979 1 femelle ; De Panne (R. N. - Westhoek) 25.VII.1979 1 mâle, 6 ex.; Muno 6.VII.1978 1 mâle, Nieuwpoort (R. N. Ijzermonding) 5.VII.1982 1 mâle ; Postel (R. N. - Ronde Put) 10.VI.1980 1 mâle ; Rossignol (R.N. - Vague des Gomhets) 12.VIII.1979 1

mâle.

Cryptophagus distinguendus STURM : Ath (Bois du Roi) 20.IV.1968 1 ex.

Cryptophagus scanicus (L.) : Chimay (Bois Robert) 15.IV.1980 1 ex. (M. ROUARD) ; Cul - des - Sarts (Tourbière) 7.IV.1975 2 ex., 1 mâle ; Lichtaart (R. N. Snepkensvijver) 3.VI.1978 1 mâle ; Sautin X.1978 1 ex. (M. ROUARD) ; Vilvorde 23.III.1971 1 ex. (J. P. SMEEKENS).

Cryptophagus lycoperdi (HERBST) : Boitsfort 28.IX.1935 1 ex. (G. FAGEL I. R. S. N. B.) ; De Panne (R. N. - Westhoek) 9.VI.1973 1 ex. ; Eben - Emael (R. N. - Heyoulle) 28.VI.1975 1 ex. ; Everberg 17.VIII.1943 1 ex. (F. G. OVERLAERT) ; Forêt de Soignes (Bspinette Centrale) 28.VIII.1945 1 ex. (G. FAGEL - I. R. N. S. B.).

Cryptophagus affinis STURM : Bellefontaine 30.VII.1980 1 ex.; Chimay (Bouloye) 5.VIII.1979 1 ex.; Muno (Prieuré) 25.VII.1978 1 ex.; Nieuwpoort (R. N. - Ijzermonding) 5.VIII.1979 1 ex.

Cryptophagus setulosus STURM : Ath (jardin) 11.VII.1983 1 ex.; Bruelette (R. N. Bolignies) 12.VII.1983 1 femelle ; De Haan (R. N. Kijkuit) 25.VIII.1974 1 ex.; Muno (Prieuré) 28.VII.1981 1 femelle Torgny (R. N. Mayné) 14.VII.1975 1 ex.;

Cryptophalus labilis ER. : Knokke (R. N. Het Zwin) 6.VIII.1969 1 ex.; Lessines (minoterie) 26.VI.1983 1 mâle.

Cryptophagus fallax BALFOUR : Chimay (Bois Robert) 6.VI.1980 1 ex. (M. ROUARD).

Cryptophagus villosus HEER : Cul - des - Sarts (Tourbière) 21.VI.1975 1 ex.; Dourbes 14.VIII.1971 1 ex.; Fontenoille 29.VII.1973 2 ex., 21.VII.1975 2 ex., 23.VII.1976 1 ex.; Muno 1.VII.1978 1 ex.; Muno (gare) 13.VII.1976 1 ex.; Muno (R. N. Roche Appel) 14.VII.1977 1 ex.; Nismes (R. N.) 27.VII.1979 1 ex.; Rossignol (R. N. Vague des Gomhets) 30.VII.1980 2 ex.; Ste - Marie (Croix - Rouge) 14.VII.1973 1 ex., 18.VII.1976 1 mâle, 16.VII.1973 1 ex.

Cryptophagus pilosus GYLL. : Bruelette (R. N. Bolignies) 10.VII.1982 1 ex.

Cryptophagus pubescens STURM : Rossignol (R. N. Vague des Gomhets) 12.VIII.1979 1 ex.; Silly (Forêt domaniale) 27.VIII.1972 1 ex.; Torgny (R. N. [17.VII.1977 2 ex.

Cryptophagus pospositus SAHLB. : Ath (jardin) 7.VI.1980 1 femelle ; Bruelette (R. N. Bolignies) 1.VI.1983 1 femelle ; Chimay (Bois Robert) 5.XII.1979 1 mâle (M. ROUARD) ; Lahamaide (Bois Lefebvre) 27.V.1973 1 femelle ; Lessines (minoterie) 26.VI.1983 3 mâles, 1 femelle ; Muno (Prieuré) 10.VIII.1979 1

femelle, 16.VII.1983 1 mâle.

Cryptophagus pseudodentatus BR. : Muno (Prieuré) 23.VIII.1980
1 mâle.

Cryptophagus saginatus ER. : Lessines (minoterie) 26.VI.1983 1
femelle.

Anterophagus nigricornis (F.) : Muno (R. N. Roche à l'Appel)
14.VII.1976 1 ex.; Plainevaux 1.VIII.1930 1 ex. (J. Depré - I.
R. S. N. B.); Rossignol (R. N. - Vague des Gomhets) 24.VII.1977
1 ex.

Anterophagus pallens (OL.) : Muno (R. N. R. - Roche à l'Appel)
21.VII.1976 1 ex.; Suxy 17.VII.1974 1 ex.; Rossignol (R. N. -
Vague des Gomhets) 12.VII.1977 1 ex.

Anterophagus canescens GROUV.: Lanaye 6.VII.1928 1 ex. (J.
Depré I. R. N. S. B.).

3. Au nom de Monsieur LECLERCQ, excusé, M. P. GROOTAERT
présente la communication suivante :

Présence de Haematopota scutellata O. M. C.

en Belgique (Diptera, Tabanidae)

Marcel LECLERCQ

Récemment nous avons trouvé un exemplaire de
Haematopota scutellata OLSUFJEV, MOUCHA, CHVALA, 1964, dans les
collections de la Faculté des Sciences Agronomiques de l'Etat,
Zoologie générale et Faunistique, Gembloux.
C'est une nouvelle espèce pour la faune de Belgique et du
BENELUX. Ce travail est notre 6 ème contribution à la
connaissance des Tabanides de Belgique (LECLERCQ, 1951, 1952,
1959, 1964, 1965) et un complément pour le BENELUX (LECLERCQ,
1957, 1967a, TIMMER, 1980).

Clé dichotomique des Haematopota femelles du BENELUX

1. Antennes longues et minces, article I long, nettement plus de
3 1/2 fois plus long que large, presqu' aussi haut que la
hauteur du front, cylindrique. Groupe d' italica MEIGEN

2

- Antennes courtes, article I court, moins de 3 1/2 fois plus
long que large, plus court que la hauteur du front
, habituellement conique ou ovale, plus ou moins cylindrique

chez subcylindrica PANDELLE. Groupe de pluvialis (LINNE)

3

2. Article I noirâtre gris mat pruineux (plus ou moins brillant
chez italica var. nigrocornis GOBERT) avec un
étranglement à l'apex discal. Tache noir velouté entre les
antennes toujours présente. Bande frontale nettement plus
large que haute. Thorax avec bandes latérales non continues,
interrompues à la suture par des taches triangulaires
blanchâtre. Abdomen : taches sublatérales grisâtres
absentes ou indistinctes sur les tergites 2 à 4
italica MEIGEN, 1804.

3. Antennes entièrement noires, article I brillant, très
fortement gonflé ovale, sans étranglement à l'apex
discal.

crassicornis WAHLBERG, 1848.

- Antennes non entièrement noires, articles I noir brillant
sur le 1/4 apical et grisâtre pruineux au moins sur le 1/4
basal.

4

4. Antennes : article I gris noir partiellement mat, très
nettement étranglé à l'apex discal avec une bosse avant
la constriction.
Espèce gris olivâtre

pluvialis (LINNE, 1761).

- Antennes : article I conique à cylindre avec une
légère constriction à l'apex distal.

5

5. Espèce noirâtre. Scutellum avec une large tâche gris
blanchâtre. Taches frontales noires très larges atteignant
la callosité basale et les bords oculaires.
scutellata OLSUFJEV, MOUCHA, CHVALA, 1964.

- Espèces grisâtre clair. Scutellum sans tache évidente.
Taches frontales noires plus petites, isolées de la
callosité basale et des bords oculaires.

6

6. Antennes : article I plutôt cylindrique, noir brillant mais
à pruinosité gris blanchâtre très dense notamment au
bord supérieur et sur plus de la 1/2 basale. Fémurs gris
noirâtre. Abdomen : taches sublatérales petites sur les
tergites 3 à 7, parfois sur le tergite 2
subcylindrica PANDELLE, 1883.

- Antennes : article I plutôt ovale, noir brillant sur 1/3 -
1/4 apical et plus ou moins brun face interne basale et bord