

la côte (Heist, Knoke). Cette araignée n'a plus été mentionnée depuis.

D. erythropus (SIMON, 1881) : 1 fem., capturée à Gimnée-Doische le 23.VI.1935. A cette seule capture se limite actuellement la présence de cette espèce dans notre pays.

D. prona (MENGE, 1868) : De Panne, au fond d'un trou de lapin, 26.V.1912 (G. SEVERIN leg.); Ozo-Izier, 1 fem. sous les pierres du coteau calcaire, 6.VI.1958 (J. KEKENBOSCH, leg.).

D. tristis (HAHN, 1831) : Brabant, Bois de la Cambre (Bruxelles) (L. BECKER, 1896); Limelette, 24.V.1961, sur bruyère (J. KEKENBOSCH, leg.); Luxembourg : Muno, 1 mâl. par fauchage le 14.VI.1956; Domaine militaire de Lagland (Arlon-Fouches), 2 mâl. sur bruyère dans clairière d'un bois, 11.VI.1978.

D. coracina (C. L. KOCH, 1837); voir ci-dessus.




Fig.1 : Répartition des espèces du genre *Dipoena* (Theridiidae en Belgique : 1.*D. melanogaster*; 2.*D. erythropus*; 3.*D. prona*; 4.*D. tristis*; 5.*D. coracina*.

BIBLIOGRAPHIE

- BECKER, L. 1882. Les Arachnides de Belgique (1 ère partie). -Ann. Mus. r. Hist. nat. Belg., 10 : 1-246, pl. I-XXVII.
 BECKER, L., 1896. Les Arachnides de Belgique (2 ème partie). -Ann. Mus. r. Hist. nat. Belg., 12 : 1-127, pl. I-XXV.
 BOSMANS, R., 1978. Faunistique des araignées de Belgique. -Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 114 : 38-49.
 JANSSEN, M., 1980. Spinnenfauna in het natuurreservaat 'De Maten', Genk, Limburg, België. -Stencil de Wielewaal, 43 pp; Kekenbosch, J., BOSMANS, R. & BAERT, L., 1977. Liste des Araignées de la faune de Belgique. -Inst. r. Sc. nat. Belg., Documents de travail n° 11 : 25 pp.
 PALMGREN, P., 1976. Die Spinnenfauna Finnlands und Ostfennoskandiens. VII. Linyphiidae 2. Fauna Fennica 29 : 1-126.
 WIEHLE, H., 1960. Spinnentiere oder Arachnoidea (araneae). XI : Mycrophantidae-Zwergspinnen. Die Tierwelt Deutschlands. 47. Veb Gustav Fischer Verlag, Jena : 620 pp.

2. Op aanvraag van de heren M. POLLET, K. DESENDER en J. P. MAELFAIT die zich lieten verontschuldigen, geeft de secretaris een beknopt verslag van de volgende mededeling.

Coleopterologische mededelingen van het
 Laboratorium voor Oecologie der Dieren,
 Zoögeografie en Natuurbehoud (RUG)

Nummer VI

CARABIDAE (COLEOPTERA) VAN
 VELDEGEM (West-Vlaanderen).

door M. Pollet (*), K. Desender en
 J.-P. Maelfait (+)

Localiteit : Veldegem (West-Vlaanderen) (Grid Ref : ES06, ES16, ES15) (voor verdere verklaring, zie habitaatstypes) (Geo-code : MOMK).

(*) Bursaal van het I.W.O.N.L.

(+) K.L. Ledeganckstraat 35 B-9000 Gent.

Data : 1977-1983

Collecties : Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud

Habitatstypes : A : akkers (ES15, ES16); B : bos (ES15, ES16); BR : spoorwegberm (ES15, ES16); VG : beekbegeleidende graslanden (ES06); GR : graasweiden (ES16); T : tuin en bouwland (ES16).

Vangmethodes : handvangsten (1977 tot 1983)
bodenvallen (1982 tot 1983)

SOORTENLIJST

	A	B	BR	VG	GR	T
Abax parallelepidus FILL. & MITT. 1783		+				
Agonum assimile PAYKULL 1798	+				+	+
dorsale PONTOPIAN 1793				+	+	
fuliginosum PANZER 1809						+
marginatum LINNAEUS 1758						+
moestum DUFTSCHMID 1812	+	+	+		+	
muelleri HERBST 1784	+	+	+	+	+	+
nigrum DEJEAN 1828				+	+	
obscurum HERBST 1784	+	+		+	+	+
ruficorne GOEZE 1777	+			+	+	
viduum PANZER 1797				+		
Amara aenea DE GEER 1774	+	+	+		+	+
anthobia A. VILLA & G.B. VILLA	+		+	+	+	+
apricaria PAYKULL 1790	+					+
communis PANZER 1797	+		+	+	+	+
consularis DUFTSCHMID 1812	+					
familiaris DUFTSCHMID 1812	+	+	+		+	+
plebeja GYLLENHAL 1810	+	+	+	+	+	
praetermissa SAHLBERG C.R. 1827				+		
lunicollis SCHIODTE 1837	+	+	+	+	+	+

similita GYLLENHAL 1810	+	+	+	+	+	+
Anisodactylus binotatus FABR. 1787	+	+	+	+	+	+
Asaphidion flavipes LINNAEUS 1758	+	+	+			+
Badister bispustulatus FABR. 1792	+	+	+	+	+	+
lacertosus STURM 1815	+	+	+	+	+	
sodalis DUFTSCHMID 1812	+	+	+	+	+	
Bembidion dentellum THUNBERG 1787						+
femoratum STURM 1825	+					
guttula FABR. 1792	+	+		+	+	
harpaloides SERVILLE 1821						+
lampros HERBST 1784	+	+	+		+	+
lunulatum FOUCROY 1785	+		+	+	+	+
obtusum SERVILLE 1821					+	+
properans STEPHENS 1838	+					+
quadrimaculatum LINNAEUS 1761	+		+	+	+	+
quinquestriatum GYLLENHAL 1827						+
tetracolum SAY 1823	+	+	+	+	+	+
Bradycellus harpalinus SERVILLE 1821	+					+
ruficollis STEPHENS 1828					+	
sharpi JOY 1912	+	+				+
Calathus erratus SAHLBERG C.R. 1827						+
erythroderus GEMM. & HAR. 1868					+	
fuscipes GOEZE 1777	+	+	+		+	+
melanocephalus LINNAEUS 1758	+	+	+		+	+
piceus MARSHAM 1802		+				+
Carabus auratus LINNAEUS 1761						+
nemorialis MUELLER O.F. 1764						+
purpurascens FABR. 1787		+				
Clivina collaris HERBST 1784						+
fossor LINNAEUS 1758	+		+	+	+	+
Cychrus caraboides LINNAEUS 1758		+				
Demetrias atricapillus LINNAEUS 1758	+	+				+
Dromius agilis FABR. 1787		+				
linearis OLIVIER 1795	+		+	+		
melanocephalus DEJEAN 1825	+					
meridionalis DEJEAN 1825						+
quadrimaculatus LINNAEUS 1758		+		+		+
quadrinotatus PANZER 1801		+				+
Dyschirius globosus HERBST 1784	+					
Harpalus aeneus FABR. 1792	+		+			+
latus LINNAEUS 1758+	+		+			+
rufipes DE GEER 1774+	+		+			+
tardus PANZER 1797	+		+			
Lebia chlorocephala HOFFMAN 1803					+	
Leistus ferrugineus LINNAEUS 1758	+	+	+		+	+

fulvibarbis DEJEAN 1836		+		+
rufescens FABR. 1775		+	+	+
rufomarginatus DUFTSCHMID 181		+		+
Loricera pilicornis FABR. 1775+		+	+	+
Metabletus foveatus FOUCROY 1785			+	
truncatellus LINNAEUS 1761			+	
Nebria brevicollis F.VON WALDHEIM 1828		+	+	+
salina FAIRM. & LABOULBENE 1854		+	+	+
Notiophilus aquaticus LINNAEUS 1758		+		
biguttatus FABR. 1779		+	+	
palustris DUFTSCHMID 1812		+	+	+
rufipes CURTIS 1829			+	
substriatus WATERHOUSE 1833		+	+	
Olisthopus rotundatus PAYKULL 1798			+	
Panagaeus bipustulatus FABR. 1775			+	
Pterostichus cupreus LINNAEUS 1758		+	+	+
diligens STURM 1824				+
madidus FABR. 1775		+		+
melanarius ILLIGER 1798		+	+	+
minor GYLLENHAL 1827			+	+
niger SCHALLER 1783				+
nigrita FABR. 1792		+	+	+
strenuus PANZER 1797		+	+	+
vernalis PANZER 1796		+	+	+
versicolor STURM 1824		+		+
Stenolophus teutonius SCHRANK 1781		+	+	+
Stomis pumicatus PANZER 1796			+	
Synuchus nivalis PANZER 1797		+	+	+
Trechus obtusus ERICHSON 1837		+	+	+
quadristriatus SCHRANK 1781		+		+

In totaal werden 95 soorten Carabidae verzameld, verdeeld over 29 genera.

Naast algemene bos-, akker- en graslandsoorten, alsook voor de streek minder typische oersoorten als *Bembidion dentellum* en *Agonum viduum*, werden eveneens enkele zeldzame soorten gevangen:

-*Cychrus caraboides*, een stenotope loofbossoort, wordt in geheel België steeds in kleine aantallen aangetroffen.

-*Calathus piceus*, eveneens een typische soort voor vrij vochtig Eike-Beukebos, is vooral in laag-en Midden-België verspreid, maar schijnt toch algemener dan door DERENNE (1957) aangegeven.

-*Bradycellus sharpi* wordt door DERENNE (l.c.) en TURIN et al

(1977) als zeldzaam beschouwd; ook deze soort komt voornamelijk in bossen voor.

-Typische heidesoorten als *Amara praetermissa*, *Calathus erythroderus*, *Olisthopus rotundatus* en *Bradycellus ruficollis* werden alle in zeer kleine aantallen gevangen op de zandige, met struikheide en brem begroeide, spoorwegberm.

-Vrij zeldzame graslandsoorten als *Synuchus nivalis* en *Agonum nigrum* werden eveneens genoteerd. De laatstgenoemde soort wordt door DERENNE (l.c.) niet vermeld waarschijnlijk wegens problemen in de nomenclatuur; zijn komt vooral voor in zeer vochtige graslanden.

-*Bembidion (Ocys) harpaloides*, *Bembidion (Ocys) quinquestriatum* en *Dromius meridionalis*, soorten die meestal op bomen worden aangetroffen, zijn niet zeldzaam, maar worden aldus bestempeld volgens DERENNE (1957).

Waarschijnlijk staat dit in verband met het feit dat op dergelijke plaatsen minder naar kevers wordt gezocht.

LITERATUURLIJST

- DERENNE, E., 1957. Catalogue des Coléoptères de Belgique. Fasc. II. I. Caraboidea Carabidae, Société royale d'Entomologie de Belgique, Bruxelles, 116 pp.
- TURIN, H., HAECK, J. and R. HENGEVELD, 1977.- Atlas of the Carabid beetles of the Netherlands. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Verhandelingen Afdeling Natuurkunde, Tweede Reeks, deel 68 : 228 pp.