

Una nuova specie d'*Ochthebius* (*Henicocerus*)
della Grecia
(Col. Hydraenidae)
XXI Contributo allo studio degli Hydraenidae

di Giorgio FERRO¹

Manuscrit accepté le 23/12/1987.

¹ Via Fontane 172, I-31020 Lancenigo (Treviso), Italia.

Riassunto

Nel presente lavoro, l'Autore descrive una nuova specie di *Ochthebius*: *O. (Henicocerus) phthius* della Grecia; i disegni del fallo completano il lavoro.

Résumé

Dans ce travail, l'auteur décrit une nouvelle espèce d'*Ochthebius*: *O. (Henicocerus) phthius* de Grèce; les dessins de l'édéage complètent le travail.

Ochthebius (Henicocerus) phthius n. sp.

Questa specie da me raccolta nella Grecia centro-orientale è vicina per colore e forma all'*O. (Henicocerus) halbherrii* REITT., dal quale tuttavia si distingue per i seguenti caratteri:

Pronoto: disco meno lucido con punteggiatura più rada e più piccola; fossette anteriori quasi sempre divise in due a formarne quattro; espansioni anterolaterali con radi e piccoli punti.

Elitre: stria con punteggiatura molto più piccola; interstrie molto più strette, la 1^a, 3^a, 5^a, 7^a quasi careniformi.

Edeago: parte apicale mobile diversamente conformata (fig. 1-2-3).

La nuova specie presenta un dimorfismo sessuale poco marcato (gibbosità del pronoto simile in ♂ e ♀) come nell'*O. (Henicocerus) forojuliensis* FERRO; differisce dall'*O. (Henicocerus) colveranus* FERRO per il pronoto molto meno gibboso e meno zigrinato, per le fossette anteriori più grandi (non puntiformi), per le interstrie laccate (non striolate trasversalmente), per l'edeago più corto e con la parte apicale mobile a forma di gancio più stretto.

Ritengo la specie endemica (in Grecia è comune l'*O. (Henicocerus) colveranus* m.).

Holotypus: mm. 1,8 - Ftiotide (Lamia), 29.X.1979, in coll. m.

Allotypus: mm. 1,9 - ibidem. in coll. M.

Paratypi: 34 exx. - Ftiotide: Lamia, Aliugros, Koridalò, 29.X.1979, in coll. m., in coll. HEBAUER, in coll. JACH.

Derivatio nominis: dalla regione della Ftiotide, di cui Lamia è il capoluogo.




Fig. 1. - Fallo di *Ochthebius (Henicocerus) phthius* n. sp.

Fig. 2. - Parte apicale del fallo di *Ochthebius (Henicocerus) phthius* n. sp.

Fig. 3. - Altra visione della parte apicale del fallo di *Ochthebius (Henicocerus) phthius* n. sp.

Bibliografia

- D'ORCHYMOND, A., 1941. - Revision des *Ochthebius* européens du sous-genre *Henicocerus* STEP. *Bull. Mus. roy. Hist. nat. Belg.*, XVIII, 12: 1-15.
- FERRO, G., 1979. - Due nuovi *Ochthebius (Henicocerus)* del Friuli. *Bull. Anns Soc. r. belge Ent.* 115: 113-116.
- FERRO, G., 1981. - Note su alcune specie del Genere *Ochthebius* LEACH. (Coleoptera Hydraenidae) *Bull. Anns Soc. r. belge Ent.* 117: 217-278.
- JANSSENS, E., 1963. - *Hydraenidae* du Vilayet de Trébizonde (Nord-Est Anatolia). *Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg.* XXXIX, 7: 1-30.
- JANSSENS, E., 1968. - Contribution à l'étude des *Hydraenidae* d'Asie Mineure Orientale. *Bull. Anns Soc. r. belge Ent.* 104: 61-75.
- HANSEN, M., 1987. - The *Hydrophiloidea (Coleoptera)* of Fennoscandia and Denmark. *Fauna Ent. Scandinavica* 18: 1-254.
- HEBAUER, F. & VALLADARES, D., 1985. - *Ochthebius (Henicocerus) legionensis* sp. n. from Spain (Coleoptera Hydraenidae). *Aquatic insects Inter. Journal of Freshwater Ent.* 3: 161-164.
- HEBAUER, F., ?. - Revision der europäischen Arten der Gattung *Ochthebius* subgenus *Henicocerus* STEPHENS, 1829 (*Palpicornia*), in corso di stampa.

* * * * *