

Taille : 11 mm, gaine-tarière 5 mm.

1 ♀, Côte d'Ivoire, Adiopodumé, 8-18.I.1957, Holotype, au Musée Royal du Congo belge.

*Remarque* : Dans notre clef de 1956, cette espèce mène au n° 40 (*G. paradoxale* et *G. triplex*). Notre nouvelle espèce diffère de ces deux dernières par la longueur plus grande du col. Chez *G. eburneum*, le col dépasse la longueur pronoto-tégulaire, alors qu'il est égal à cette longueur chez *G. triplex*, et qu'il est un plus court chez *G. paradoxale*. De cette dernière espèce, *G. eburneum* se distingue également par l'absence de rides sur le mésonotum; alors que chez *G. triplex* la sculpture est toute différente. La taille de la tarière diffère également.

#### BIBLIOGRAPHIE

PASTEELS J.J., 1956, Révision du genre *Gastcraption*. I. Espèces de l'Afrique Noire. (Ann. Musée royal Congo Belge. Série in-8°. Sc. zool. 50, pp. 1-94.)

## SOCIÉTÉ ROYALE D'ENTOMOLOGIE DE BELGIQUE

### Assemblée mensuelle du 3 mai 1958

Présidence de M. J. COOREMAN, *Vice-Président*.

*Décision du Conseil*. — M. Réginald WICKET, 5, rue des Sept Etoiles, Berchem-Sainte-Agathe, présenté par MM. A. VAN HOE-GAERDEN et G. DEMOULIN, est admis au titre de membre assistant (Coléoptères).

*Correspondance*. — M. R. MAYNÉ, qui représentait notre Société aux festivités du Centenaire de la Société Entomologique Suisse, nous a, à cette occasion, envoyé une carte portant la signature de divers participants, parmi lesquels plusieurs de nos membres honoraires.

Changements d'adresse : M. A. BRES, 30, rue Vandevorde, Anderlecht; M. G. DE MEESTER DE BETZENBROECK, 55, avenue de l'Armée, Bruxelles 4.

*Bibliothèque*. — *Dons*. — Nous avons reçu un separatum de M. J. SEMAL (*Remerciements*).

*Echanges*. — L'échange de nos publications est décidé contre : 1° *Studia Universitatis « Lovanium »*, *Faculté des Sciences*, édité par l'Université Lovanium, à Léopoldville; 2° *Arquivos do Museu Paranaense*, édité par la Diretoria Geral de Educação, à Curitiba, Brésil.

*Divers*. — Il est décidé de publier, dans la mesure de la place disponible, les avis et demandes d'échange émanant des membres de la Société. L'impression en étant gratuite, ces avis devront être rédigés de la façon la plus concise. Ils devront être dépourvus de tout but commercial.

#### COMMUNICATIONS

**Araignées nouvelles pour la Faune de Belgique** : *Drepanotylus uncatus* (CAMBRIDGE) et *Cryphoeca silvicola* (C.L. KOCH).

*Drepanotylus uncatus* (CAMBRIDGE) est une espèce paléarctique, nord et centro-boréale, qui a été citée d'Islande, de Scandinavie,

du Danemark, de Finlande, d'Allemagne, de Suisse, de France, de Russie et des Iles britanniques.

Cette araignée hygrophile est commune en Grande-Bretagne, très rare en Europe centrale et au Danemark. En Russie, elle ne serait connue seulement que des environs de Moscou.

Lors d'une exploration effectuée sous les auspices de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, nous avons récolté, M. J. COOREMAN et moi-même, à la Baraque-Michel, le 16 janvier dernier, 7 exemplaires de cette espèce (6 ♂♂, 1 ♀).

C'est sur une couche de neige de 20 à 25 cm., et par une température de 0°C. environ, que furent réalisées les récoltes citées plus haut.

*Cryphoeca silvicola* (C.L. KOCH) fut récolté au cours de la même exploration. En retournant des bûches d'Épicéas, nous avons capturé 22 exemplaires (17 ♀♀, 1 ♂, 4 juv.) de cette Agélénide, nouvelle pour la faune de notre pays. Cette espèce est connue d'une grande partie de l'Europe, à l'exception toutefois du bassin méditerranéen, et paraît manquer aux Pays-Bas.

J. KEKENBOSCH.

#### Coléoptères intéressants pour la faune belge.

##### *Ophonus diffinis* DEJ. Belg. n. sp.

Espèce voisine de *rotundicollis* FAIRM. et LABOULB. dont elle se distingue par la forme du pronotum. Chez *diffinis* la largeur de la base de ce dernier est presque égale à celle du bord antérieur, tandis que chez *rotundicollis* la base est nettement plus étroite que le bord antérieur; les côtés du pronotum de *diffinis* sont peu arqués et beaucoup plus chez *rotundicollis*. Chez *diffinis* le pronotum est donc subrectangulaire tandis que chez *rotundicollis* il est trapézoïdiforme avec les côtés latéraux très arqués.

Lamorteau, 9.VIII.1939 (E.D.).

##### *Laccobius sinuatus* MOTSCH., Belg. n. sp.

Ressemble à *striatulus* F. avec lequel il doit avoir été confondu, jusqu'à présent, dans la plupart des collections. Un peu plus allongé et plus acuminé. L'aire de dispersion est encore très mal établie. Considéré par GAUGLBAUER comme espèce plutôt méridionale. Le catalogue WINKLER le cite d'Angleterre, de France (surtout régions méditerranéennes). Non cité de Hollande par

EVERTS. Allemagne centrale et orientale selon SCHILSKY. A. D'ORCHYMONT (*Tijdschrift voor Entomologie*, LXXXVIII, 1945), dit ne pas connaître d'exemplaires belges.

Cette espèce a dû lui avoir échappé car il en existait plusieurs spécimens dans les collections de l'Institut. L'édéage, très caractéristique est reproduit dans les *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXXIX, 1939, p. 367.

Chez nous, *L. sinuatus* MOTSCH., semble se rencontrer plus communément aux environs de Bruxelles: Auderghem, Woluwe-Saint-Pierre (Stockel), Laeken, Haren, Forest, Groenendael, Bergh. D'autres individus proviennent de Ambly, La Roche en Ardennes, Bullange, Roumont, La Hulpe. Affectionne les eaux stagnantes.

Je crois que *L. sinuatus* est moins rare que ne le laissent supposer les renseignements donnés par la littérature entomologique.

J'ai, jusqu'à présent, vu deux fois plus de *L. sinuatus* MOTSCH., que de *L. striatulus* F.

##### *Sphaerosoma seidlitzii* REITTER, Belg. n. sp.

Quatre espèces de *Sphaerosoma* sont actuellement connues de Belgique: 1° *globosum* STRM. (glabre); 2° *seidlitzii* REITT. (pubescence courte); 3° *pilosum* PANZ. (pubescence assez longue); 4° *piliferum* MÜLL. (pubescence très longue). Les exemplaires de *seidlitzii* que j'avais pris en 1918 à Boitsfort se trouvent dans les coll. de l'Institut et ce n'est que fortuitement que je les ai retrouvés et reconnus.

##### *Caenocara subglobosa* MULS., Belg. n. sp.

Peut facilement être confondu avec *affinis* STRM. A été signalé comme tel précédemment.

Étalle, 4.IX.1955; au fauchoir.

##### *Xyletinus gronblömi* KANGAS, Belg. n. sp.

Rhisnes, 15.VII.1936, 1 ex.

##### *Xyletinus hansenii* JANSSEN, Belg. n. sp.

Olloy, 11.VI.1939.

La détermination de ces deux dernières espèces a été rendue possible grâce au travail du Dr G. LOHSE [*Die mitteleuropäischen Arten der Gattung Xyletinus Latr.* (Ent. Blätter, 1957, 53-1/2)].