

Nupserha apicata FAIRM. m. **fuscoampliata** nov.

Comme m. *subvariabilis* BREUN., mais un peu plus du tiers apical des élytres couvert de pubescence brun foncé.

Type une ♀ d'Erythrée : Ghinda, ex coll. GASSNER.

Nitocris (s.s.) **argenteovittata** AURIV. m. **rufoampliata** nov.

Comme m. *fuscicornis* BREUN., mais toute la moitié antérieure des élytres rouge, la tache suturale dorée plus large et s'étendant jusqu'au tiers apical.

Type ♂ de Côte d'Ivoire : Adiopodoumé.

Trois nouveaux *Gasteruption* (*Hymenoptera, Evanoidea,* *Gasteruptionidae*) d'Afrique occidentale

par J.J. PASTEELS

En conclusion d'une révision (1956) des espèces africaines du genre *Gasteruption*, nous supposons qu'un nombre encore considérable d'espèces reste encore à découvrir. Cette hypothèse s'est rapidement confirmée. En effet, les trois exemplaires recueillis par M. J. DE BEAUMONT au cours de son récent séjour d'exploration en Guinée française, se sont avérés appartenir à trois formes nouvelles : deux espèces et une sous-espèce !

Nous tenons à remercier une fois de plus M. J. DE BEAUMONT, Conservateur au Musée zoologique de Lausanne, pour avoir mis ce beau matériel à notre disposition. Avec la généreuse permission du récolteur, les types ont été déposés au Musée royal du Congo belge (Tervueren).

1. *Gasteruption nimbale* n. sp.

♀. — Tête noire. Espace malaire, angles du clypéus et mandibules bruns. Thorax rouge ; en noir cependant, la face supérieure du mésonotum (à l'exclusion de son rebord antéro-latéral), le scutellum, la face supérieure du propodaeum, des taches sur les lobes latéraux du pronotum et la partie antérieure du mésosternum. Pattes brun-foncé (presque noires), en blanc : la face externe des tibias et basitarses I et II et la base du tibia III. (Le tarse III est entièrement noir !) Ailes hyalines à nervation noire. Abdomen noir. Gaine-tarière à pointe blanche dont la longueur ne dépasse pas les $\frac{2}{3}$ de la hauteur maximale de l'abdomen.

Tête à luisance soyeuse, très finement et densément ponctuée à fort grossissement ; villeuse sur la face et en arrière des yeux,

imperceptiblement sur l'occiput. Forme : vue de haut, cf. fig. 1 : elle est fortement bombée en arrière des yeux, l'occiput est étroit et fortement incisé, nettement caréné. De profil, la tête a la même forme que celle de *G. enigmaticum* PASTEELS (cf. PASTEELS, 1956, fig. 57a, p. 78); l'espace malaire est court.




FIG. 1. — *Gasteruption nimbale* n. sp. : tête vue de haut; FIG. 2 et 3. — *G. eburneum* n. sp. : tête vue de haut et de profil; FIG. 4. — *G. eburneum* n. sp. : antenne; FIG. 5. — *G. eburneum* n. sp. : thorax; FIG. 6. — *G. eburneum* n. sp. : mesonotum.
(Dessins à la chambre claire, 1 à 4 à l'échelle A, 5 à l'échelle B.)

L'antenne et la forme du thorax sont également identiques à celles de cette espèce (cf. PASTEELS, 1956, fig. 57c et 57d, p. 78). Le thorax est donc 2 fois plus long que haut, allongé surtout dans sa partie mésonotale.

Le fond du mésonotum présente une luisance soyeuse due à

une très fine et dense ponctuation. La villosité est courte sur le haut, plus accusée sur les côtés. Sur ce fond se détache une ponctuation régulière, peu profonde, les points étant un peu plus petits que les intervalles. Propodaeum régulièrement réticulé, à carène médiane nette.

Tibias postérieurs nettement claviformes.

Taille : 10 mm, tarière égale au corps.

1 ♀, Guinée française : Nimba, 500-900 m, 1-3.I.1957 (J. DE BEAUMONT), Holotype, au Musée royal du Congo belge.

Remarque : appartient au groupe *caffrarium*. Notre clef de 1956 mène cette espèce à *enigmaticum*, dont elle est très voisine. Elle s'en distingue : par la forme de l'occiput, la microsculpture plus distincte sur la tête et le thorax, la transparence des ailes, et la taille moindre de la tache blanche apicale de la gaine-tarière.

2. *Gasteruption punctulatum septentrionale* n. subsp.

Diffère de la forme typique (d'Afrique australe) par les caractères suivants : la tête, le thorax et le tarse postérieur sont entièrement noirs; vu de haut, le thorax est glabre (la villosité blanche étant très nette dans la forme typique).

1 ♀, Guinée française : Région de Nimba, base IFAN., 1-3.I.1957 (J. DE BEAUMONT), Holotype, au Musée royal du Congo belge.

Remarque : ne se distingue d'une espèce commune en Afrique australe que par des caractères mineurs. Il est à remarquer cependant que *G. punctulatum* SCHLETTERER n'a pas été signalé jusqu'ici dans la zone équatoriale. Ce n'est que provisoirement que nous attribuons un statut subsppécifique à cette forme.

3. *Gasteruption eburneum* n. sp.

♀. — Noire, Mésopleures et mésosternum rouges. Pattes I et II brunes. Pattes III noires, base du tibia jaune. Gaine-tarière entièrement noire.

Tête mate, lisse, villeuse uniquement en avant et sur les côtés. Formes : cf. fig. 2 et 3. La région occipitale est fortement bombée et forme une bosse en avant de la carène. Antenne cf. fig. 4 (le 2° article est particulièrement long).

Thorax, forme : cf. fig. 4. Le col est plus long que la distance pronoto-tégulaire. Epines pronotales courtes. Mésonotum, forme cf. fig. 5, non villeux à sa face supérieure, mat, régulièrement ponctué.

Taille : 11 mm, gaine-tarière 5 mm.

1 ♀, Côte d'Ivoire, Adiopodoumé, 8-18.I.1957, Holotype, au Musée Royal du Congo belge.

Remarque : Dans notre clef de 1956, cette espèce mène au n° 40 (*G. paradoxale* et *G. triplex*). Notre nouvelle espèce diffère de ces deux dernières par la longueur plus grande du col. Chez *G. eburneum*, le col dépasse la longueur pronoto-tégulaire, alors qu'il est égal à cette longueur chez *G. triplex*, et qu'il est un plus court chez *G. paradoxale*. De cette dernière espèce, *G. eburneum* se distingue également par l'absence de rides sur le mésonotum; alors que chez *G. triplex* la sculpture est toute différente. La taille de la tarière diffère également.

BIBLIOGRAPHIE

PASTEELS J.J., 1956, Révision du genre *Gasteruption*. I. Espèces de l'Afrique Noire. (Ann. Musée royal Congo Belge. Série in-8°. Sc. zool. 50, pp. 1-94.)

SOCIÉTÉ ROYALE D'ENTOMOLOGIE DE BELGIQUE

Assemblée mensuelle du 3 mai 1958

Présidence de M. J. COOREMAN, *Vice-Président*.

Décision du Conseil. — M. Réginald WICKET, 5, rue des Sept Etoiles, Berchem-Sainte-Agathe, présenté par MM. A. VAN HOE-GAERDEN et G. DEMOULIN, est admis au titre de membre assistant (Coléoptères).

Correspondance. — M. R. MAYNÉ, qui représentait notre Société aux festivités du Centenaire de la Société Entomologique Suisse, nous a, à cette occasion, envoyé une carte portant la signature de divers participants, parmi lesquels plusieurs de nos membres honoraires.

Changements d'adresse : M. A. BRES, 30, rue Vandevorde, Anderlecht; M. G. DE MEESTER DE BETZENBROECK, 55, avenue de l'Armée, Bruxelles 4.

Bibliothèque. — *Dons*. — Nous avons reçu un separatum de M. J. SEMAL (*Remerciements*).

Echanges. — L'échange de nos publications est décidé contre : 1° *Studia Universitatis « Lovanium »*, *Faculté des Sciences*, édité par l'Université Lovanium, à Léopoldville; 2° *Arquivos do Museu Paranaense*, édité par la Diretoria Geral de Educação, à Curitiba, Brésil.

Divers. — Il est décidé de publier, dans la mesure de la place disponible, les avis et demandes d'échange émanant des membres de la Société. L'impression en étant gratuite, ces avis devront être rédigés de la façon la plus concise. Ils devront être dépourvus de tout but commercial.

COMMUNICATIONS

Araignées nouvelles pour la Faune de Belgique : *Drepanotylus uncatu* (CAMBRIDGE) et *Cryphoeca silvicola* (C.L. KOCH).

Drepanotylus uncatu (CAMBRIDGE) est une espèce paléarctique, nord et centro-boréale, qui a été citée d'Islande, de Scandinavie,