

— M. SCHOUTEDEN présente un exemplaire d'un genre nouveau de Gryllide cavernicole, *Pholeogryllus Geertsi* CHOPEX, capturé au Congo belge.

— M. LESTAGE lit une lettre de notre collègue M. TONNOIR qui poursuit un voyage en Nouvelle Zélande.

La séance est levée à 22 heures.

## NOTE A PROPOS DES ESPÈCES DU GROUPE LATERALIS DU GENRE TIPULA

par M. GOETGHEBUER.

Dans un travail récent de M. le D<sup>r</sup> P. LACKSCHEWITZ de Libau (1) étudie le groupe *lateralis* du genre *Tipula* et pour lequel il établit 3 formes nouvelles à savoir : *Tipula coerulescens*, *gracilentata* et *ferruginea*.

Or, l'auteur semble ignorer l'existence du travail que j'ai publié en collaboration avec M. TONNOIR dans le *Bulletin de la Société Entomologique*, T. III 1921, pp. 106 à 125 et intitulé " *Catalogue raisonné des Tipulidae de Belgique* ". Dans cette étude nous avons considéré comme type de *lateralis* l'espèce que M. LACKSCHEWITZ rapporte à *T. montium* EGGER. et qui est la forme la plus commune de notre région. *T. lateralis* LACKS. est notre *pseudolateralis*. Quant à *gracilentata* LACKS. et *ferruginea* LACKS., la première est synonyme de *T. Couckeï* TONN., et la seconde de *Pierrei* TONN.

Les excellents dessins qui accompagnent le mémoire de M. LACKSCHEWITZ ne laissent aucun doute à cet égard.

Notre travail ayant la priorité, la synonymie des différentes espèces du groupe *lateralis* s'établit donc comme suit :

TONNOIR	LACKSCHEWITZ
<i>lateralis</i>	= <i>montium</i>
<i>pseudolateralis</i>	= <i>lateralis</i>
<i>Couckeï</i>	= <i>gracilentata</i>
<i>Pierrei</i>	= <i>ferruginea</i>

(1) Der Formenkreis du *Tipula lateralis* Meig (Stat) im ostbaltischen gebiet, Arbeiten der Naturforscher-Vereins zu Riga, New Folge Heft XY. 1923.