

époque où ils recherchent les femelles pour l'accouplement, sur la propre toile de celle-ci. Cet évident dépérissement lui paraîtrait dû au fait que, menant tout un temps une existence vagabonde, ils vivent de leurs réserves, ce qui leur fait perdre de leur embonpoint et aussi sans doute de leur vigueur.

Notre collègue se demande s'il faut voir dans ceci la cause de ce que les femelles tolèrent en août la compagnie des mâles, et essaient en septembre de les manger ? Ou bien est-on simplement en présence de simples variations psychologiques individuelles ? Il serait actuellement assez difficile de répondre à ces questions.

La séance est levée à 18 h. 30.

Liste d'Hyménoptères intéressants

LA PLUPART CAPTURÉS EN 1927

PAR

AD. CRÈVECŒUR (CR.) ET P. MARÉCHAL (M.)

Remarque : Dans nos listes précédentes nous avons signalé comme **Fn. nov. sp.** plusieurs insectes qui avaient déjà été renseignés de Belgique par notre estimé Collègue J. BEQUAERT, dans les "Comptes-rendus des Congrès flamands de sciences naturelles et médicales (1)", publications que nous n'avions pas eu l'occasion de lire jusqu'ici, mais que M. BEQUAERT nous a obligeamment passées. Nous le prions de bien vouloir nous excuser de cette involontaire usurpation.

Les espèces rares seront signalées par des *.

TENTHRÉDINIDES

faisant partie d'un lot que m'a soumis le R. P. ACHEROY (M.) :

Dolerus pratensis L., var. *fennicus* ANDRÉ, 1 ♀, Haine-Saint-Paul, 2-5-98.

* *D. tremulus* KL., 2 expl., Trivières, 27-4-99.

* *Tenthredo velox* FAB., 2 expl., Trivières, mai-juin 98.

T. maculata FRGR., 1 ♀, Botassart, 11-6-97.

Trichiocampa viminalis FALL., 2 expl., Trivières, 10-7-99.

Pachynematus leucogaster HART., 1 ♀, Trivières, 23-5-98.

POMPILIDES

Pompilus minutus DAHLB., 1 ♀, Eben, 3-9, une autre Vieuxville, 11-8-27 (M.).

P. cinctellus SPIN., 1 ♂, Comblain-au-Pont, 21-6-27 (M.).

* *P. unguicularis* THS., 1 ♂, Eben, 3-9-27 (M.) — déterminé par M. L. BERLAND, du Museum de Paris.

(1) Handelingen van het ...de Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres, 1907, 1909, 1913.

- * *P. Wesmaeli* THS., 1 ♀, Loën, 31-5-25 (M.) — détermination L. BERLAND (1).
Priocnemis coriaceus DAHLB., 1 ♂, Tilff, 1-5, 1 ♀, Sart-Tilman, juin 27 (M.).
Cryptochilus affinis V. D. L., 1 ♂, Comblain-au-Pont, 6-7-27 (M.).
Calicurgus hyalinatus FAB., Crainhem, 31-8 (CR.); 1 ♀, Comblain-au-Pont, 6-7, une autre, Archennes, 27-8 (M.).

SPHÉGIDES

- * *Dinetus pictus* FAB., C sur les fleurs de Tanaïsie et Millefeuille, chemin sablonneux encaissé entre Hamme-Mille et Nethen, 17-8-27 (M.).
Alyson fuscatus PANZ., plusieurs ♀, Uccle, 4-9-27 (CR.).
Trypoxylon attenuatum SM., 2 ♂, d'une ronce de Boitsfort, 3-6 et 9-6-27 (CR.); 1 ♂, Comblain-au-Pont, 21-6-27 (M.).
Mimesa Shuckardi WESM., ♂ ♀, Boitsfort, 18-6-27 (CR.).
 * *M. Dahlbomi* WESM., 1 ♀, Houyet, 13-7-25 (CR.).
 ** *Pemphredon (Cemonus) Shuckardi* MOR., **Fn. nov. sp.**, 1 ♀, Embourg, 15-7-27 (M.) — détermination L. BERLAND.
Stigmus pendulus PANZ., 1 ♂, Saint-André-Bruges, 14-8-27, (CR.).
Passaloecus brevicornis NYL., 1 ♂ entre Hony et Avister, 4-8-27 (M.).

VESPIDES

- Odynerus (Ancistrocerus) trifasciatus* FAB., 1 ♂, Esneux, 18-5, un autre, Chaudfontaine, 30-6-27 (M.).
O. (A.) parietinus L., 1 ♀, Comblain-au-Pont, 6-7-27 (M.), une autre, Ophain (ACHEROY).
O. (Symmorphus) sinuatus FAB. Hoeylaert, 5-7-27 (CR.).
 * *O. (Microdynerus) exilis* H.-SCH., Hoeylaert, 5-7-27 (CR.).
Eumenes coarctata L., plusieurs ♀ ♂, Maldegheem, août 26, (DE WALSCHÉ), 1 exempl., Comblain-au-Pont, 21-6-27 (M.).

APIDES

- G. Prosopis* : Nous pourrions ajouter de nombreuses localités à celles citées par JACOBS et BEQUAERT pour les esp. suivantes : *signata*

(1) WESMAEL a donné cette espèce en 1851 sous le nom erroné de *trivialis* DAHLB. SCHMIEDEKNECHT a rectifié dans *Hym. Mitteleur.*, p. 265. WESMAEL ne précise pas les localités; BERLAND (1925) cite l'esp. comme RR en France. Mon exempl. a le dernier sternite abd. un peu caréné au milieu, comme l'ont signalé certains auteurs (M.).

- PANZ., *confusa* NYL., *annulata* L., et *hyalinata* SM. On peut donc les considérer comme communes (1).
 * *P. pictipes* NYL. : 7 exempl. de Loën, Eben, Liège, Tilff; fin juin-juillet, 1924 à 27 (M.).
P. brevicornis NYL. : 5 exempl. provenant de 2 nids de Chaudfontaine, l'un dans la Ronce, l'autre dans le Sureau; éclosion fin juin 1926 (M.).
 ** *P. styriaca* FÖRST., **Fn. nov. sp.**, 1 ♂, Houyet, 14-7-25 (CR.).
 ** *P. angustata* SCH., **Fn. nov. sp.**, 1 ♀, Liège, 28-6-24, une autre, Eben, 3-9-27 (M.).
 ** *P. pilosula*, J. PÉREZ, **Fn. nov. sp.** ♂ ♀ sur Reseda, Eben, juillet 1925; ♂ ♀ sur la même plante, Loën, 4-7-26 (M.).
Colletes daviesana SM. : les ♂ CC sur la Tanaïsie, Méry à Esneux, août 1925 et 27 (M.).
 * *C. fodiens* FRER., 1 ♀, Hamme-Mille, 17-8-27 (M.).
Osmia bicolor SCHRK., 1 ♀, Comblain-au-Pont, 8-5; 2 ♀, Loën, 20-4-27 (M.).
O. aurentata PANZ., C, Comblain-au-Pont, 8-5; sur Hippocrepis comosa (M.).
 * *O. rufo-hirta* LATR., AR, Comblain-au-Pont, 8-5; sur Hippocrepis comosa (M.).
O. leucomelaena KY., 1 ♀, Comblain-au-Pont, 6-7-27 (M.).
 * *O. brachyceros* BLÜTHG. (= *Morawiltzi* GERST.), 1 ♂, Comblain-au-Pont, 29-5-27 (M.).
Eriades truncorum L., ♀ C sur Composées jaunes, et notamment *Pulicaria dysenterica*, Loën, 27-7; plus expl. Vieuxville, 11-8-27 (M.).
 * *Megachile versicolor* SM., 1 ♂, Comblain-au-Pont, 6-7, un autre, Vieuxville, 11-8-27 (M.).
 * *Trachusa serratae* PANZ., 1 ♀, Comblain-au-Pont, 6-7-27 (M.); 2 expl. Rabais et Torgny, VI-VII 1919, (BRAY).
 * *Stelis breviscula* NYL., 1 ♂, St André-Bruges, 14-8-27 (CR.); un autre Loën, 26-7-27 (M.).
 * *Halictus sexcinctus* FAB., 1 ♀, Chertal (Herstal), 7-7-22 (M.); 2 ♀, St-Mard, 15-6-19 (BRAY).
 * *H. tetrazonius* KL., (= *quadricinctus* KY.), Loën, Comblain-au-Pont, Sy : juin à août, 1925 à 27 (M.); 3 expl. Virton et Lamorteau, juillet à septembre 1916-18 (BRAY).

(1) Bon nombre de nos déterminations dans les GG. *Prosopis* et *Halictus* ont été obligeamment revues par M. R. BENOIST, du Museum de Paris.

- * *H. xanthropus* KY., 2 ♀, Loën, 31-5 et 4-7; 1 ♀, Visé, 6-4, sur *Taraxacum*, 1925-26 (M.).
- ** *H. lativentris* SCH., **Fn. nov. sp.**, 2 ♂, Buysinghen, 13-9-23 (CR.); 1 ♂ sur *Calluna*, Héverlé, 14-8-25 (M.).
- ** *H. quadrinotatus* SCH., **Fn. nov. sp.**, ♀, Crainhem, avril 1926 (CANTENS); Stockel, 4-4-26; Uccle, mai 26-27 (CR.); ♂ Crainhem, juillet 26 (CANTENS), Uccle, 7-8-27 (CR.).
- ** *H. pygmaeus* SCH., **Fn. nov. sp.**, 1 ♀, Chaweresse (Méry), 29-6-26; une autre, Comblain-au-Pont, 30 6-26 (M.).
- ** *H. sexstrigatus* SCH., **Fn. nov. sp.**, ♀, Bruxelles (Jardin Bot.) 12-4 et 20-6-26; St-André-Bruges, 16-7-26 (CR.); ♂, Boitsfort, 5-9-24, Assebrouck, 10-7-26 (CR.).
- ** *H. brevicornis* SCH., **Fn. nov. sp.**, 2 ♂, St-André, 18-9-24; ♀, Snelleghem, 12-7-26 (CR.).
- H. punctatissimus* SCH., est AC : Chaudfontaine, Esneux, Limont, (Tavier), Comblain-au-Pont, Eben, (M.); Diepenbeek (DE MOFFARTS); Stockel, St-André, Varsenaere (CR.). Avril-mai, puis août-septembre.
- ** *H. rufitarsis* ZETT., **Fn. nov. sp.**, ♀, Boitsfort, août 25 (CANTENS); ♂, Rixensart, 10-8-24, Boitsfort, 15-8-26 (CR.); 1 ♂, Bouny-Romsée, 27-9-26 (M.); 1 ♀, Strée (DE MOFFARTS).
- ** *H. Frey-Gessneri* ALFK., **Fn. nov. sp.**, 1 ♂, Jalhay-Hautes-Fagnes, 17-8-22 (M.); 1 ♀, Linkebeek, 18-4-27 (CR.).
- H. fulvicornis* KY., différent de *laevis* KY. (dont la présence en Belgique, indiquée par JACOBS, semble douteuse), est une espèce C.
- ** *H. laticeps* SCH., **Fn. nov. sp.**, 3 ♀, Loën, fin mars-avril 1926, sur *Salix Caprea* et *Potentilla verna*; 1 ♀, Streupas (Angleur) 8 4-25 (M.).
- H. albipes* KY., généralement considéré comme distinct de *calceatus* SCOP., (= *cylindricus* FAB.), n'est guère plus rare que ce dernier.
- H. malachurus* KY., est assez répandu : Freeren, Visé, Loën, Chaudfontaine (M.); Botassart, Strée (DE MOFFARTS); Uccle, Crainhem, Boitsfort (CR.).
- H. smeathmanellus* KY., dont JACOBS ne citait qu'une localité, est C, même CC en plus d'un endroit : Liège, Tilff, Esneux, Fraiture, Sy, Houyet, Loën (M.); Virton (BRAY); Hermalle, Munster-Bilsen (DE MOFF.); Ixelles, Uccle, Hoeylaert (CR.).
- * *Andrena carbonaria* L., plusieurs expl. St-Mard, juin 1919 (BRAY).
- * *A. flessae* PANZ., plusieurs expl., Virton, mai 1924 (BRAY).
- * *A. thoracica* FAB., ♂, Virton, St-Mard, mi-juin 1919 (BRAY).

- A. nigro-aenea* KY., AC, Chaudfontaine, Esneux, Comblain-au-Pont, Loën, fin avril à juillet 1926-27 (M.); Torgny, Latour, fin mai (BRAY).
- * *A. lapponica* ZETT., 1 ♂, Uccle, 3-5-27 (CR.); un autre, Tilff, 1-5-27 (M.).
- * *A. ventralis* IMH., 3 expl. ♂, Esneux, avril 26 (M.); Assebrouck, 13-4-25 et Uccle, 3-4-26 (CR.).
- * *A. marginata* FAB., (= *Cetii* SCHRK.) : plusieurs expl., Rabais et Buzenol, août 1918 (BRAY); AC sur Scabieuse, Sy, 11-8-27; un expl. Wépion, même plante, 20-8-26.
- A. florea* FAB., Uccle, juin (DUBOIS); Liège, Saint-Nicolas (BERTRAND); Lixhe (M.), fin mai à juillet.
- * *A. Rosae* PANZ., (= *austriaca* PANZ.) 1 ♀, Logne, août 1913 (CARPENTIER); une autre, Lamorteau, 2-8-19 (BRAY).
- * *A. Schencki* MOR., pas rare à Virton, V-VI (BRAY); Stockel, 19-6-26 (CR.).
- A. grvida* IMH. (= *extricata* SM.), AC, Loën, fin mars-avril 26; un expl., Méry, même époque (M.).
- * *A. denticulata* KY., (= *Listerella* KY.), 5 expl., Virton et Buzenol, ♂, fin VII, ♀ VIII, 1917-18 (BRAY).
- * *A. chrysosceles* KY. : Tilff, Méry, Visé, Loën, IV à VI, 1925 à 28 (M.).
- * *A. coitana* KY. (= *Shawella* KY.), 2 ♂, Gouvy, 30-7-27, sur *Campanula* (CR.).
- * *A. tarsata* NYL., 1 ♀, Herbeumont, 19-7-23 (CR.); 1 ♀, Buzenol, 14-8-18 (BRAY).
- * *A. Lathyri* ALFK. : 1 expl., Cointe (Liège), 23-5-22; trois autres, Esneux, mai 1926 et 27 (M.); 1 ♀, Virton, 8-6 (BRAY).
- Panurgus calcaratus* SCOP., C au bord canal de l'Ourthe, de Méry à Hony, 4-8-27; nombreux terriers; c'est la 1^{re} fois que je le rencontre aux environs de Liège (M.).
- Halictoides dentiventris* NYL., Gouvy, 30-7 (CR.); 1 ♂ dans *Campanula*, Martinrive, 21-7-27 (M.).
- * *H. inermis* NYL., 1 ♀, Eben, 3-9-27 (M.).