

Liste d'Hyménoptères intéressants la plupart capturés en 1928

PAR

AD. CRÈVECŒUR (CR.) ET P. MARÉCHAL (M.)

Remarque: Les espèces rares sont signalées par des *.

LYDIDES

** *Xyela Julii* BRÉB., **Fn. nov. sp.** Une ♀ Tervueren, avril 1926 (CANTENS). Premier représentant de la tribu des *Xyélines*, capturé en Belgique.

Cephus pygmaeus L. a été AC aux environs de Liège, et notamment sur les fleurs de Renoncules, au bord des champs (Loën, Fouron-St-Martin, Tilff, VI-VII). (M.).

* *C. pallipes* KLUG. Une ♀, Martinrive, 13-6 (M.).

TENTHRÉDINIDES (M).

Remarque: Plusieurs espèces ont été revues par M. R. DELMAS, de l'Université de Toulouse.

Arge (= *Hylotoma*) *coeruleipennis* RETZ., 1 ♀, Grez-Doiceau, 16-8-27.

Taxonus agrorum FALL., 1 ♀, Esneux, 18-5-27.

* *Emphytus viennensis* SCHRK., 1 ♀, Comblain-au-Pont, 21-6-27.

Selandria serva F. var. *mascula* FALL., 1 ♂, Esneux, 18-5-27.

Rhogogastera lateralis F., 1 ♂, Esneux, 18-5-27.

Sciapteryx costalis KLUG., 1 exempl., Loën 9-4, un autre Mouland, 1-4.

Tenthredopsis excisa THS., C Comblain-au-Pont, 29-5-27.

T. nassata L., 1 exempl. Ile Moncin (Liège), 25-5.

* *Tenthredo mandibularis* F., 1 ♂, Mouland, 29-5.

Allantus arcuatus FÖRST., var. *melanoxystron* ENSL., 1 ♀, Esneux, 26-5-26, une autre Loën, 26-7-27.

Pristiphora pallidiventris FALL., 1 ♀, Esneux, 18-5-27.

Amasis crassicornis ROSSI, 1 exempl., Comblain-au-Pont, 30-5, (1).

(1) Avec ENSLIN, KONOW et LAMEERE, nous considérons les *Cimbicines* comme faisant partie des *Tenthredinides*.

CHRYSIDIDES

Cleptes semiauratus L., 3 exempl., dont un au moins de la var. *pallipes* LEP. à l'intérieur d'une maison, contre les vitres; Mouland 10 et 12-7 (BARLET).

POMPILIDES

* *Pompilus fumipennis* ZETT., 1 ♀, Comblain-au-Pont, 27-5. WESMAEL ne cite cette espèce que des dunes (M.).

* *P. sericeus* V. D. L., 1 ♂, 1 ♀ Loën, 22-7 (M.).

* *P. pectinipes* V. D. L., var. *campestris* WESM., 1 ♀, Hamme-Mille, 29-8 (M), plusieurs ♀ environs de Bruxelles, VI à X (CR.).

* *Priocnemis femoralis* DAHLB., 1 ♀, Uccle, 4-9-27 (CR.).

* *P. pusillus* SCHÖDTE, 1 ♀, Rabais, 13-9-25 (L. BRAY); une autre Torgny, 7-8 (M.), plusieurs autres: environs de Bruxelles, IX-X (CR.).

Evagetus bicolor LEP., 1 ♀, Comblain-au-Pont, 3-6 (M.).; AC environs de Bruxelles (CR.).

MUTILLIDES

* *Mutilla rufipes* F., var. *nigra* BERLAND, **Fn. nov. var.**, 1 ♂, Boitsfort, 14-7 (CR.).

SPHÉGIDES

** *Miscophus spurius* DAHLB. (= *niger* DAHLB.), **Fn. nov. sp.**, ♂ ♀ Boitsfort, Averbode, Buysinghen, VIII-IX, 1923, 26 et 28 (CR.); 1 ♀, Hamme-Mille, 29-8-28 (M.). (Détermination confirmée par M. Ed. DUBOIS).

Gorytes (Hoplisis) quinquecinctus F., 1 ♂, Hoeylaert, 5-7-27 (CR.).

Nysson spinosus FÖRST., 1 ♂, Loën, 6-5; c'est ma première capture de cette espèce aux environs de Liège! (M.).

Trypoxylon attenuatum SM., 1 ♀ d'une Ronce de Chaudfontaine, fin mai. Espèce plus C que *figulus* autour de Liège! BEQUAERT l'a donnée comme CC. (M.).

Crabro (Clytochrysus) cavifrons THS., 4 exempl.: La Xhavée, 23-6, Loën, 8-7, Wépion, 14-7 (M.), 1 ♂, Oostcamp, 4-7-26 (CR.).

* *C. (Ectemnius) nigrinus* H. SCH., 1 ♂, Uccle, 19-8 (CR.), un autre Sy, 27-7 (M.).

* *C. (Coelocrabro) cinxius* DAHLB., 1 ♂ d'un nid dans le Sureau, d'Esneux, 18-4 (M.).

Pemphredon lugubris LATR., 2 ♀, Liège, dont une chez moi, en juin; R dans ma région (M.).

- * *P. morio* V. D. L., 1 ♀, Wépion, 14-7 (M.) (1).
- * *Stigmus pendulus* V. D. L., 1 ♀, Souverain-Wandre, 11-7 (M.).
- * *Passaloecus corniger* SHUCK., 1 ♂, La Xhavée, 11-7, (M.).
- * *Ammoplanus Perrisi* GER.: une 2^e ♀, Sy, 27-7, en fauchant les prés sauvages (M.).

VESPIDES (M.).

Odynerus (Symmorphus) bifasciatus L., 2 ♀, Souverain-Wandre et La Xhavée, VI-VII.

- O. (Ancistrocerus) parietinus* L., 2 ♀, La Xhavée, fin VI-VII; une autre Mouland, 3-7; AC dans ma région.
- * *O. (Lionotus) minutus* F., 1 ♂ 1 ♀, Comblain-au-Pont, V-VI.
- * *Polistes gallicus* L. Un nid, Lamorteau, 22-7-22 (var. *Geoffroyi* LEP.); 1 ♀, var. *biglumis* L., Torgny, 3-6-23 (L. BRAY).

APIDES

Prosopis minuta F. (= *brevicornis* NYL.) 1 ♀ 1 ♂, Wépion, 14-7, la ♀ appartenant à la var. * *atrata* FÖRST., **Fn. nov. var.** (M.).

- * *P. cervicornis* COSTA, 1 ♂, Wépion, 14-7 (M.).
- P. variegata* F., 1 ♀, Hamme-Mille, 29-8 (M.); Boitsfort, 10 et 11-VIII (CR.).
- ** *P. nigrita* F., **Fn. nov. sp.**, 2 exempl. Botassart, 2-7-95 et 24-6-96 (Coll. DE MOFFARTS, Musée Bruxelles) (CR.).
- * *Xylocopa violacea* F., plusieurs exempl. sur les fleurs de Glycine, chez M. L. BRAY, Virton, fin-mai 1904 (M.).
- Ceratina cyanea* KY, C à Brialmont (Tilff), butinant surtout *Echium*, mais aussi *Veronica Chamaedrys* et autres fleurs variées; AC Comblain-au-Pont; V-VI (M.).

GENRE OSMIA (M.).

- Osmia papaveris* LATR.: 1 ♀, Loën, 1-7, ma 1^{re} capture.
- O. villosa* SCHCK., 1 ♂, Comblain-au-Pont, 28-5, sur *Hippocrepis*; 1 ♀, ibid. sur *Crepis*, 13-6; une autre, Lanaye, 1-7.
- * *O. Solskyi* MOR., 1 ♂, Mouland, 23-5 (LERUTH).
- * *O. fuciformis* LATR., 2 ♀, Comblain-au-Pont, 30-5, sur Hippo-

(1) *P. Shuckardi* MOR. a été cité par erreur comme **Fn. nov. sp.** dans notre dernière liste (1928, p. 172). Il a été signalé déjà par J. BECQUAERT dans *Het botanisch Jaarboek*, 1909, p. 39, comme C à Alost, Wetteren, etc.

crepis; deux autres sur *Lotus corniculatus* Martin (Esneux), 6-6.

- * *O. pilicornis* SM., Martin (Esneux) fin IV, 1 ♂ et plusieurs ♀ butinant *Orobis tuberosus*; plusieurs ♀, Virton, notamment 10-4 et 27-6 (BRAY).
- * *O. uncinata* GERST., 1 ♀, Brialmont, 5-5.
- Eriades florissomnis* L., 1 ♀, Esneux, 6-5, 1 ♂, Fouron-St-Martin, 2-6 (M.), un autre exempl., Rabais, 2-6-18 (BRAY).
- Megachile Willughbiella* KY, ♂ ♀, Jardin Botan. de Bruxelles, VI-VII (CANTENS, CR.); 1 ♀, Virton, 3-7-18 (BRAY).
- M. lignisea* KY, 1 ♂, La Xhavée, 11-7, un autre Mouland, 20-8 (LERUTH).
- Coelioxys rufescens* LEP., 1 ♀, Loën, 22-7, une autre Virton, 2-7-18 (BRAY).
- * *C. acuminata* NYL., AC dans le jardin de M. BRAY à Virton, en 1917: ♂♂ VI-VII; ♀♀ VII-VIII (M.).

GENRE HALICTUS: Un certain nombre de nos *Halictus* ont été revus avec beaucoup d'obligeance et de compétence par M. P. BLÜTHGEN, de Naumburg a/Saale.

- * *Halictus maculatus* SM., 3 ♂ et 1 ♀, Lamorteau et Torgny 6 et 7-VIII (M.); 1 exempl. Hermalle, 1 ♀, Noirfontaine, septembre (DE MOFFARTS); ♂ ♀, Houyet, juillet 1925 (CR.).
- * *H. rufocinctus* NYL., 2 exempl., Strée, 18-5-94 et 4-6-98 (DE MOFFARTS).
- H. lativentri* SCHCK. Cette espèce est C et a dû être souvent confondue avec * *quadrinotatus* KY, qui semble bien rare: nous n'en avons jusqu'ici qu'un ♂ (Louvain, 8-9-26, M.).
- * *H. lucidulus* SCHCK., ♀, Jardin Bot. de Bruxelles, 8-7-25 (CR.); ibidem, août 25 (CANTENS).
- ** *H. semilucens* ALFK., **Fn. nov. sp.**, ♂♂, Esneux, Aywaille, Eben VIII-IX; ♀♀, Esneux, Comblain-au-Pont, Chaudfontaine, V et VIII (1924-28, M.); 1 ♂, Crainhem, VIII-25 (CANTENS); ♀, Houyet, 18-7-25, Rhode-St-Genèse, 28-5-28 (CR.).
- H. minutulus* SCHCK., 1 ♂, Chaweresse (MÉRY), 15-7-25, un autre Sy, 27-7; 1 ♀ sur *Potentilla verna* Loën, 6-4-26; 3 autres, Lixhe, 31-5-25, Esneux, 12-4-26 et Comblain-au-Pont, 6-7-27 (M.); 1 ♀, Botassart, 29-5-97 (DE MOFF.).
- * *H. fratellus* PÉREZ (= *Frey-Gessneri* ALFK.), 2 ♂, Botassart, fin VII-95 (DE MOFF.) (1).

(1) Supprimer l'indication d'une ♀ à Linkebeek, même revue, 1928, p. 174.

H. Laticeps SCHCK., n'est pas rare : ♂♂, Sy, 27-7-28 et 11-8-27 ; ♀♀, Lives, Vieuxville, Sy, IV-V ; Sy et La Xhavée, mi-VII à fin VII (1926 à 28) (M.) ; 1 ♀, Botassart, 2-5-95, une autre Embourg, 25-3-95 (DE MOFF.).

* *H. pauxillus* SCHCK. (= *immarginatus* SCHCK.) 1 ♂, Lamorteau, 6-8-28 (M.) ; 1 ♂, Boitsfort, 5-9-24, 1 ♀, Woluwe, 28-3-26 (CR.).

** *H. linearis* SCHCK., **Fn. nov. sp.**, 1 ♀, Eben, 3-9-27 (M.) (det. BLÜTHGEN).

** *Sphecodes puncticeps* THS., **Fn. nov. sp.**, ♂♂, Uccle, Averbode, Stockel, VII-VIII ; ♀♀, Assebroeck, Snelleghem, Boitsfort, V-VII (CR.), ♀, Rabais, 22-7-17 (BRAY).

** *Sphecodes longulus* V. HAG., **Fn. nov. sp.**, ♀, Snelleghem, 12-7-26, Boitsfort, 11-8-28 (CR.) ; Eben, 4-7-26, Park (Louvain), 18-8-25 (M.).

GENRE *ANDRENA* : Les espèces du groupe *A. nana* KY commencent à être mieux connues depuis les travaux de PERKINS. *A. subopaca* NYL **Fn. nov. sp.**, nous paraît la plus C du groupe en Belgique. On l'aura souvent confondue avec *A. parvula* KY et *A. minutula* KY, qui sont moins fréquentes, quoique pas rares. On peut y ajouter dès maintenant :

** *Andrena spreta* PÉREZ, **Fn. nov. sp.**, 1 ♀, Loën, 8-7 (M.).

** *A. saundersella* PERK., **Fn. nov. sp.**, ♂, Uccle, 10-4-27, ♀, Stockel, 1-6-25 (CR.) ; ♂♂ du 1^{er} avril au 26-V, Marche-les-Dames (sur *Arabis arenosa*), Tilff, Esneux ; ♀♀, Esneux, Fraiture, Loën, fin-V et VII (M.), 1926-28.

** *A. alfenella* PERK., **Fn. nov. sp.**, 1 ♀, Ixelles, 17-7-27, une autre, Stockel, 1-6-25 (CR.), une autre Loën, 6-6-25 (M.).

Parmi les autres *ANDRENA* :

A. flessae PANZ., M. BRAY précise que cette esp. a été CC certaines années dans son jardin, à Virton, où elle butinait une variété horticoles de Giroflée, ♂♂ et ♀♀, fin mai.

* *A. thoracica* F., 2 ♀, Rabais, 4-8-21 (BRAY).

* *A. fulvago* CHRIST, 1 ♂, Esneux, 26-5-26, un autre Pepinster, 20-5-28 ; 1 ♀, Esneux, 4-5-27 (M.) ; 1 ♂, Strée, 18-5-94 (DE MOFF.).

A. fucata SM., ne semble pas rare : ♂♂, Esneux, Comblain-au-Pont, Chaudfontaine, Trooz, Fouron St M., V à VI ; ♀♀, Tilff, Fouron St M., La Xhavée, Loën, mai à VII (M.) ; Mouland (LERUTH) ; Rabais (BRAY).

* *A. florea* F., C sur la Bryone, Souverain-Wandre, 11-7-28 ; importante colonie d'environ 50 nids dans un sentier sablonneux, entre La Xhavée et Jupille, même jour (M.).

A. chrysocleles KY, 3 ♀, Fouron-St-Martin, 2-6 (M.).

A. labialis KY, 1 ♂, bois de St Mard, 29-5-24 (BRAY) ; 1 ♀, Loën (M.), une autre Marloie (LERUTH), VII ; C aux environs Brux. mai (CR.).

* *A. tarsata* NYL., ♂♂ et ♀♀, C sentier de Hockai à la Baraque-Michel, 18-7 ; 1 ♂, Floriheid (Malmédy), 20-7 (M.).

* *A. argentata* SM., 1 ♂, Saint-Michel-lez-Bruges, un autre Assebroeck, VII-26 (CR.).

* *Dufourea vulgaris* SCHCK., 1 ♀, Botassart, 30-7-95 (DE MOFF.).

GENRES *BOMBUS* et *PSITHYRUS* (M.), déterminés par M. F. J. BALL :

* *B. pratorum* L. *styriacus* HOFF., 1 ♀, Lamorteau, 6-8.

* *B. jonellus* KY *flavicolor* F. W., 1 ♂, La Xhavée, 11-7.

B. hypnorum L. *Höfferi* VERH., Fouron St M., VI et La Xhavée, VII.

* *B. hypnorum* L. *callidus* ER., 1 ♂, Mouland, 20-6.

B. derhamellus KY, 4 exempl. : Loën et Tilff IV, Esneux V, Rabais VIII.

B. hortorum L. *nigricans* SCHMDKT, 1 ♂, Rabais, 7-8.

B. ruderatus F., 1 ♀, Ophain, VIII (ACHEROY), 1 ♀, Cornesse, 20-5.

* *Psithyrus bohemicus* SEIDL. (= *distinctus* PÉREZ) à séparer de *vestalis* FRCR., 1 ♂, Jalhay, Hautes-Fagnes, 19-8-22, 1 ♂, Hockai, 18-7-28 ; 1 ♀, Chaudfontaine, 15-5-24.

* *P. barbutellus* KY, 1 ♂, Hockai, 18-7.

P. campestris PANZ. *leeana* KY, 1 ♀, Martinrive, 13-6.

* *P. sylvestris* LEP. (= *quadricolor* LEP.) *citrinus* SCHM., 1 ♂, Brialmont (Tilff), 23-6.