

Description de deux Myodaires supérieurs

SUD-AFRICAINS

PAR LE

D^r J. VILLENEUVE DE JANTI

1. *Tachinomima Braunsi* n. sp. ♀. — Espèce robuste, à tête blanche sur le péristome de laquelle sont plantées, non loin de l'angle inférieur de l'œil, 5-7 courtes soies noires discales assemblées et caractéristiques.

Le thorax rayé de 4 lignes noires en avant de la suture et de 5 lignes en arrière, apparaît cendré mais plus ou moins largement roux à son pourtour et sur une partie des pleures; roux entièrement sont les épaules et le scutellum. L'abdomen, à fond d'un rougeâtre obscur visible par reflets changeants sous une épaisse pruinosité blanche, prend même une coloration blanche presque uniforme s'il est vu d'arrière très obliquement. Pattes rousses à tarsi noirs (les tarsi I dilatés chez la femelle); les fémurs sont noirs à leur insertion et rembrunis sur la portion distale de leur tranche inférieure. Ailes d'un gris-hyalin ayant 6-7 cils serrés à l'origine de la nervure III.

Bande frontale couleur de miel; antennes noires allongées, marquées de roux sur le 2^e article; chète antennaire noir, épaissi jusque près de son extrémité, son 2^e article très allongé; trompe noire, palpes minuscules et pâles.

Orbites couvertes de forts microchètes noirs et nanties de 2 longues soies orbitaires; 1 longue soie frontale réclive et une soie préverticale transverse; soies ocellaires développées. Thorax: 3 dc.; 3 st. (2 + 1); pas de soie intraalaire antérieure. Soies abdominales fortes et disposées régulièrement: segment I excavé à fond et nu; segment II ayant une paire de discales et une paire de marginales médianes; segment III ayant une paire de discales et une rangée complète de marginales; segment IV avec les discales en une rangée complète plus ou moins régulière.

Taille: 13 mm.

Dédiée au D^r BRAUNS qui a pris une seule ♀ à Willowmore, le 7 janvier 1919.

2. *Myxarchiclops major* n. sp. ♀. — Ressemble beaucoup à *Myx. caffer* VILLEN., mais est plus grand et plus robuste. S'en distingue par: l'absence des petites soies apicales croisées au scutellum, lesquelles sont remplacées par 2 longues et fortes soies raides préapicales et subhorizontales; le scutellum, en outre, porte une rangée complète de soies discales développées — par les cils de la nervure III réduits à 4 au lieu de continuer jusqu'à la petite transverse. Enfin, la bande médio-occipitale prend en haut, derrière la plaque ocellaire, la même couleur rougeâtre que la bande médio-frontale.

Taille: 10 mm.

Deux ♀ provenant de la Colonie du Cap (D^r BRAUNS) et volant en octobre.