

Aphodius confusus ER, Boitsfort, 13-4-5. Tervueren, 1-9-1909.
Fn. nov. sp. Dans les excréments de Chevreuils. Espèce commune en
 Allemagne septentrionale. Elle n'était pas prévue pour notre région
 dans le dernier catalogue de EVERTS.

— La séance est levée à 18 h. 45 m.

Notes préliminaires sur les Mantides

RECUEILLIS AUX INDES ORIENTALES NÉERLANDAISES

au cours du voyage
 de S. A. R. le Prince Léopold de Belgique

PAR

FRANZ WERNER

(Vienne)

Parhierodula Leopoldi n. sp.

♀ S. Manoembai (I. Aroe) 25-3-1929.

Cette espèce diffère de *P. decipiens* WERNER de la Nouvelle Guinée (Treubia, vol. III, livr. 3-4, 1923, p. 399), par la forme moins robuste du pronotum dont les côtés antérieurs forment un angle moins aigu et sont moins distinctement séparés de la dilatation surcoxale; aussi la prozone est plus largement arrondie en avant, et la partie postérieure, pas dilatée, de la métazone est plus courte. Ajoutons que les hanches antérieures ne sont pas parfaitement noires à la face intérieure mais largement bordées de jaunâtre au bord antérieur et que l'espèce est de couleur verte (couleur feuille-morte chez *decipiens* et *tamolana*), il sera impossible de confondre ces espèces quand même très voisines l'une de l'autre.

Il est intéressant à remarquer que trois espèces différentes de *Parhierodula* des îles Aroe ont les hanches antérieures parfaitement (*Leopoldi* et *atrocoxata*) ou en partie (*aruana*) noires en dedans.

	Type	<i>Leopoldi</i> paratype	<i>decipiens</i>
Longueur totale	74 mm.	65 mm.	73 mm.
Longueur de l'élytre	28,4	43,5	50
Longueur des cuisses antérieures	20,6	18,5	22
Longueur du pronotum	26,6	24	27,5
Largeur du pronotum	11,5	10,6	12,5

Longueur de la prozone	7,5	6,8	7,2
Longueur de la partie non dilatée de la métazone	4,5	6,2	9

Épines des hanches antérieures 8-9; jaunes, épines discoidales et plus grandes épines intérieures des cuisses antérieures noires, prosternum avec quatre points noirs au bout postérieur; mesosternum avec deux points. Stigma des élytres entouré de noir.

Hierodula pulchripes n. sp.

♂ Forêt vierge entre Paloe et Koelawi (Celebes).

Voisine de *H. parviceps* STAL, mais tête plus large que le pronotum, la dilatation distinctement rétrécie en arrière et pas noire près de la base. Hanches antérieures noires en dedans, épines 5, petites blanches; cuisses et tibias noirs dedans, jaunes au bord supérieur; tarses antérieurs noirs, aussi toutes les épines des cuisses et des tibias. Élytres dépassant beaucoup le bout de l'abdomen, aire costale verte, opaque, aire discoidale fort enfumée, luisante, stigma blanc.

Cette espèce me semble unique parmi toutes les espèces du genre, ayant les pattes antérieures presque parfaitement noires dedans.

Longueur totale	62 mm.
Longueur du pronotum	19,5
Longueur des élytres	25,5
Longueur de la prozone du pronotum	4,5
Largeur du pronotum	5,5

Creobroter celebensis n. sp.

♂♂ Menado, Celebes.

♂ Tanggarie-Menado.

Cette nouvelle espèce se distingue de *C. sumatranus* DE HAAN, la seule dont les mâles ont les élytres unicolores, par une corne du vertex et par la couleur verte des élytres qui sont très peu teintées, presque hyalines chez l'espèce sumatrane.

Dimensions du type en millimètres (les autres presque identiques):

Longueur totale.	28
Longueur du pronotum	5,7
Longueur de la cuisse antérieure	7,2
Longueur de l'élytre	25

GIGLIO-TOS n'indique aucune espèce de *Creobroter* comme provenant de Celebes, mais je me souviens avoir trouvé, parmi les Mantides faisant partie de la collection de SARASIN, un seul exemplaire (♀) d'une espèce qui pourrait être *C. urbana* F.

Cette espèce ne peut pas être le mâle de *C. fasciatus* WERNER ("Konowia", vol. IV, 1927, p. 278) connue par une ♀ seulement et provenant de Magondouw, N. Celebes, parce que cette dernière est dépourvue d'une corne sur le vertex; elle est caractérisée, du reste, par la forme allongée des yeux.