

— M. D'ORCHYMONT fait une relation sommaire de son voyage en Crète, en Asie Mineure et dans les Balkans. Il en raconte certaines péripéties et montre d'intéressantes photographies.

— La séance est levée à 18.30 h.

ADDITIONS ET RECTIFICATIONS

AUX

Carabidae du "Coleopterorum Catalogus"

DE M. E. CSIKI

DEUXIÈME NOTE (1)

PAR

P. DE BASILEWSKY

Ayant étudié d'une façon plus détaillée le remarquable ouvrage de M. E. CSIKI, j'ai relevé encore un certain nombre de lacunes et d'erreurs que je vais signaler ici.

CARABINAE I.

(15 octobre 1927)

- P. 28. — Ajouter *Callisthenes Shelkownikowi* Ph. ZAITZEV, *Bull. Mus. Caucase*, XI, 1918, pp. 264, 269-70. Perse.
- P. 150. — Ajouter *Chrysocarabus splendens* v. **Vacheri** nom. nov. (*rufofemoratus* LAP. [nec LETZN., nec LOMN., nec MOTS.], *Misc. Entom.*, XVII, 1910, p. 57, BARTHE, *Carabidae franco-rhén.*, *Misc. Ent.*, XXVI, 1924, éd. I, p. 496, id. éd. II, p. 40). Ariège.

Pour éviter toute confusion possible entre les formes décrites par LETZNER, LOMNICKI et MOTSCHULSKY, je propose, pour cette variété, le nom nouveau de *Vacheri*, la dédiant ainsi à M. G. VACHER de Lapouge.

- P. 220. — Ajouter *Eucarabus Ulrichi* v. *Kardaschi* FLEISCHER, *Casopis Csl. Spol. Entom.*, XXIII, 1956, p. 57 Vlarapass.

- P. 286. — *Archicarabus taedatus* v. *vancouvericus* CSIKI n. n. (*bicolor* WALK.). Le *bicolor* décrit par WALKER est non un *Carabus* mais

(1) La première note a paru dans: *Bullet. Ann. Soc. Entomol. Belgique*, LXXI, 1931, p. 95.

un synonyme du *Callisthenes moniliatum* LEC. Donc le nom nouveau est inutile.

Pp. 308-13. — M. CSIKI n'a pas eu connaissance de l'article de FAZ (*Rev. Chilena Hist. Nat.*, XXX, 1925, p. 10-23) où l'auteur passe en revue les différentes formes du genre *Ceroglossus* et en décrit 26 nouvelles.

Le Dr St. BREUNING ayant publié depuis ce temps sa Monographie der Gattung *Ceroglossus* (*Eos*, IV, 1928, pp. 283-338), je crois inutile de signaler les formes non citées.

CARABINAE II.

(22 décembre 1927)

- P. 355. — *Leistus* (incert. sed.) *rotundicollis* MOTS. et sa variété *libialis* MOTS. font partie du sous-genre *Leistidius* DAN.
- P. 356. — Ajouter *Nebria* (s. str.) *aleuta* VAN DYKE, *National Geographic Soc.*, II, 1, 1924, p. 5-6.
- P. 359. — Ajouter *Nebria* (s. str.) *Gyllenhali* ab. *Schneideri* MÜNSTER, *Norfluglö*, en *Zoologisk Skisse*, 1885.
- P. 362. — *Nebria* (s. str.) *limbigera* SOLSKY. Ajouter aux localités : Inde, Pamir, Chine.
- P. 383. — *Nebria* (*Alpaeus*) *Schlegelmilchi* AD. La localité citée : Mont-Dore est absolument fausse. Ce Carabique provient du Caucase.
- P. 398. — *Notiophilus orientalis* CHD. Ajouter aux localités : Inde, Cachemire.
- P. 407. — *Omophron distinctum* BANNINGER, *D. E. Z.*, 1918, p. 108, et non 1908.
- P. 410. — *Omophron Oberthuri* GESTRO. La localité indiquée : Birmanie, est fausse. Le type provient du Sikkim. Il existe également dans l'Inde (Prov. Unies).
- P. 411. — *Omophron striaticeps* GESTRO. — Ajouter aux localités : Laos.
- P. 412. — *Omophron testudo* ANDREWES. Ajouter aux localités : Birmanie.
- P. 431. — Ajouter :

ANENTMETUS ANDREWES.

ANDREWES, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (9), XIV, 1924, p. 585.

BANNINGER, *D. E. Z.*, 1927, p. 191-2.

pluto ANDREWES, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (9) XIV, 1924, p. 586
 Inde.

- P. 438. — Ajouter *Siagona discoidalis* KOLBE, *St. E. Z.*, 1895, LVI, p. 35 lac Victoria.
- P. 458. — *Siagona depressa* F. Ajouter aux synonymies : *tomentosa* HERBST, *Nat. Syst. Ins. Käfer*, X, 1806, p. 260, t. 175, f. 12 (Scarites).
- P. 438. — *Siagona europaea* DEJ. Ajouter aux localités : Bélouchistan, Arabie, Transcaspié, Nubie, Abyssinie. L'indication Sénégal est très douteuse.
 Ajouter aux synonymies : *Leprieuri* GUER., *Rev. Zool.*, 1838, p. 177.
- P. 440. — *Siagona pumila* ANDR. Ajouter aux synonymies : *hirta* STURM., *Cat.* 1826, p. 195.
 DEJEAN, *Species Col.*, V, 1831, p. 476.
- P. 440. — Ajouter *Siagona Sesostris* CHD. Monographie des Siagonides. *Bull. Moscou*, 1876, I, p. 103.
 (*brunnipes* CHD. non DEJ.) l. c. p. 102.
 KOLBE, *St-E. Z.*, 1895, p. 350
 Sénégal, de l'Oubangui à l'Abyssinie, Egypte.
- P. 441. — Ajouter *Siagona sulcicollis* BON., *Observ. Ent.*, 1813, p. 459. ?
- P. 448. — *Mouhotia Batesi* LEWIS. Ajouter aux localités : Birmanie, Siam.
- P. 464. — *Oxylobus asperulus* CHD. Ajouter aux localités : Inde.
- P. 467. — *Haplogaster humeralis* a été décrit par PUTZEYS, et non par CHAUDOIR, en note à un article de ce dernier, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 151).
- P. 467. — Ajouter *Haplogaster mollita* BATES, *Ann. Mus. Civ. Gen.* (2), XII, 1892, p. 270 (*ampliatulus* var.) . . . Birmanie.
- P. 468. — Au genre *GNAPHON* ANDREWES, il faut ajouter le synonyme suivant : *ANOMODERUS* FAIRM. (non CHAUD.) *Ann. Soc. Ent. France*, 1883 (6), III, Bull. p. LV (partim).
- P. 474. — Ajouter *Distiehus rectifrons* BAT., *Ann. Mus. Civ. Gen.* (2), XII, 1892, p. 272 . Sikkim, Birmanie, Lao, Tonkin, Yunnan.
- P. 478. — *Scarites Boucardi* CHD. Comme localité, au lieu du ?, il faut indiquer : Inde, Birmanie.
- P. 479. — *Scarites ceylonicus* CHD. Ajouter aux localités : Inde, Birmanie, Laos, Annam.
- P. 480. — *Scarites eurytus* FISCH. Ajouter aux localités : Bélouchistan, Afghanistan.

- P. 481. — *Scarites guineensis* DEJ. Ajouter aux localités : Inde.
 P. 483. — *Scarites praedator* CHD. Ajouter aux localités : Inde, Sikim, Cachemire.
 P. 494. — *Sparosles striatulus* PUTZ. Ajouter aux localités : Indo-Chine, Chine.
 P. 497. — *Clivina attenuata* HERBST. Ajouter aux localités : Malaisie, Indo-Chine, Perse.
 P. 497. — Ajouter *Clivina attenuata* v. *Bhamoensis* BATES, *Ann. Mus. Civ. Gen.* (2) XII, 1892, p. 275. Bhamo
 P. 501. — *Clivina costulipennis* BAT. Ajouter aux localités : Inde, Malaisie, Sumatra.
 P. 503. — *Clivina extensicollis* PUTZ. Ajouter aux localités : Inde, Bornéo, Sumatra.

HARPALINAE I.

(12 septembre 1928)

- P. 151. — Ajouter *Ocys pravei* LUTSHNIK, *Acta Soc. Ent. Staurop.*, II, 1926. Caucase.
 P. 152. — *Ocys quinque striatus* v. *reticulatus* NETOLITZKY, a été décrit pour la première fois non dans le *Koleopt. Rund.*, 1917, mais dans le *München Koleopt. Zeit.*, IV, 1910, p. 63-6, f. 2.
 P. 152. — *Ocys quinque-striatus* v. *bergensis* NETOLITZKY, a été décrit pour la première fois dans le *München Koleopt. Zeit.*, IV, 1910, p. 66.

HARPALINAE III.

(20 mars 1929)

- P. 384. — Ajouter *Polyhirma kassaica* BENARD, *Bull. Museum Hist. Nat.*, Paris, XXXIII, 1927, p. 369-70 Kassai.
 P. 386. — Ajouter *Polyhirma reflexicauda* BENARD, *Bull. Museum Hist. Nat.*, Paris, 1925, p. 429-30 Congo français.
 P. 386. — *Polyhirma zambesiana* BENARD (*Bull. Mus. H. N.*, Paris, 1922, p. 280-1) ne peut être considéré comme synonyme de *P. sambesiana* PERINGUEY (*Ann. South African Museum*, V, 1908, p. 257).

Pour éviter toute confusion, je propose pour la première espèce le nom nouveau de **Benardi**, la dédiant ainsi à M. G. BENARD, du Museum de Paris.

- P. 396. — *Graphipterus serrator* ab. *Heydeni* KR. Ajouter aux localités : Algérie (Laghout).

* * *

Je tiens à signaler une erreur que j'ai commise dans mon article précédent. Je disais que les *Carabus septemcarinatus* et *carinatus* avaient été ainsi nommés par VICTOR, et non par MOTSCHULSKY comme le disait CSIKI. Or, MOTSCHULSKY a publié ses premiers travaux sous le nom de T. VICTOR. D'où ma confusion.