

— M. LAMEERE attire l'attention des membres de la Société sur un projet de protection de la Nature en Belgique et les prie de bien vouloir lui signaler les régions ou sites remarquables au point de vue entomologique et susceptibles d'être conservés. A ce propos, un échange de vues a lieu auquel prennent part MM. D'ORCHYMONT, GILTAY et DE WALSCHE.

— La séance est levée à 18 h.

Sur un *Elateridae* aberrant

PAR

E. FLEUTIAUX

Parmi les chasses si abondantes et si remarquables du Père A. DE COOMAN, au Tonkin, j'ai rencontré un curieux insecte se rapportant au genre *Anischia*. Ce genre, fondé sur deux espèces de Bolivie, m'a beaucoup intrigué, à l'époque où je l'ai décrit.

Si la forme de l'épistome le rapproche des *Melasidae*, la présence du labre l'en éloigne. Ses antennes sont submoniliformes, renflées vers le bout. Le pronotum est marqué à la base, en dedans des angles postérieurs, d'un long sillon parallèle au bord externe, comme il s'en voit fréquemment chez les *Elateridae*; et souvent d'un second sillon, plus court et moins profond, près du bord externe; celui-ci est indiqué par une faible carène s'abaissant en dessus en avant et s'effaçant graduellement. Les élytres ne portent aucune strie. La structure du prospectus est absolument celle des *Elateridae*. Par contre, les hanches postérieures ont une forme toute spéciale; elles sont très écartées, laissant libre au milieu, sur un large espace, le bord postérieur du métasome, à fleur de l'abdomen; leur lame, qui d'ordinaire recouvre le fémur postérieur, est presque nulle, réduite à une très faible dimension à l'intérieur. Les épisternes métathoraciques sont très étroits. Les trochanters postérieurs sont assez développés; les tarses sont simples.

Tous ces caractères rendent difficile la fixation rigoureuse de la place dans la classification. L'embarras que j'ai éprouvé m'a d'abord conduit à ranger la bête dans le voisinage des *Cerophytum*, en raison précisément des hanches postérieures enfouies; mais j'avoue que cette solution ne m'a jamais pleinement satisfait. Aussi, peu après, j'en ai fait une *Melasidae*.

D'autres après moi, qui ont eu à s'occuper de cet insecte, ont éprouvé la même incertitude. Le Dr G. HORN, chargé des *Melasidae* de la *Biologia centrali americana*, l'a rejeté de cette famille; il le considérait comme *Elateridae*. Dans le même recueil, CHAMPION, qui a

rédigé le supplément aux *Melasidae*, lui conserve la place que je lui avais assigné, en convenant qu'il est une forme intermédiaire entre les *Melasidae* et les *Elateridae*. Tandis que E. CANDÈZE, consulté, me l'a retourné avec l'étiquette : Eucnémide (*Melasidae*); mais sans avis motivé.

Je pense aujourd'hui qu'il est plus proche des *Elateridae* que des *Melasidae*. La forme de son épistome, nous la retrouvons dans le genre *Protelater* SHARP. La forme des branches postérieures est, en réduction, celle des *Dima* CHARPENTIER. C'est probablement près des *Protelater* qu'il conviendrait le mieux de la placer. J'en ai réuni plusieurs espèces qui me permettent d'établir le tableau suivant :

GÉNOTYPE : *langurioides* FLEUTIAUX

1. — Sillons basilaires externes du pronotum nuls 2.
- Sillons basilaires externes du pronotum distinct. Couleur générale uniforme 3.
2. — Sillons basilaires internes du pronotum n'atteignant pas la moitié en avant. Forme générale allongée et subparallèle. Tête et pronotum noirâtres. Elytres testacés *boliviana*.
- Sillons basilaires internes du pronotum dépassant la moitié en avant. Entièrement testacé brillant; pubescence jaune, longue, dressée, peu serrée *Germaini*.
3. — Sillons basilaires externes du pronotum très rapprochés du bord latéral 4.
- Sillons basilaires externes du pronotum éloignés du bord latéral. Ponctuation du pronotum assez grosse et peu profonde en avant. *stupenda*.
4. — Sillons basilaires externes du pronotum très courts. *mexicana*.
- Sillons basilaires externes du pronotum assez longs 5.
5. — Pronotum rétréci en arrière, élargi en avant et arrondi près des angles antérieurs *langurioides*.
- Pronotum parallèle en arrière, arrondi seulement près des angles antérieurs *vicina*.

ANISCHIA

FLEUTIAUX, *Mém. Soc. Zool. de France*, 1896, p. 300.

CHAMPION, *Biol. Cent. Amer.*, Col. III, 1, 1897, p. 667.

boliviana FLEUTIAUX, *Mém. Soc. Zool. France*, 1896, p. 300. — Bolivie.

Germaini FLEUTIAUX, *loc. cit.*, p. 301. — Bolivie.

langurioides FLEUTIAUX, *nov. sp.* — Tonkin.

mexicana FLEUTIAUX, *Ann. Soc. Ent. Belgique*, 1897, p. 261 (août).

— Mexique, Guatémala, Panama.

crassicornis CHAMPION, *Biol. Centr. Amer.*, Col. III, 1, 1897, p. 668 (août).

stupenda FLEUTIAUX, *Ann. Mus. Civ. Genova*, 1896, p. 555. — Nouvelle-Guinée. — FLEUTIAUX, *Term. fuzetek.*, 1898, p. 232.

vicina FLEUTIAUX, *nov. sp.* — Bornéo.

A. *LANGURIOIDES* *nov. sp.*

2 3/4 à 3 mm. — Oblong, légèrement atténué postérieurement, convexe; testacé plus ou moins obscur, brillant; pubescence jaune, très inclinée en arrière. Tête peu convexe, très finement pointillée. Antennes brunes, derniers articles plus clairs; ne dépassant pas la base du prothorax, épaissies vers le bout; 2^e article subégal au 4^e; 3^e plus long que les suivants; dernier plus long et atténué au sommet. Pronotum moins long que large, élargi en avant jusqu'au delà de la moitié, rétréci près des angles antérieurs, convexe; ponctuation fine en arrière, plus grosse et écartée en avant; sillons basilaires internes dépassant la moitié; sillons basilaires externes peu marqués. Ecusson plan. Elytres ovales, atténués, non striés, très finement pointillés. Dessous et pattes de même couleur. Saillie prosternale parallèle, carénée au milieu et rebordée latéralement. Tarses minces, simples, moins longs que le tibia correspondant.

Tonkin: Lac Thô, Hoa-Binh (A. DE COOMAN). Aspect d'un petit *Languridae*.

A. *VICINA* *nov. sp.*

3 1/4 mm. — Oblong, convexe, testacé brillant; pubescence jaune. Tête peu convexe, finement ponctuée. Antennes épaissies vers le bout, testacé obscur, moins foncées au sommet. Pronotum subparallèle, arrondi et rétréci près des angles antérieurs, convexe, ponctuation fine en arrière plus grosse et écartée en avant. Sillons basilaires internes dépassant la moitié; sillons basilaires externes bien marqués. Elytres convexes, atténués en arrière, arrondis à l'extrémité, non striés, très finement pointillés. Dessus de même couleur. Pattes plus claires.

Bornéo: Sandakan (BAKER).

Diffère de *A. langurioides* par la forme parallèle du pronotum en arrière et par les sillons basilaires externes bien marqués.