

Elle est cependant capable d'acquiescer assez vite la connaissance absolue d'une intensité donnée d'un parfum spécial. Cette connaissance s'impose nécessairement, lorsque l'intensité invariable à connaître doit être alternativement comparée avec une intensité plus faible et une intensité plus forte ; mais elle se constitue aussi assez rapidement quand le sujet peut choisir un assez grand nombre de fois l'une des intensités d'un même couple invariable.

Normalement les processus psychologiques tributaires de perceptions olfactives sont d'abord des processus de généralisation plus ou moins complexes, dans leurs causes, leurs mécanismes et leurs effets. Mais ils tendent à se simplifier, à la fois dans leurs causes, leurs mécanismes et leurs effets, et à se réduire à des automatismes déclenchés par une irritation élémentaire, particulière, et constitués d'une élaboration nerveuse et de mouvements rigoureusement sélectionnés.

Index bibliographique

- BIERENS DE HAAN, J.-A. — Ueber Wahl nach relativen und absoluten Merkmalen. Versuche an Affen und Bienen. *Zeitschr. f. vergl. Physiol.*, 1928, p. 462-487.
- DE KONINCK, H. — Le problème des rapports entre les insectes et les fleurs et les potentialités psychiques de l'Abeille. *Ann. et Bull. Soc. roy. zool. Belgique*, 1928, t. LIX, p. 58-89.
- GAYTON, A.-H. — The discrimination of relative and absolute stimuli by albino rats. *Journ. of Comp. psychol.*, 1927, p. 93-106.
- TELLIER, Mlle M. — Reconnaissance par le toucher d'objets connus par la vue chez le Macaque. *Bull. Soc. roy. Sci. Liège*, 1932, n° 5, p. 114-117.
- Le sens du toucher et la généralisation, le relatif et l'absolu chez le Macaque. *Bull. Soc. roy. Sci. Liège*, 1932, n° 10,
- VERLAINE, L. — L'Instinct et l'Intelligence chez les Hyménoptères. III. La reconnaissance du nid et l'éducabilité de l'odorat chez la *Vespa germanica*. *Ann. Soc. roy. zool. Belgique*, 1924, t. LV, p. 67-117.
- VII. L'abstraction. *Ann. Soc. roy. zool. Belgique*, 1927, t. LVIII, p. 59-88.
- VIII. Note complémentaire sur l'abstraction. *Ann. et Bull. Soc. Entom. Belgique*, 1928, t. LXVIII, p. 240-250.
- XIV. L'abstraction (3^e note). *Ibidem*, 1931, t. LXXI, p. 229-238.
- XV. Les Guêpes ont-elles un langage ? *Mém. Soc. roy. Sci. Liège*, 1932 (a), 3^e série, t. XVII, 16 p.
- Psychologie comparée ou la physiologie du comportement. *Cahiers de la Centrale du P. E. S. de Belgique*, 1932 (b), 179 p.

Lamellicornes Coprophages (Coléopt.)

PAR

JOSEPH J. E. GILLET

Plesiocanthon, nov. gen.

Détaché du gen. *Canthon* HOFFS. ; en diffère spécialement par ses hanches intermédiaires fortement écartées et parallèles, ses tibias antérieurs coupés droit à l'extrémité, ses tarses et ses éperons antérieurs très petits, sa taille peu développée.

Plesiocanthon gibbicollis

(*Canthon*) *gibbicollis* HAROLD, *Berl. Ent. Zeitschr.*, XII, 1868, p. 138.

Espèce remarquable reçue d'Argentine (BRUCH et H. RICHTER) ; je la connais de Rio Grande do Sul, Brésil, du Paraguay et du Territoire des Missions, Argentine ; elle est parasite de *Bulimus haemostoma* SCOP., grand Gastéropode qui étend son habitat à l'est de la Grande Cordillère, à travers le Brésil jusqu'en Guyane.

P. gibbicollis se nourrit du mucus que secrète le *Bulimus*, et par suite des mouvements du mollusque est parfois entraîné jusque même sous le " manteau ".

Voir :

Fried. STEIN, *Berl. Ent. Zeitschr.*, XI, 1867, p. 212.

BURMAISTER, *Stett. Ent. Zeit.*, 1873, p. 417.

KOLBE, *Suppl. Zool. Jahrb.*, 1905, p. 494.

Catharsius Adamastor n. sp.

Espèce très convexe, d'un noir de poix brillant, voisine de *C. gorilla* THOMS. (*Arch. Ent.*, II, 1858, p. 51, t. 3, fig. 4) ; organes de la bouche, pattes et dessous du corps garnis de longs poils d'un brun rougeâtre ; tête et prothorax densément ciliés de poils de même couleur ; antennes d'un brun roussâtre.

♂. — Tête plus large que longue, fortement retroussée sur les côtés et en arrière des joues. Clypeus avec une échancrure large et peu profonde au bord antérieur; joues rectangulaires très proéminentes latéralement; canthus oculaires très aigus; corne céphalique en forme de languette inclinée en avant et d'autant moins proche du bord que l'exemplaire est plus développé; cette languette est peu convexe en avant et porte une trace de carinule à l'arrière. Toute la surface de la tête est couverte d'une ponctuation simple sur les côtés, râpeuse à la partie centrale, y compris la corne et le vertex.

Prothorax à angles antérieurs lisses reliés aux fovéoles latérales par une impression oblique également lisse; partagé en deux par une large carène en ligne brisée à quatre segments légèrement ondulés, les deux moyens séparés par une petite échancrure, les deux autres contournés à l'extrémité en angle aigu à sommet arrondi. La partie antérieure est tronquée, marquée d'un pli caréniforme peu apparent, retroussée tant aux angles antérieurs qu'aux bords antérieur et postérieur; la surface entièrement chagrinée s'incurve régulièrement du centre aux bords latéraux. La partie élevée est de surface inégale entièrement couverte d'une fine granulation offrant trois espaces plus ou moins impressionnés: l'espace médian est marqué d'un sillon longitudinal rejoignant le bord basilaire; celui-ci est entièrement rebordé et a son milieu en forme d'arc convexe proéminent.

Elytres presque aussi larges que longs, à stries superficielles couvertes de points transverses; intervalles plans marqués d'une ponctuation excessivement fine et dense; carène latérale dépassant le milieu. Pygidium convexe, entièrement rebordé, à ponctuation uniforme, forte et serrée. Métasternum ponctué, sillonné à la partie centrale et creusé en fossette à l'apex; la ligne de séparation d'avec le mésosternum en angle aigu. Epine terminale des tibias antérieurs aigüe, un peu recourbée, celle des tibias postérieurs en forme de lamelle tronquée et subdentée à l'extrémité.

♂ *minor*. — Corne céphalique subconique; joues proéminentes; carène prothoracique en arc convexe presque régulier et non contourné aux extrémités; sillon dorsal effacé.

♀. — Joues non ou très peu proéminentes; corne céphalique remplacée par une carène épaisse reliée aux deux sutures génales, trituberculée, le tubercule médian, conique, plus robuste que les deux autres; les trois tubercules parfois seuls apparents. Prothorax moins élevé, carène réduite à un arc convexe à peine échancré au milieu; granulation plus forte. Pygidium moins convexe.

Longueur: 26 à 30 mm.

Provenance: Afrique orientale anglaise: Mont Kénia.

Type: ma collection.

Catharsius Alpheus, n. sp.

Espèce de même forme que *C. Eteocles* CAST., mais nettement plus large. Noir, moins brillant, pilosité du dessous du corps d'un brun rougeâtre, antennes noires.

♂. — Tête semi-elliptique, clypeus à côtés plus arrondis, joues proéminentes au côté externe et prolongées en arrière; sutures génales moins en relief; corne céphalique droite, subconique, effilée et *non dilatée en arc* convexe à sa base, comme c'est le cas chez *C. Eteocles*. Protubérances prothoraciques visiblement plus rapprochées et plus aiguës. La sculpture des téguments de la tête et du prothorax est semblable, mais beaucoup plus fine et plus rapprochée, les stries des élytres sont superficielles, marquées de points transverses et les interstices, plans, couverts d'une ponctuation très fine et écartée.

Longueur: 25 à 27 mm.

Provenance: Deutsch-Ost-Afrika: Tura-Tschaja.

Type: ma collection.

Copris Morphæus, n. sp.

Espèce robuste, d'un noir brillant, voisine de *C. Moffarsi* GILLET (*Ann. Soc. Ent. Belgique*, LI, 1907, p. 177); dessus lisse à pilosité longue et couchée d'un brun rousseâtre, ainsi que les antennes et les organes de la bouche.

♂. — Tête semi-elliptique, entièrement rebordée, marquée d'une forte ponctuation rugueuse; clypeus incisé au bord antérieur, mais non denticulé; sutures génales prononcées; joues dilatées latéralement. La partie frontale est ornée d'une corne lisse, subconique, à section quadrangulaire, légèrement inclinée vers l'arrière, déprimée par devant et sans denticule à la face postérieure.

Prothorax un peu plus large que les élytres, finement rebordé à la base; côtés à bords relevés; angles antérieurs excavés, arrondis et proéminents au côté externe; angles postérieurs peu apparents. La surface est partagée en deux par une carène transverse contournée à chaque extrémité où elle se termine en tubercule épais, dentiforme, dirigé en dehors; cette carène est ornée de cinq dents séparées l'une de l'autre par des échancrures larges et peu profondes; la dent médiane et les dents extrêmes plus fortes que les deux autres. La partie anté-

rière est rétuse, concave et limitée latéralement par deux plis caréniformes qui font suite à la carène dentifère ; elle est entièrement lisse. La partie postérieure, fortement comprimée latéralement, présente sur le disque un sillon longitudinal large et peu profond ; elle est également lisse, sauf la région comprise entre les fovéoles latérales et les angles postérieurs, qui est finement ponctuée.

Elytres lisses, à bord antérieur retroussé ; stries peu profondes ; pygidium convexe, rebordé latéralement ; métasternum convexe, orné d'un fin sillon médian dilaté vers l'avant et séparé du mésosternum par une impression transverse assez profonde.

♀. — La corne céphalique est remplacée par un tubercule transverse à bord supérieur tronqué obliquement et denticulé aux deux bouts. La partie rétuse du prothorax est très courte, en forme de ruban et le pli transverse qui la surmonte présente un angle très obtus à sa partie médiane. La partie élevée est marquée d'une ponctuation rugueuse qui disparaît graduellement sur le disque et la partie basilaire.

Longueur : 25 à 30 mm.

Provenance : Afrique orientale anglaise : Monts Aberdare (ALLUAUD et JEANNEL, II, 1912).

Type : Museum de Paris.

Les petits ♂ de cette espèce rappellent énormément ceux de même dimension de *C. Mofartsi*, mais ceux-ci se distinguent par la tête lisse, le devant du prothorax ponctué, les angles antérieurs non excavés, etc.

Copris jucundus, n. sp.

Voisin de *C. Orion* KLUG ; brun-roux, antennes brunnâtres. Tête et prothorax entièrement et finement rebordés, les dents du clypeus peu proéminentes, la région basilaire du prothorax un peu anguleuse, la surface de la tête est presque lisse, celle du prothorax couverte d'une ponctuation fine et peu serrée.

Face antérieure du lobe médian du prothorax limitée latéralement par un renflement longitudinal qui n'atteint pas la base, et au bord supérieur par un pli transversal convexe, anguleux au milieu, à extrémités globuleuses ; la partie élevée marquée d'un sillon longitudinal mal défini et grossièrement ponctué ; les protubérances latérales, peu développées, sont séparées du lobe médian par un espace courbe très régulièrement concave.

Elytres à stries bien marquées, finement ponctuées ; les interstries convexes.

Longueur : 10 à 13 mm.

Provenance : Cameroun : Joko.

Type : ma collection.

Coptorrhina nitefacta, n. sp.

Noir, très brillant sur le thorax et les élytres ; organes de la bouche et cils des pattes d'un brun rougeâtre ; massue des antennes d'un gris cendré.

Tête moins brillante, sans carène frontale, couverte de fines aspérités contiguës sur le clypeus et les joues, pointillée sur le vertex. Clypeus fortement échancré en arc, prolongé en deux dents modérément longues, subcarénées et légèrement sinuées au côté externe ; sutures génales bien marquées, prolongées en arrière en deux impressions transverses, au bord intérieur des yeux ; vertex plan au milieu, impressionné de chaque côté en arrière.

Prothorax atteignant sa plus grande largeur après le milieu, à côtés arrondis, sinués dans leur moitié antérieure ; finement rebordé tout autour, le bord antérieur fortement dilaté en demi cercle de part et d'autre d'une échancrure large et à fond plat. Partie antérieure, rétuse, ornée de quatre renflements plus ou moins tuberculiformes : deux médians près du bord antérieur, les autres, latéraux, en ligne droite avec les premiers. Partie postérieure moins longue que la partie antérieure, limitée en avant par une carène interrompue dans sa partie médiane et largement festonnée de chaque côté ; cette carène présente deux troncatures droites denticulées à leur angle externe. La surface du prothorax est couverte d'une ponctuation très fine et serrée sur la partie rétuse, plus fine encore et peu apparente sur la partie élevée.

Elytres à stries superficielles fortement ponctuées ; interstries plans, lisses. Pygidium petit, rebordé, entièrement couvert d'une ponctuation assez fine, écartée.

Dessous du corps aussi brillant que le dessus ; côtés de la poitrine à ponctuation serrée, assez grosse mais peu profonde ; métasternum lisse, sans trace du sillon longitudinal médian. Fémurs lisses, carénés sur leurs tranches d'avant et d'arrière ; tibias antérieurs courts, à trois dents larges et aiguës précédées de quelques denticules, tronqué à l'apex, l'éperon terminal plié à angle droit vers l'intérieur et denté au pli en dehors.

Longueur : 11 à 13 mm.

Provenance : Afrique orientale anglaise (Wa Taïta) : Bura, 1050 m. (ALLUAUD et JEANNEL, mars 1912).

Type : Museum de Paris.

Onitis retrodentatus, n. sp.

Noir assez brillant ; dessous orné de longs poils d'un brun-rouge ; cils des pattes et de l'extrémité des élytres de la même couleur ; antennes grises.

Tête très rugueusement ponctuée ; clypeus à bord antérieur retroussé ; joues non proéminentes ; sutures génales légèrement caréniformes ; vertex limité en avant par une carène convexe surmontée d'une languette peu élevée ; bord postérieur finement rebordé, épaissi au milieu.

Prothorax peu convexe, marqué d'une ponctuation simple très écartée, rebordé en avant et sur les côtés ; bord postérieur arrondi, crénelé, la région basilaire fortement proéminente, couverte de petits points très fins et complètement dépourvue des fovéoles habituelles.

Elytres légèrement bisinués sur les côtés ; stries à très fine carène crénelée ; interstries convexes, régulièrement ponctués, le 8^e non crénelé. Mésternum et côtés de la poitrine à granulation râpeuse.

♂. — Tête semi-elliptique. Tibia antérieur mince, allongé, orné au côté externe de quatre dents nettement dirigées vers l'arrière ; fémurs intermédiaires un peu dilatés au bord inférieur externe.

♀. — Tête parabolique. Tibia antérieur large, orné de quatre dents fortes et normales ; fémurs intermédiaires crénelés au bord inférieur externe.

Longueur : 16 à 18 mm.

Provenance : N.-W. Rhodesia ; Congo belge, Haut-Luapula.

Type : ma collection.

Onitis coeruleatus, n. sp.

Allongé, peu convexe ; d'un vert clair au dessus ; dessous plus foncé, sauf les fémurs et les arceaux de l'abdomen ; partiellement bleuté ou cuivreux, surtout sur le prothorax et les élytres ; la pilosité du dessous et les diverses parties de la bouche d'un roux brunâtre ; massue des antennes rousse.

Tête parabolique, ni tronquée, ni échancrée au bord antérieur ; retroussée en avant et sur les côtés ; clypeus subtriangulaire, orné d'une carène centrale ; yeux grands ; joues arrondies ; sutures génales en relief, se continuant en une carène frontale, filiforme, peu en relief, portant en son milieu et un peu en arrière un petit tubercule arrondi. La surface entière est couverte de granules aplatis formant des rides sur le clypeus.

Prothorax rebordé sur les côtés, au bord antérieur et au milieu du bord postérieur ; largement sinué en avant, échancré sur les côtés près des angles postérieurs et dilaté en angle obtus à la partie basilaire ; une dépression longitudinale part du milieu du disque et va rejoindre en s'élargissant graduellement les deux fovéoles habituelles, larges, peu profondes et séparées par un simple pli caréniforme ; les angles antérieurs sont droits, à sommet arrondi, les postérieurs effacés. La surface est couverte d'une ponctuation assez forte, écartée, plus dense sur tout le pourtour, moins régulière et plus serrée à la dépression médiane.

Elytres à stries bicarinulées, régulièrement interrompues par de petites incisions transverses ; interstries couverts de points subsériés, le 2^e plus ou moins plissé transversalement ; suture et épaules plus brillantes que le reste de la surface. Pygidium rebordé, rugueusement ponctué, sub-caréné longitudinalement. Mésternum large, plus ou moins relevé et canaliculé dans toute sa longueur ; la ligne de séparation d'avec le mesosternum se compose de deux arcs qui se rejoignent suivant la carène médiane de celui-ci.

♂. — Fémurs antérieurs non dentés ; tibias minces, légèrement arqués, quadridentés ; les deux arêtes du bord interne très finement crénelées ; griffe terminale droite et aiguë, dans le prolongement du bord externe de la dernière dent. Fémurs intermédiaires crénelés au bord postérieur interne. Fémurs postérieurs dilatés vers l'extrémité du bord postérieur interne en une dent couchée dirigée vers l'extérieur, formant un anneau non fermé avec une petite aspérité dentiforme qui la précède.

♀. — Clypeus et pygidium plus allongés que chez le mâle ; tibias antérieurs plus épais et encore moins arqués ; fémurs intermédiaires crénelés.

Longueur : 14 à 20 mm.

Provenance : Congo Belge : Elisabethville (Mission agricole, 1911) ; N. W. Rhodesia : Chisanga (H. C. DOLLMAN, 1915).

Type : ma collection ; cotypes : British Museum.

La description du mâle ci-dessus a été faite d'après un exemplaire du Congo ; ceux de Rhodesie que j'ai examinés ont la dent du fémur postérieur tronquée et toute image d'anneau a disparu.

Onitis plecopygus, n. sp.

Allongé, peu convexe ; d'un rouge cuivreux brillant, rembruni sur la tête, l'avant du prothorax et le dessous du corps ; organes de la bouche, massue des antennes et pilosité du corps d'un brun roux.

Tête parabolique ; clypeus subtriangulaire, entier, à bord retroussé, muni en son centre d'une carène transverse, rectiligne, surélevée au milieu ; joues arrondies, proéminentes sur le côté ; sutures génales fort en relief ; yeux grands ; carène frontale subconvexe se prolongeant de manière à encadrer tout le vertex ; avec une élévation transverse au milieu du bord postérieur. Toute la surface est couverte d'une ponctuation assez dense, formant des rides sur le clypeus, un peu moins serrée sur les joues.

Prothorax peu convexe ; côtés, bord antérieur et milieu du bord postérieur rebordés ; celui-ci proéminent en arc convexe devant l'écusson ; partie postérieure du disque déprimée au milieu, cette dépression graduellement élargie du centre à la base ; les fovéoles habituelles superficielles, séparées par un pli caréniforme ; les fovéoles latérales larges et profondes. Toute la surface est couverte d'une ponctuation écartée assez forte, plus dense sur les côtés, à la marge antérieure, à la dépression médiane, et se raréfiant aux angles postérieurs ; ceux-ci sont complètement arrondis, tandis que les antérieurs sont droits et aigus.

Elytres à stries vertes entrecoupées de points transverses non contigus ; les interstries, peu convexes, marqués de petits points plus ou moins sériés ; épaules et suture plus brillantes que le reste de la surface. Pygidium rebordé, finement ponctué, partagé en deux par un pli peu convexe, la partie apicale moins développée que la base et recourbée vers le dessous. Metasternum plan, granulé, déprimé longitudinalement dans sa partie médiane ; la ligne de séparation d'avec le mesosternum en arc régulier.

♂. — Fémur antérieur sans dents ni tubercules ; tibia mince, légèrement arqué et crénelé sur la moitié inférieure du bord interne, armé en dessus de quatre dents bien apparentes, dont la dernière, moins développée que la précédente, se prolonge en une griffe, effilée et aiguë, dirigée vers le bas. Fémurs intermédiaire et postérieur très finement crénelés au bord postérieur interne.

♀. — Fémurs comme ceux du mâle ; tibias antérieurs moins arqués et plus épais, sans crénelures au bord interne ; pygidium semblable à celui du mâle, mais la partie recourbée est moins étendue.

Longueur : 22 à 25 mm.

Provenance : N. W. Rhodesia, Kashitu (DOLLMAN, 1915).

Type : British Museum.

Cette espèce est voisine de *O. podicinus* BOUCHÉ, qui s'en distingue notamment par le bord postérieur de la tête non épaissi, par le clypeus dépourvu de carène, ainsi que par la présence d'un tubercule à l'avant

du vertex et de deux élévations tuberculiformes subconiques au pygidium de la femelle.

Onitis nemoralis, n. sp.

Vert glauque, rembruni à l'avant du clypeus ; subopaque, peu convexe ; pilosité du dessous du corps, des pattes et des organes de la bouche d'un brun rougeâtre ; massue des antennes grise.

Tête arrondie, ni échancrée, ni tronquée ; clypeus et joues retroussés, celles-ci légèrement proéminentes ; carène clypeale petite, transverse, très éloignée du bord antérieur ; carène frontale largement interrompue, ses deux tronçons faisant suite aux sutures génales ; un tubercule peu élevé à l'avant du vertex ; bordure du vertex atténuée à l'arrière dans sa partie médiane.

Prothorax finement rebordé en avant et sur les côtés ; bord antérieur légèrement bisinué ; côtés anguleusement arrondis au milieu et à peine sinués vers la base ; angles antérieurs et postérieurs arrondis ; bord basilaire proéminent et arqué en son milieu.

Elytres allongées, à stries bien marquées plus fortes à la base qu'à l'apex ; ces stries sont ornées de points transverses assez écartés, la 5^e et la 6^e sont déprimées à l'avant ; interstries convexes, le 8^e enfoncé et à peine crénelé. Pygidium entièrement rebordé. Metasternum non canaliculé.

La ponctuation est granulée sur le clypeus, rugueuse sur le reste de la tête ; simple, peu profonde et écartée sur le prothorax, avec un espace longitudinal médian lisse ; plus serrée entre les fovéoles basilaires qui sont arrondies et creusées en longueur ; les élytres, le pygidium et le dessous du corps sont d'une rugosité excessivement fine.

♂. — Tête semi-elliptique. Tibias antérieurs minces, allongés, recourbés à l'extrémité, ornés de quatre dents extérieures dont les deux médianes plus développées ; bord interne avec cinq denticules aigus ; bord antérieur du fémur avec une dent submédiane tronquée au sommet et peu élevée. Tibias intermédiaires crénelés au bord interne, fémur dilaté au bord postérieur interne. Tibias postérieurs courts et très larges à l'extrémité, fémur dilaté à la partie médiane du bord postérieur en forme de lame de rasoir terminée latéralement par une épine effilée et aiguë.

♀. — Tête parabolique ; carène frontale un peu plus forte que chez le mâle. Tibias antérieurs plus robustes et plus courts, fémurs parfois ornés au bord inférieur d'une crénelation excessivement fine.

Longueur : 17 à 21 mm.

Provenance : Congo belge oriental, forêts de Beni et de Moera
(GRAUER, octobre 1910).

Type : ma collection.

XII

Assemblée mensuelle du 3 décembre 1932.

Présidence de M. A. D'ORCHYMONT, Président.

La séance est ouverte à 17 heures.

Les comptes rendus des assemblées de septembre et octobre 1932 sont approuvés.

M. le Président annonce que le Conseil présente aux suffrages des membres assistant à l'assemblée générale du 8 janvier 1933, à titre de candidat à la présidence, M. L. GILTAY, et comme membres du Conseil, MM. BURGEON, LAMEERE, LEMAIRE et GHESQUIÈRE, les trois premiers sortants et rééligibles. En remplacement de deux de nos membres honoraires décédés, le Conseil présente la candidature de MM. SJÖSTEDT, A. C. OUDEMANS et VON SCHULTHESS ; GRANDI, SILVESTRI et F. W. EDWARDS.

Correspondance. — M. CLERMONT nous communique sa nouvelle adresse : 40, avenue d'Orléans, Paris (XIV^e).

Bibliothèque. — MM. DE PEYERIMHOFF (5), G. GRANDI (7), R. P. NAVAS (1), TOWNSEND (1), PORTER (4) ont envoyé des tirés à part de leurs travaux. (*Remerciements.*)

Communications. — M. D'ORCHYMONT signale un intéressant travail de M. UITENBOGAERDE sur une nouvelle espèce d'*Oliorhynchus* qui serait à rechercher en Belgique.

— M. FRENNET signale la capture d'*Orchestes erythropus* GERM., Brasschaet, 2-XI-1932.

— M. GHESQUIÈRE montre une série de Curculionides nouveaux du Congo belge.

La séance est levée à 18 heures.