

Les Phorides de Belgique

PAR

M. GOETGHEBUER (Gand) ET P. MARÉCHAL (Liège)

L'étude des Phorides belges est loin d'être complète ; cette liste est dressée à la suite des recherches faites par nous dans différentes localités en Belgique. Nous avons estimé qu'il était intéressant de la publier parce qu'elle servira de base pour les observations futures. A l'exemple du R. P. SCHMITZ (1), nous suivrons l'ordre alphabétique dans l'énumération des genres et des espèces sans chercher à établir les affinités de ceux-ci. Les abréviations indiquent, d'après le *Manuel de la Faune de Belgique* de LAMEERE, les diverses zones admises par cet auteur (2).

Nous adressons nos plus vifs remerciements au R. P. SCHMITZ, le spécialiste bien connu des Phorides, pour l'amabilité avec laquelle il a bien voulu déterminer les exemplaires de nos collections.

G. *Aneurina* LIOY.

thoracica MG. — Gand (Fl.) ; Hockai (Salp.).

urbana MG. — Gand, Destelbergen (Fl.) ; Lixhe (Calc.).

G. *Borophaga* ENDERL.

S.-g. *Borophaga* s. st.

femorata MG. — La Panne (Litt.) ; Destelbergen, Melle (Fl.) ; Nukerke (Brux.).

S.-g. *Peromitra* ENDERL.

incrassata MG. — Vinderhaute (Fl.) ; Virton (Jur.).

G. *Chaetopleurophora* SCHMITZ.

eurythronota STOBL. — La Panne (Litt.).

(1) SCHMITZ : Die geographische Verbreitung der europaischen Phoridenarten. *Natuur-histor. Maandblad*, 1926, n° 1, pp. 139-147.

(2) Litt. = zone littorale ; Fl. = z. des Flandres ; Camp. = z. campinienne ; Brux. = z. de Bruxelles ; Calc. = z. calcaireuse ; Ard. = z. ardennaise ; Salp. = z. subalpine ; Jur. = z. jurassique.

G. *Citrango* SCHMITZ.

citreiformis BECK. — Virton (Jur.).

G. *Conicera* MEIG.

atra MG. — La Panne (Litt.) ; Heusden, Destelbergen, Laethem-St.-M., Vinderhoute (Fl.) ; Rouge-Cloître (Brux.) ; Thuin (Calc.) ; St-Hubert (Ard.) ; Virton (Jur.).

pauillia SCHMITZ. — Heusden (Fl.).

similis HAL. — Bellem (Fl.).

G. *Diploneura* LIOY.

abdominalis FALL. — Thuin (Calc.).

florea FAB. — Gand (Fl.).

funebria MG. — var. *rostralis* SCHMITZ. — Heusden (Fl.) ; Gastuche (Calc.).

nitidula MG. — Meirelbeke, Destelbergen (Fl.) ; Nukerke (Brux.) ; Houyet (Calc.).

G. *Gymnophora* MACQU.

quartomollis SCHMITZ. — Falaën (Calc.).

G. *Gymnoptera* LIOY.

vitripennis MG. — Tohogne (Calc.).

G. *Megaselia* RONDANI.

S.-g. *Aphiochaeta* BRUES.

aequalis WOOD. — Boitsfort (Brux.) ; Liège (Calc.).

alticolella WOOD. — Postel (Camp.) (SÉVERIN).

basispinata LUNDB. — Postel (Camp.) (SÉVERIN).

campestris WOOD. — Munte (Fl.).

ciliata ZETT. — La Panne (Litt.) ; Overmeire, Heusden (Fl.) ; Rouge-Cloître (Brux.) ; Chaudfontaine (Calc.) ; St Hubert (Ard.) ; Hockai (Salp.).

coaequalis SCHMITZ. — Virton (Jur.).

dahli BECK. — Heusden (Fl.).

diversa WOOD. — Munte (Fl.).

flavicoxa ZETT. — Virton (Jur.).

hirticrus SCHMITZ. — Melle (Fl.) ; Houyet (Calc.).

involuta WOOD. — Heusden (Fl.).

lucifrons SCHMITZ. — Hockai (Salp.).

major WOOD. — La Panne (Litt.).

manicata WOOD. — Chaudfontaine (Calc.).

- meconicera* SPEIS. — La Panne (Litt.) ; Boitsfort (Brux.).
paludosa WOOD. — Anderlues (Calc.).
pectoralis WOOD. — Modave (Calc.) ; La Panne (Litt.).
pleuralis WOOD. — La Panne (Litt.) ; Melle, Destelbergen, Munte (Fl.) ; Boitsfort, Nukerke (Brux.) ; Modave, Houyet (Calc.) ; Hockai (Salp.).
projecta BECK. — Hockai (Salp.) (SEVERIN) ; Modave (Calc.).
pumila MG. — La Panne (Litt.) ; Waerschoot, Melle, Munte, Laethem-St-M., Heusden (Fl.) ; Chaudfontaine (Calc.) St Hubert (Ard.).
pusilla MG. — La Panne (Litt.) ; Gand, Heusden, Tronchiennes (Fl.) ; Rouge-Cloître (Brux.) ; Anderlues (Calc.).
setulipalpis SCHMITZ. — La Panne (Litt.).
simplex WOOD. — Virton (Jur.).
unicolor SCHMITZ. — Postel (Camp.) (SEVERIN).
variana SCHMITZ. — Destelbergen, Melle (Fl.) ; Sclayn-s/M ; Anderlues (Calc.) ; Hockai (Salp.).
Woodi LUNDB. — Postel (Camp.) (SEVERIN).
xanthozona STROBL. — La Panne (Litt.).

S.-g. *Megaselia* s. st.

- albicans* WOOD. — Virton (Jur.).
angusta WOOD. — Laethem-St-M. (Fl.) ; Rouge-Cloître (Brux.) ; Corbion (Ard.) ; Hockai (Salp.) ; La Panne (Litt.).
angustifrons WOOD. — St-Hubert (Ard.).
brevicostalis WOOD. — La Panne (Litt.) ; Destelbergen (Fl.) ; Thuin, Modave, Anderlues (Calc.).
brunneipennis COSTA. — Sclayn s/M. (Calc.).
coetanea SCHMITZ. — Linkebeek (Brux.).
costalis v. ROSS. — Houyet, Modave, Anderlues (Calc.).
flava FALL. — Boitsfort (Brux.) ; Hockai (Salp.).
fusca WOOD. — Virton (Jur.).
fuscinervis WOOD. — Houyet (Calc.).
humeralis ZETT. — Hockai (Salp.).
lata WOOD. — St-Hubert (Ard.).
longicostalis WOOD. — La Panne (Litt.) ; Laethem St M. (Fl.).
longiseta WOOD. — La Panne (Litt.).
mixta SCHMITZ. — Modave (Calc.).
nudiventris WOOD. — Melle (Fl.).
parva WOOD. — La Panne (Litt.).
picta LEHM. — Destelbergen (Fl.).

- plurispinosa* LUNDB. — Liège (Calc.).
plurispinulosa ZETT. (Giraudii EGG.). — La Panne (Litt.) ; Munte (Fl.) ; Modave (Calc.).
propinqua WOOD. — Meirelbeke (Fl.).
pulicaria FALL. — La Panne, Knocke (Litt.) ; Melle, Gand, Vinderhoute (Fl.) ; Rouge-Cloître (Brux.) ; Virton (Jur.).
pygmaea ZETT. — Melle, Vinderhoute (Fl.) ; Rouge-Cloître (Brux.) ; Virton (Jur.).
rata WOOD. — Gand, Heusden (Fl.) ; Anderlues, Chaudfontaine (Calc.) ; La Panne (Litt.).
ruficornis MG. — Hockai (Salp.).
rufipes MG. — Gand, Destelbergen (Fl.) ; Nukerke (Brux.) ; Thuin, Anderlues, Liège (Calc.) ; Virton (Jur.) ; Hockai (Salp.).
scutellariformis SCHMITZ. — La Panne (Litt.).
scutellaris WOOD. — Postel (Camp.) (SEVERIN) ; Houyet (Calc.).
subnudipennis SCHMITZ. — La Panne (Litt.).
sulphuripes MG. (*lutea* MG.). — Rouge-Cloître (Brux.) ; Falaën, Houyet (Calc.) ; Hockai (Salp.).
tarsalis WOOD. — Laethem St M. (Fl.) ; Anderlues (Calc.).
tumida WOOD. — La Panne (Litt.).
vernalis WOOD. — Modave, grotte de Ramioul, Ivoz-Rametz (Calc.) (LERUTH).

G. *Metopina* MACQU.

- galeata* PAL. — Bellem (Fl.).

G. *Paraspinophora* MALLOCH.

- bergenstammi* MIK. — Rouge-Cloître (Brux.) ; Loën, Lixhe (Calc.).
helicivora DUF. — Comblain-au-Pont (Calc.).

G. *Phalacrotophora* ENDERL.

- fasciata* FALL. — Virton (Jur.).

G. *Phora* LATREILLE.

- atterima* FAB. — Gand (Fl.) ; Houyet, Anderlues (Calc.). La Panne (Litt.).
edentata SCHMITZ. — La Panne (Litt.).
holocericea SCHMITZ. — La Panne (Litt.).
obscura ZETT. (*heterocera* SCHMITZ.). — Modave (Calc.).
schineri BECK. — St-Hubert (Ard.).
tinctoria SCHMITZ. — St-Hubert (Ard.) ; La Panne (Litt.).

G. Pseudacteon COQUILL.*formicarum* VERR. — Houyet (Calc.).**G. Triphleba** RONDANI.S.-g. *Triphleba* s. st.*hyalinata* MG. — Grottes de Ramioul (Calc.) (LERUTH).*lugubris* MG. — Postel (Camp.) (SÉVERIN).*nudipalpis* SCHMITZ. — Anderlues (Calc.).*trinervis* BECK. — Hockai (Salp.).S.-g. *Pseudostenophora* MALL.*atricola* SCHMITZ. — Grotte de Ramioul (Calc.) (LERUTH).*unicarata* BECK. — Anderlues (Calc.).**Ceratopogonidae et Chironomidae nouveaux**

OU PEU CONNUS D'EUROPE

DEUXIÈME NOTE (1)

PAR

M. GOETGHEBUER

CERATOPOGONIDAE**Probezzia rufithorax** nov. sp.

♂. — L. 3 mm. Tête et mésonotum d'un brun mat, ce dernier avec des traces de bandes foncées; scutellum jaune fauve avec quatre courtes soies; abdomen brun noir; balanciers bruns avec l'extrémité blanche; hanches brun mat; pattes jaunes, les fémurs postérieurs sombres de même qu'un anneau au milieu des tibias antérieurs; genoux, extrémité distale des tibias et des articles des tarsi noirs. Antennes courtes, à panache peu fourni; articles basaux du flagellum pas plus longs que larges; l'ensemble des 2-10 un peu plus court que les 11-14 réunis. Tous les fémurs inermes; ongles des tarsi égaux et simples. Ailes à r-m située avant le milieu; R_{4+5} aboutissant à l'extrémité du troisième quart de l'aile, plus du double de R_1 , située vis à vis de l'extrémité de la Cu_1 ; M sessile.

♀. — L. 3 mm. Coloration semblable à celle du ♂, mais plus claire et à bandes du mésonotum mieux marquées. Ongles égaux et dentés du côté interne. Antennes courtes, à articles 3-9 pas plus longs que larges, l'ensemble des 2-9 plus long que les 10-14 réunis. Ailes comme chez le ♂ mais R_{4+5} plus allongée et Cu_1 située en deça de l'extrémité de R_{4+5} .

Cette espèce diffère de *P. rubiginosa* WIN. par les caractères suivants:

1. Antennes courtes; articles 3-9 suborbiculaires; balanciers blancs à l'extrémité *rufithorax*

(1) Voir: *Bull. et Ann. Soc. ent. de Belg.*, t. LXXII, 1932, p. 125-130.