

C. glauca BRITTEN. **Fn. nov. sp.** Genval, V-1911, Lamorteau VI-1920, Uccle V-1930 (coll. FRENNET); Tervueren VI-1900, Verviers VI-1913, Boerseem VII-1918, Forest V-1929 (coll. GUILLEAUME).

C. Fagniezi JEANN., **Fn. nov. sp.** Uccle VIII-1917, Auderghem V-1913 (coll. FRENNET); Yvoir VI-1910, Forest V-1904, La Panne IV-1929, Nieuport IV-1910, La Cambre, VI-1906 (coll. GUILLEAUME).

C. Jeanneli BRITTEN, **Fn. nov. sp.** Relst V-1903 (coll. FRENNET); Westende V-1906 (coll. GUILLEAUME).

— M. GHESQUIÈRE entretient l'assemblée : 1) d'un nouveau parasite du Bananier *Bathycoelia thalassina* SCHOUT., déjà signalé par MAYNÉ au Mayumbe, sur le Cacaoyer. Très commun dans tout l'Equateur. Par ses piqûres, ce Pentatomide provoque des chancres noirs sur les bananes encore vertes ; 2) d'une cécidie non encore connue des Légumineuses du Congo belge et attribuée à *Alcides leucogrammus* ER. ; la larve de cette espèce provoque des déformations chancreuses sur les tiges des haricots cultivés, des *Mucuna* et d'une Légumineuse indigène du genre *Psophocarpus*. Des échantillons des dégâts commis par ces deux insectes sont montrés aux membres présents.

— M. THOMAS a capturé à Woluwe-St-Lambert une *Lycosa fabrilis*. Cet Arachnide n'avait jusqu'ici été signalé qu'une seule fois de Belgique, à Boitsfort. Le même membre fait circuler également une grande Araignée exotique trouvée place Dailly, et vraisemblablement importée en même temps que des fruits étrangers.

— M. GOETGHEBUER signale la capture à Gand, le 2-V-25 de *Scatophila unicornis* GZERNY (Dipt. Ephydriidae), **Fn. nov. sp.** Se trouvait dans un lot d'insectes déterminés par M. VILLENEUVE.

— La séance est levée à 17 h. 45 m.

Ceratopogonidae et Chironomidae nouveaux

OU PEU CONNUS D'EUROPE

PAR

M. GOETGHEBUER

CÉRATOPOGONIDES

Dasyhelea modesta WINN.

On ne connaissait que la ♀ de cette espèce ; les caractères du ♂ sont les suivants :


Longueur 1,5 mm. D'un noir mat ; mésonotum noir mat à reflets grisâtres, avec une double bande médiane et deux latérales, raccourcies en avant, garni de soies pâles ; scutellum jaune avec 6 longues soies noires, blanchâtres à l'extrémité ; abdomen noir mat avec des soies pâles ; pattes brun-noir ; tarses blanc-grisâtre ; balanciers à extrémité blanchâtre. Antennes à articles 2-8 plus larges que longs, les 9-10 globuleux, le onzième plus long que les articles suivants, sphérique à la base ; le douzième un peu plus long que les treizième et quatorzième qui sont subégaux. Les articles 2-11 sont striés longitudinalement à la base, la moitié distale et les douzième et treizième à stries espacées ; les 11 à 13 binoduleux ; le quatorzième terminé par un stylet court et large. Métatarse postérieur double du deuxième article des tarses. Ailes couvertes de macrotriches couchées, blanchâtres ; première cellule radiale oblitérée, la deuxième allongée, deux fois aussi longue que haute et aussi longue que la partie fusionnée de R_1 et R_{4+5} ; celle-ci atteignant environ le milieu de l'aile ; fCu située sous l'extrémité de R_{4+5} ; fourche de la M placée sous l'insertion antérieure de la r-m, qui est oblique ; alula nue.

Allemagne (K. MAYER).

Stilobezzia fusca nov. sp.

♀. — Longueur 1,5 mm. Brun mat, pattes brun jaunâtre ; balanciers blanchâtres. Antennes à articles 2-9 plus longs que larges, ovoïdaux

l'ensemble des articles 2-9 subégal aux articles 10-14 réunis. Yeux nus. Tibia postérieur et fémur un peu grossis; ongles des tarsi inégaux et simples (fig. 1), l'ongle externe atteint au moins les 2/3 du cinquième article des tarsi, l'ongle interne mesure un tiers de l'externe; métatarse postérieur double du deuxième article et égalant le tiers du tibia; il est garni de quelques épines en-dessous; quatrième article bilobé; le troisième est court; tous les fémurs sont inermes. Fossettes humérales du mésonotum présentes; soies acrosticales et dorsocentrales unisériées; scutellum avec 6-8 longues soies. Ailes (fig. 2) ponctuées, offrant des



macrotriches allongées, la deuxième atteignant moins du double de la première; pétiole de la M plus long que la r-m; (Cu un peu distale de cette dernière, située sous la bifurcation de la M; alula frangée de soies.

Par ses tibias et ses fémurs postérieurs grossis, cette espèce est voisine du genre *Monohalea*, mais le quatrième article des tarsi est, non cylindrique, mais bilobé.

Houyet (Belgique), le 6-7 1928.

***Bezzia rufifascies* sp. nov.**

♀. — Longueur 3 mm. Face rousse; scape et antennes noirs; thorax d'un noir brillant de même que le scutellum; abdomen brun noir, plus clair à la base; hanche antérieure jaune; patte antérieure jaune avec les genoux et l'extrémité du tibia noirs, les trois derniers articles du tarse noirs; patte intermédiaire: hanche brun noir, fémur jaune avec le tiers distal noir, premier et deuxième articles du tarse jaune avec l'extrémité distale de chacun d'eux noire; patte postérieure: hanche brun noir, fémur jaune avec le quart distal noir, tibia noir, premier et deuxième articles du tarse brunâtres; balanciers noirs à l'extrémité.

Dernier article des palpes claviforme, non particulièrement allongé.

Antennes à articles 2-9 doubles de leur épaisseur, leur ensemble un

peu plus court que les 10-14 réunis. Mésonotum à soies acrosticales et dorsocentrales indistinctes; scutellum à pubescence dense et courte, sans longues soies. Ongles des tarsi simples et égaux; quatrième article des tarsi cordiforme, pas plus court que le troisième; fémurs antérieurs armés de 6 épines, non grossis; 4 fémurs postérieurs inermes. Ailes à r-m aussi longue que la partie basale de R_{4+5} ; fCu sous la r-m; R_{4+5} un peu plus longue que le double de R_1 depuis la r-m; celle-ci située avant le milieu de l'aile; nervures brunâtres, surtout les antérieures; bord antérieur de l'aile légèrement enfumé; lobe anal effacé; alula non frangée de soies.

Diffère de *B. flavipalpis* WIN. par l'absence de soies scutellaires, par la coloration uniforme des antennes et par la coloration des pattes.

Allemagne (localité signalée sur l'étiquette illisible) 10-7-1927. Collection OLDENBERG (*Deutsches Entomologisches Institut*, Berlin).

***Bezzia (Probezzia) xanthogaster* KIEFF.**

Ann. Mus. nat. Hung., 1919, XVII, p. 130

Le ♂ était encore inconnu; il se caractérise comme suit:

Longueur 2,5 mm. Tête et thorax brun noir; mésonotum mat, brun avec des traces de bandes brun noir; abdomen brun noir, un peu luisant; pattes jaune pâle avec les genoux et l'extrémité des tibias et des tarsi noirs; tibias antérieurs et intermédiaires avec des traces d'anneau brun noir, au milieu; scutellum jaune clair; balanciers blanchâtres. Antennes courtes, n'atteignant pas le milieu du mésonotum; panache peu fourni, les trois derniers articles un peu plus allongés que les 2-9 réunis. Tous les fémurs inermes; ongles égaux et simples. Yeux largement distants, en haut. Ailes courtes à peine un peu plus longues que l'abdomen, conformées comme chez la ♀; alula et squames nues.

Plusieurs ♂♂ et ♀♀ provenant de Saratow (Russie).

***Palpomyia Oldenbergi* n. sp.**

♀. — Longueur 3 mm. Tête, thorax et scutellum gris noir, couverts d'une courte pubescence; mésonotum (fig. 3) avec des traces de bandes noires; pleures grises avec une tache noire, mate et arrondie sur la mésopleure; également une tache noire au niveau du callus huméral; abdomen d'un noir un peu luisant avec une pilosité plus longue et moins dense que sur le thorax; fémur antérieur jaune, plus sombre à l'extrémité distale; tibia antérieur brunâtre; les deux premiers articles des tarsi jaunâtres et les trois derniers assombris; balanciers brun noir. Palpes à quatrième article court, subclaviforme. Antennes à

articles 3-9 ovoïdes, les 5 articles terminaux cylindrique allongé. Ailes hyalines; deuxième cellule radiale très allongée (chez l'un des exemplaires, la nervure séparant les deux cellules n'existe pas); portion de la R_{4+5} située entre l'extrémité de la R_1 et son extrémité, aussi longue




que la R_1 depuis la r-m. Fémur antérieur un peu grossi armé de 3-4 épines; les autres fémurs inermes; ongles des tarsi simples, sans dent interne; dernier article des tarsi dépourvu de spinules en bâtonnet. M_2 naissant un peu avant la r-m; fCu distale de la r-m; nervures antérieures brunes, les autres incolores.

Allemagne: Berlin VI, 1898 (Collection OLDENBERG), 2 ♂♂.

CHIRONOMIDES

Orthocladius lactescens n. sp.

♂. — Longueur 3 mm. Noir y compris les balanciers, mésonotum à peine pruiné de gris; pattes brunâtres. Antennes à quatorzième article



de 3/5 plus long que les 2-13 réunis. Ailes d'un blanc laiteux, non ponctuées; lobe anal proéminent du côté interne et arrondi; R_{2+3} aboutissant à distance presque égale de R_1 et de R_{4+5} ; An dépassant

beaucoup fCu, qui est un peu distale de r-m; R_{4+5} un peu dépassée par la costale et située au-delà de l'extrémité de Cu; squame frangée de nombreuses soies. Pattes postérieures à longs poils; métatarse antérieur d'un quart plus court que le tibia; tarse antérieur assez brièvement mais densément barbu; quatrième article des tarsi plus long que le cinquième; empodium court. Hypopyge (fig. 4) à pointe de la lamelle dorsale épaissie et pourvue de grosses soies sur les côtés; lobe interne de l'article basal anguleux et finement pubescent; article terminal long, pourvu d'une petite crête.

Courlande: Libau (Dr C. SIEBERT).

Smittia trilobata EDW.

Trans. entom. Soc. of London, 1929, p. 364


J'ai trouvé cette espèce à Overmeire (Belgique), le 24 septembre 1931. Elle n'était signalée que d'Angleterre.

Fleuria lacustris KIEFF.

Ann. Soc. scient. de Bruxelles, XLII, p. 391 (1923)

A la description de KIEFFER, il faut ajouter les détails suivants:

♂. — Ailes (fig. 5) blanchâtres, à bord rectiligne sous la pointe; bord postérieur droit; R_{2+3} voisine de R_1 , aboutissant à l'extrémité du




premier cinquième de l'espace entre R_1 et R_{4+5} ; fCu distale de r-m; An aboutissant un peu au-delà de fCu; squame densément frangée. Hypopyge fig. 6. Antennes fig. 7.

Harnischia (? *Microchironomus*) *overmeirensis* n. sp.

♂. — Longueur 4 mm. D'un vert clair, scape, mésonotum noirs; bandes du mésonotum d'un noir profond, à peine luisantes; abdomen vert; hypopyge vert clair; pattes vertes. Antennes à douzième article 2 ff/2 fois aussi long que les 2-11 réunis. Tarse antérieur non barbu;

T. R. = 1,7; cinquième article des tarses antérieurs d'un tiers plus court que le cinquième; pattes postérieures à poils assez longs. Balanciers vert pâle. Aile à r-m pâle; squame frangée. Hypopyge (fig. 8)



dépourvu d'appendices; article terminal un peu coudé au bord interne, terminé en pointe assez aigüe; article basal muni de trois soies du côté médial; pointe de la lamelle dépassant l'article basal, garnie de longues soies à la base.

Un ♂ pris près de l'étang d'Overmeire (Belgique), le 24-9-1931. Cette espèce est voisine de *H. viridescens* EDW., non (MEIG.) GOETGH.; elle en diffère par la coloration noire des bandes du mésonotum.

Remarque. — *Ch. viridescens* EDW. n'est pas synonyme de *viridescens* (MEIG.) GOETGH.; la conformation de l'hypopyge est différente chez les deux espèces. Chez cette dernière forme l'article terminal présente un étranglement bien marqué à la base et le bord interne est nettement coudé, comme je l'indique sur la fig. 63, p. 49, dans la Faune de France.

Endochironomus Oldenbergi n. sp.

♂♀. — Longueur 7,5 mm. En entier d'un noir mat, légèrement pruiné de gris sur le mésonotum, sur l'espace préscutellaire et entre les bandes qui sont d'un noir un peu luisant; balanciers pâles; pattes jaunâtres. Antennes de quatorze articles (♂), le dernier article atteignant au moins trois fois la longueur de 2-13 réunis; antennes ♀ de 7 articles, les 3-6 allongés en col distalement, le septième aussi long que les articles cinquième et sixième réunis. Ailes blanchâtres, à nervures incolores, sauf les antérieures qui sont brunes; r-m non assombri; Cu un peu distale de r-m; $R_2 + 3$ parallèle à R_1 , mais éloignée de celle-ci à son extrémité du quart de la distance entre R_1 et $R_4 + 5$. Tibia antérieur *subégale* au métatarse; tarse antérieur longuement et densément barbu; pattes postérieures à longs poils. Hypopyge (fig. 9) ressemblant à celui de *E. dispar* MEIG.; pointe de la lamelle dorsale longue; app. sup. subuliformes, arqués; app. inf. dépassant l'article basal, avec une longue soie terminale.

♂♂ et ♀♀ dans la collection OLDENBERG (Berlin).



New species of *Staphylinidae*

FROM THE BELGIAN CONGO

BY

MALCOLM CAMERON, M. B., R. N., F. E. S.

Oxytelus (Tanyraerus) kawaensis sp. n.

Shining, black, the elytra brownish-black lighter on the disc.

Antennae black, the first four joints yellow. Legs yellow. Length: 2,5-3,25 mm.

Near *schoutedeni* similarly coloured, but narrower, the base of the antennae yellow, the eyes a little longer than the post-ocular region (♂ and ♀) the head more finely and more sparingly punctured and with a scattered yet finer interstitial puncturation which is not present in *schoutedeni*; thorax with the posterior angles obliquely rounded, not prominent, without trace of sulci or impressions, more finely and more uniformly punctured; elytra much more finely punctured, scarcely striate. In other respects similar.

♂: head larger. 7th ventral segment triangularly produced in the middle into a plate with rounded apex.

Forêt de Kawa (Lac Albert), 23-IV-29 (A. COLLART):

Stilicis blukwaiensis sp. n.

Black, scarcely shining, the elytra light brown with metallic reflex, shining. Antennae reddish, the intermediate joints blackish. Legs yellow. Length 4 mm.

Size and build of *orbiculatus* PAYK., but with the eyes much smaller, the antennae similarly constructed, the sculpture of the head much finer and without shining plaque on the vertex, sculpture of the thorax much finer, the smooth median line much narrower, finely sulcate, the elytra and abdomen much more finely punctured: Blukwa (Nizi), 19-XII-28 (A. COLLART).