

Description d'un Phanaeide inédit (COLÉOPTÈRE COPRIDE)

PAR

ANDRÉ JANSSENS

Gen. : *Homalotarsus* nov. gen.

Caractères généraux des Phanaeides :

Antennes de neuf articles, massue à premier article cupuliforme emboîtant les deuxième et troisième articles.

Ecusson absent.

Tarses antérieurs absents.

Dernier article des tarses dépourvu de griffes.

D'un ovale arrondi ; très convexe, les élytres d'un vert métallique brillant, légèrement bleuâtre, ainsi que le pygidium, les fémurs et le




Fig. 1. — Tarses postérieurs du *Boucomontius convexus* OLSUF.

métasternum ; le pronotum et la tête d'un vert métallique. Rebord antérieur du clypeus noir ; dessous du corps d'un brun de poix à longue pubescence rousse.

Clypeus semi-circulaire, ayant en son milieu une incision formant deux angles dirigés en avant.

Tête ridée transversalement; front offrant une forte carène transverse, légèrement arquée, à arête noire.

Pronotum entièrement rebordé et irrégulièrement ponctué à l'arrière, cette ponctuation devenant écailleuse à l'avant et sur les côtés, côtés du pronotum offrant une forte impression située à peu de distance de chaque bord latéral.

Devant du pronotum offrant une courte carène transverse, suivie d'une petite fossette triangulaire, qui se prolonge en un léger sillon médian, jusqu'au bord postérieur du pronotum.

Elytres à sept stries (non compris le rebord externe) bien marquées, les interstries nettement ponctués, un peu moins vers le milieu. Angles




Fig. 2. — Tarses postérieurs de l'*Homalotarsus impressus* nov. gen., nov. sp.

internes de la base des élytres, offrant une forte impression commune. (Sur la figure 4, cette impression donne l'illusion d'un écusson).

Le cinquième interstrie offre près de la base des élytres une forte impression transversale reliant la quatrième et la cinquième strie.

Pygidium entièrement rebordé, semé et frangé de longues soies brunes.

Tibias antérieurs quadridentés.

Tibias intermédiaires avec deux éperons le plus long atteignant l'extrémité du premier article des tarses.

Tarses intermédiaires de cinq articles, d'une conformation analogue aux tarses postérieurs, mais plus grêles; frangés de longues soies brunes; la longueur totale des tarses est des quatre cinquième de la longueur des tibias.

Tibias postérieurs légèrement arqués, couverts de tubercules sétigères à leur surface supérieure.

Tarses postérieurs de cinq articles, frangés de longues soies brunes.

Les trois premiers articles sont cordiformes, plats, très élargis; à partir du premier article jusqu'au quatrième les bords postérieurs vont en s'incurvant progressivement, les extrémités du troisième article atteignant presque le niveau des extrémités du quatrième, celui-ci très court en forme de croissant, ayant à chacune de ses pointes deux ou trois longues soies, le cinquième article cylindrique très petit et pourvu de 3 ou 4 longues soies à son extrémité.

Long. : 12 mm.

Ce genre doit être placé entre le genre *Boucomontius* OLSUF. et le genre *Megatharsis* WATERH.

Il diffère du premier par le nombre d'article des tarses (cinq au lieu de quatre) et du second par la conformation de ceux-ci et l'absence




Fig. 3. — Tarses postérieurs du *Megatharsis Buckleyi* WATERH.

des quatre tubercules aigus des côtés de l'abdomen qui existent chez le *Megatharsis* et font saillie au-dessus du bord des élytres.

Je ne connais qu'une seule espèce appartenant à ce genre, je l'ai nommée *Hom. impressus* nov. sp. en raison de l'impression du cinquième interstrie des élytres.

La présente description est faite d'après un exemplaire unique qui appartient au Musée Royal d'Histoire Naturelle de Bruxelles et qui provient de la collection du Dr CANDEZE. Il porte comme indica-

tion de provenance le renseignement très vague de "Amérique méridionale".

Il figurait dans la collection du Dr CANDÈZE sous le simple nom de



Fig. 4. — *Homalotarsus impressus* nov. gen., nov. sp.

collection " *Trichochirus Paris* " mais n'avait jamais été décrit. Je n'ai pas conservé cette appellation car elle se trouve en quasi homonymie dans la liste des noms zoologiques.

V

Assemblée mensuelle du 7 mai 1932.

Présidence de M. A. D'ORCHYMONT, Président.

La séance est ouverte à 17 heures.

Excusés. — MM. GILTAY et LAMEERE.

Décision du Conseil. — Le Conseil a admis en qualité de membre associé Miss Norma LE VEQUE, actuellement au Musée du Congo, présentée par MM. SCHOUTEDEN et BURGEON et

M. J. VAN SCHEPDAEL, 13. Grand'Place, Hal, présenté par MM. CRÈVECEUR et MARÉCHAL (Hyménoptères, Lépidoptères).

Correspondance. — Notre collègue, M. F. DERENNE, directeur de la revue *Lambillionea*, nous fait part du décès de M. le Chanoine Charles CABEAU, président de l'*Union des Entomologistes belges*. M. le Dr Mathieu MAILOT a été appelé comme président de l'*Union*.

Adresse nouvelle. — M. SAINTE-CLAIRE-DEVILLE rappelle que sa résidence est actuellement à Sarrebrück (territoire de la Sarre), Virchowstrasse, 12.

Dons pour la Bibliothèque. — M. le Dr M. GOETGHEBUER fait don à la Société d'un exemplaire de son important travail intitulé " *Diptères Chironomidae IV* " qui vient de paraître dans la *Faune de France* (vol. 23). Des tirés à part ont également été reçus de M. H. E. ANDREWES (6 brochures), et de M. M. THOMAS (5 brochures).

De vifs remerciements sont adressés aux donateurs.

Travaux pour les Annales et le Bulletin. — L'Assemblée décide l'impression des travaux ci-après de MM. Malcolm CAMERON, Dr M. GOETGHEBUER et P. ROELOFS.

Communications. — M. FRENNET donnera sous peu le résultat de la revision de ses *Choleva* par M. P. VAN DER WIEL d'Amsterdam. Il signale dès à présent :