

Description de nouveaux Eurybrachides

DU CONGO BELGE

PAR

V. LALLEMAND

Aspidonitys nigromaculata n. sp.

♀. — Tête noire, montrant des taches gris-jaunâtre clair, 4 sur le front, 5 sur chacun des côtés et une sur le clypeus : la première tache frontale est triangulaire, partant du bord antérieur du vertex, la deuxième plus petite se trouve à la partie inférieure, les deux autres très petites occupent les angles latéraux au-dessus du clypeus ; les taches occupant les côtés de la tête sont disposées ainsi : deux au-dessus des yeux, une tout en arrière et l'autre en avant au niveau du bord antérieur du vertex, les trois autres sont en-dessous des yeux, une au devant des antennes, une grande en-dessous de celles-ci et la dernière assez petite à la partie tout-à-fait inférieure. Pronotum, mésonotum gris-jaunâtre, sur ce dernier une tache noire de chaque côté, à la partie postérieure en dehors de la carène latérale. Deux tiers antérieurs des élytres noirs, sauf : une tache près de la base, la plus grande partie du clavus, une longue tache au devant du milieu, partant du bord externe et s'étendant en dedans et en arrière, jusqu'au milieu du corium et enfin une dernière tache près du bord externe en arrière du milieu, qui sont gris-jaunâtre ; le dessin de cette partie des élytres est à peu près celui d'une large bande en zigzag partant de la base, se dirigeant sur le milieu du clavus puis repassant sur le corium ; tiers apical brun, contenant trois taches blanches, une à l'extrémité du bord externe et deux au devant du bord postérieur. Pro- et mésosternum noirâtres, métasternum blanc-gris, gris-brun par places. Pattes brunes estompées de noir ; cuisses antérieures et médianes noir-brunâtre. Abdomen gris-noirâtre.

♂. — Front brun très clair, côtés de la tête et clypeus noirs montrant les mêmes taches que la ♀. Vertex, pronotum, mésonotum ocre-jaune, sur ce derniers se voient également les deux taches noires.

Sur les élytres dont environ les deux tiers antérieurs sont jaune-verdâtre et l'autre tiers en grande partie brun-clair, se trouvent des taches ou bandes noires : une bande transversale irrégulière non loin de la base, se dirigeant en dedans et un peu en arrière et réunie ou non à une tache longitudinale sur le milieu du clavus, une tache longitudinale au milieu et le long du bord externe, au même niveau au centre du corium une autre tache longitudinale, enfin, à la partie apicale, deux bandes, la première oblique, partant de l'angle externe, s'étendant en dedans et en avant vers la pointe du clavus, la seconde plus petite et plus fine, se réunissant à la précédente et partant du bord apical, ces deux bandes limitent les trois taches hyalines que l'on trouve chez la ♀ et qui, ici, sont teintées de jaune-verdâtre ; toutes ces bandes et taches noires sont superposables à celles des élytres de la ♀ ; la partie voisine du bord externe, au tiers apical, est jaune-verdâtre, très légèrement teintée de brun avec deux petites taches noires. Abdomen gris-ocre, avec bandes brunes. Organes génitaux brun-noirâtre.

Longueur, ♀ : 17 mm.

Longueur, ♂ : 19 mm.

Habitat : Kasai, Kondue, Sankuru.

Type et paratypes : ma collection.

***Aspidonitys rubescens* n. sp.**

♂. — Tête et les deux paires de pattes antérieures rouges ; vertex et pronotum d'un rouge légèrement brunâtre ; écusson rouge avec taches noires mal définies ; élytres brun-rouge sur le milieu du corium, noir-rougeâtre au bord externe, au devant de la partie apicale une grande tache rouge ; ailes noires à base rouge ; pattes postérieures, sternum ocre-brun clair plus ou moins estompés par places de noir ; abdomen gris-blanchâtre, sur les premiers segments trois taches ocre-brun ; une grande médiane et deux latérales, les deux derniers segments et les organes génitaux sont également ocre-brun estompés par places de brun-noir.

Longueur totale : 17 mm. ; élytres, longueur : 15 mm., largeur : 5 mm.

Habitat : Kasai.

Type : ma collection.

***Aspidonitys ferranti* n. sp.**

♂ et ♀. — Front ocre légèrement brun, sa partie inférieure au-dessus du clypéus, une tache le long du bord latéro-inférieur, non loin de l'angle latéral et à la partie supérieure une série de taches formant

bande sont d'un brun très clair, chez le ♂ les taches frontales disparaissent ; vertex, pronotum, écusson brun-rougeâtre, plus clairs ou plus foncés par places ; élytres brun-rougeâtre, plus clairs le long du bord externe et vers l'extrémité, sur ceux-ci une petite tache blanche hyaline au devant du bord apical, non loin de l'angle externe. Ailes jaune-brunâtre, brun-noir le long du bord externe et vers l'extrémité. Sternum, cuisses gris-jaunâtre ; tibias et tarses ocre-rougeâtre ; épines et extrémité des tarses noirs. Abdomen ocre-brun estompé par places de noir.

Longueur totale : 23 mm. Longueur du corps : 16 mm. Elytres, longueur : 20 mm., largeur : 7,5 mm.

Habitat : Kasai.

Type et paratype : ma collection.

Je dédie cette espèce à M. FERRANT, directeur du Musée d'Histoire naturelle de Luxembourg.

***Aspidonitys intermedia* n. sp.**

♀. — Voisin de *Zenkeri* et *Similis* SCHMIDT, tête verte avec taches ou bandes noires disposées comme suit : sur le front, à la partie médiane quatre taches en ligne transversale, au-dessus de celles-ci et en-dessous de la carène transversale deux autres taches, dans la partie comprise entre la carène et le bord supérieur de nombreuses petites taches pouvant se souder l'une à l'autre, ainsi que les deux taches latérales l'une au-dessus de l'autre ; sur le vertex : bord antérieur et partie voisine de celui-ci, deux taches médianes et deux latérales près des angles postérieurs. Pronotum vert avec quatre taches noires, deux médianes et une de chaque côté derrière les yeux. Mésonotum jaune-verdâtre avec marbrures médianes et tache longitudinale de chaque côté en dehors des carènes latérales. Deux tiers antérieurs des élytres d'un brun légèrement verdâtre ; vers la base, ainsi que sur le milieu du clavus et du corium, des taches noires ; tiers postérieur noir, à partie apicale transparente, légèrement verte, bordée postérieurement de noir et contenant 7 à 8 points noirs.

Longueur totale : 20 mm. Longueur du corps : 16 mm. Elytres, longueur : 17 mm., largeur : 7 mm.

Habitat : Kasai.

Type : ma collection.

***Metoponitys congoensis* n. sp.**

Front et clypéus brun-olive, sur le premier une petite tache centrale et une bande à la partie inférieure jaune-brunâtre, vers la base du

second une bande transversale de même couleur. Vertex olive, pronotum brun ; écusson ocre-brun, brun sur les côtés. Elytres ocre-brun, plus clairs vers l'extérieur et la partie apicale, plus foncés vers l'intérieur, sur ceux-ci des taches et bandes à contours plus ou moins nets, ainsi que le bord apical noirs: une première bande part du milieu du bord de l'écusson et se dirige en arrière et en dehors jusqu'à la branche externe du radius ; en arrière de cette bande, sur le clavus, se trouve une assez grande tache transversale dépassant un peu la nervure externe ; en avant du milieu de la longueur, à l'endroit où les élytres commencent à se rétrécir, partant du bord externe une bande dirigée en dedans et en arrière, pour atteindre en s'élargissant le médian, entre celle-ci et la tache du clavus, de petites taches relient plus ou moins les deux ; le long du bord externe de petites taches transversales ainsi qu'une bande transversale au devant du bord apical. Ailes brun-noir, base et bord externe ocres ; segments abdominaux noirs bordés d'ocre en arrière. Pattes d'un brun très clair, extrémité des tibias antérieurs et médians, ainsi que des épines et des griffes brun-noir.

Les élytres, se rétrécissant en arrière, ont leur extrémité arrondie et relevée.

Longueur totale : 9 mm. Longueur du corps : 6,5 mm. Elytres, longueur : 7,5 mm., largeur : 3,5 mm.

Habitat : Congo belge.

Type : ma collection.

***Amychodes exsecatus* KARSCH.**

Entom. Nachr., p. 4, XXV, Jahrg. (1899).

♂. — Clypeus ocre-brun ; front, vertex bruns ; pronotum, écusson et prosternum ocre-brun, plus foncés par places ; élytres brun-olive, vers la base une bande d'un jaune légèrement brunâtre, transversale, mal délimitée, peu saillante, formée par les nervures sur un fond de coloration brunâtre ; ailes enfumées, plus foncées sur le tiers apical ; pattes d'un noir légèrement rougeâtre, spécialement sur les cuisses antérieures et médianes ; méso- et métasternum, cuisses postérieures, abdomen ocres ; les deux derniers segments abdominaux noirs ; hanches postérieures en partie brunes. Six épines sur les tibias postérieurs.

Longueur totale : 22 mm. Longueur du corps : 14 mm. Elytres : 10 mm.

Habitat : Cameroun.

Type : ma collection.

MATÉRIAUX

POUR SERVIR A L'ÉTABLISSEMENT D'UN NOUVEAU

Catalogue des Hyménoptères de Belgique

II

PAR

AD. CRÈVECŒUR ET P. MARÉCHAL

Cette deuxième contribution (1) a pour objet la mise au point, complétée par les éléments nouveaux que nous possédons, de nos connaissances actuelles sur la faune des *Braconidae*, des *Vespidae* et des *Sphegidae*. Elle contient également une première suite aux *Apidae* ainsi que la récapitulation de toutes les espèces de cette famille actuellement considérées comme authentiquement belges.

Notre travail apporte à la faune du pays un appoint de 33 espèces nouvelles.

* * *

Fam. BRACONIDAE

WESMAEL partageait les Braconides en deux grandes divisions : les Braconides endodontes et les Braconides exodontes. Seuls les endodontes, constituant d'ailleurs la grande majorité, ont été traités dans sa magistrale *Monographie des Braconides de Belgique* (1835, 1837, 1838). Leur nombre, si l'on en déduit les *Pachylommatidae* et les *Aphiditidae*, aujourd'hui considérés comme familles distinctes, s'élève à 310 espèces (y compris quelques espèces nouvelles pour la faune et citées par MAC LEOD (1894), par le Frère FABIANUS (1900) et par LAMEERE (1907). Nous y ajouterons pour l'instant :

***Elasmosoma berolinense* RUTHE, Fn. nov. sp.**, 1 ♀, Saint-André-Bruges, 16-VIII-30 (Cr.), capturée au vol au dessus d'un

(1) Voir notre programme dans nos "Matériaux I", même revue, 1931, t. 71, p. 101-116.