

and only slightly longer than, the thorax, transverse, finely asperately punctured like the thorax but more closely, yellow pubescent. Abdomen gradually narrowed from base to apex, with close, rather coarse, aciculate puncturation and moderately close yellow pubescence, thicker along the side margins.

Blukwa (Nizi), 10-XII-28 (A. COLLART).

Liste de Coléoptères capturés en Belgique

PAR

PAUL J. ROELOFS

STAPHYLINIDAE (SUITE)

- Leptacinus parumpunctatus* GYLL. — Calmpthout.
Leptacinus batychrus GYLL. — Calmpthout, Deurne, Eeckeren, Forêt Soignes, Hoboken, Schilde, Schooten, Spa.
Leptacinus formicetorum MÄRK. — Calmpthout, Wildert (*Formica rufa*).
Xantholinus punctulatus PAYK. — Partout.
Xantholinus angustatus STEPH. — Deurne, Hoboken, Santvliet, Schilde, Wyneghem.
Xantholinus glabratus GRAV. — Anvers, Hoboken.
Xantholinus tricolor F. — Wyneghem.
Xantholinus linearis OLIV. — Partout.
Gauropterus fulgidus F. — Anvers.
Baptolinus affinis PAYK. — Forêt de Soignes.
Othius punctulatus GOEZE. — Forêt de Soignes, Postel, Schooten, Westmalle.
Othius myrmecophilus KIESW. — Calmpthout, Deurne, Forêt de Soignes, Moll, Postel, Santvliet, Schilde, Schooten.
Actobius cinerascens GRAV. — Bornhem, Deurne, Calmpthout, Hoboken, Ruysbroeck, Schilde, Schooten, Tête de Flandre, Thisselt, Westmalle.
Actobius signaticornis MULS. — Calmpthout, Ruysbroeck, Tête de Flandre.
Neobisnius villosulus STEPH. — Arlon, Lillo.
Neobisnius procerulus GRAV. — Schooten.
Cafius xantholoma GRAV. — Blankenberghe.
Philonthus splendens F. — Anvers, Calmpthout, Lillo, Schooten.
Philonthus laminatus CREUTZ. — Deurne, Tête de Flandre, Schooten.

- Philonthus aeneus* ROSSI. — Anvers Calmpthout, Caprycke, Esneux, Hoboken, Schooten, Spa, Wilryck.
Philonthus chalceus STEPH. — Bornhem, Calmpthout, Schooten, Spa.
Philonthus addendus SHARP. — Schooten.
Philonthus carbonarius GYLL. — Bornhem, Caprycke, Deurne, Schilde, Schooten, Spa, Wilryck.
Philonthus atratus GRAV. — Austruweel, Deurne, Hemixen, Hoboken, Lillo.
Philonthus ebeninus GRAV. — Austruweel.
Philonthus corruscus GRAV. — Calmpthout, Hoboken.
Philonthus concinnus GRAV. — Deurne, Calmpthout, Hoboken, Lillo, Ruysbroeck, Schooten, Wilryck.
Philonthus sanguinolentus GRAV. — Calmpthout, Deurne, Gand, Hoboken, Schilde, Schooten, Wilryck.
Philonthus immundus GYLL. — Calmpthout, Deurne, Hoboken, Lillo, Ruysbroeck, Schooten, Wilryck.
Philonthus debilis GRAV. — Austruweel, Hoboken, Moll, Schooten, Wavre-Sainte-Catherine, Wilryck.
Philonthus decorus GRAV. — Schooten.
Philonthus fuscipennis MANNH. — Partout.
Philonthus Mannerheimi FAUVEL. — Anvers, Calmpthout, Forêt de Soignes, Schilde.
Philonthus varius GYLL. — Partout.
Philonthus varius ab. *bimaculatus* GRAV. — Anvers, Hoboken.
Philonthus marginatus STROEM. — Calmpthout, Hoboken, Morlanwelz, Schooten.
Philonthus longicornis STEPH. — Anvers, Calmpthout, Hoboken.
Philonthus cruentatus GMEL. — Calmpthout, Deurne, Hoboken, Lillo.
Philonthus varians PAYK. — Anvers, Austruweel, Calmpthout, Hoboken, Schilde, Schooten.
Philonthus varians v. *agilis* GRAV. — Anvers, Calmpthout, Hoboken, Schilde, Schooten, Wilryck.
Philonthus albipes GRAV. — Caprycke, Hoboken, Wyneghem.
Philonthus fimetarius GRAV. — Couillet, Deurne, Forêt de Soignes, Hoboken, Schilde, Schooten, Villers.
Philonthus cephalotes GRAV. — Anvers, Calmpthout.
Philonthus sordidus GRAV. — Deurne, Hemixen, Hoboken, Lillo, Schooten, Wilryck.
Philonthus fuscus GRAV. — Schooten.
Philonthus umbratilis GRAV. — Hemixen, Hoboken, Schooten, Thisselt.

- Philonthus ventralis* GRAV. — Anvers, Calmpthout, Deurne, Schooten, Wilryck.
Philonthus discoideus GRAV. — Calmpthout, Eeckeren, Schilde, Saint-Antoine, Wilryck.
Philonthus quisquiliarius GYLL. — Calmpthout, Deurne, Eeckeren, Hoboken, Lillo, Tête de Flandre.
Philonthus quisquiliarius v. *inquinatus* STEPH. — Nieuwmoer.
Philonthus fumarius GRAV. — Bornhem, Deurne, Hoboken, Overmeire, Schooten.
Philonthus nigrita GRAV. — Calmpthout, Schooten.
Philonthus micans GRAV. — Bornhem, Deurne, Hoboken, Oorderen, Schilde, Tamise, Thisselt.
Philonthus fulvipes F. — Deurne, Hoboken.
Philonthus punctus GRAV. — Deurne, Oorderen.
Philonthus pullus NORDM. — Anvers, Schooten.
Philonthus vernalis GRAV. — Schooten.
Philonthus nigrutilus GRAV. — Partout.
Philonthus nigrutilus v. *trossulus* NORDM. — Hoboken.
Philonthus splendidulus GRAV. — Forêt de Soignes.
Staphylinus pubescens DEG. — Anvers, Deurne, Schooten.
Staphylinus stercorarius OL. — Anvers, Cappellen, Hoboken.
Staphylinus chalconcephalus F. — Westmalle.
Staphylinus caesareus CEDERH. — Anvers, Calmpthout, Deurne, Hoboken, Schilde.
Staphylinus erythropterus L. — Anvers, Deurne, Hoboken.
Staphylinus olens MÜLL. — Anvers, Calmpthout, Hoevene, Lierre, Salm, Saint-Antoine, Schilde, Wilryck.
Staphylinus ophthalmicus SCOP. — Arlon, Calmpthout, Lierre, Putte, Schooten, Virton.
Staphylinus similis F. — Calmpthout, Schooten, Wilryck.
Staphylinus fuscatus GRAV. — Arlon, Calmpthout, Schooten.
Staphylinus aeneocephalus DEG. — Anvers, Beirendrecht, Caprycke, Calmpthout, Schooten.
Staphylinus ater GRAV. — Anvers.
Staphylinus globulifer GEOFFR. — Austruweel, Calmpthout, Deurne, Hoboken.
Staphylinus compressus MARSH. — Calmpthout, Schooten.
Ontholestes tessellatus GEOFF. — Deurne, Villers.
Ontholestes murinus L. — Anvers, Calmpthout, Eeckeren, Hoboken, Santvliet, Schilde, Schooten, Wavre-Sainte-Catherine.

- Emus hirtus* L. — Austruweel, Schooten.
Creophilus maxillosus L. — Anvers, Calmpthout, Wilryck, Heyst, Westmalle.
Quedius brevis ER. — Deurne et Westmalle avec *Formica rufa*; Schooten avec *Lasius fuliginosus*, Schilde.
Quedius lateralis GRAV. — Calmpthout, Forêt de Soignes.
Quedius ochripennis MEN., v. *nigrocoeruleus* FAUVL. — Blankenberghe, Schooten.
Quedius cruentus OL. — Deurne, Eeckeren, Hoboken, Putte, Westmalle.
Quedius cruentus v. *virens* ROTTENB. — Contich.
Quedius mesomelinus MARSH. — Anvers, Arlon, Calmpthout, Hoboken, Forêt de Soignes, Wavre-Sainte-Catherine.
Quedius scitus GRAV. — Hoboken.
Quedius cinctus PAYK. — Anvers, Bornhem, Calmpthout, Caprycke, Esneux, Herenthals, Lillo, Saint-Antoine, Schooten.
Quedius fuliginosus GRAV. — Anvers, Calmpthout, Deurne, Hoboken, Wavre-Sainte-Catherine.
Quedius tristis GRAV. — Anvers, Calmpthout, Esneux, Forêt de Soignes.
Quedius molochinus GRAV. — Calmpthout, Deurne, Hockay, Lillo, Forêt de Soignes.
Quedius picipes MANNH. — Calmpthout, Schooten, Virton.
Quedius fumatus STEPH. — Tête de Flandre.
Quedius nigriceps KR. — Calmpthout, Deurne, Moll, Wyneghem.
Quedius maurorufus GRAV. — Schooten, Tête de Flandre.
Quedius scintillans GRAV. — Hoboken.
Quedius rufipes GRAV. — Calmpthout, Schilde, Schooten.
Quedius picipennis HEER. — Schilde.
Quedius boops GRAV. — Calmpthout, Hoboken, Schilde, Tête de Flandre, Virton, Wilryck.
Heterothops praevia ER. — Deurne.
Heterothops 4 punctula GRAV. — Hoboken.

VI

Assemblée mensuelle du 4 juin 1932

Présidence de M. A. D'ORCHYMONT, Président.

- La séance est ouverte à 17 h.
- Le compte-rendu de l'assemblée mensuelle d'avril est approuvé.
- Travaux pour les Annales et le Bulletin.* — L'on décide l'impression du travail ci-après de M. E. FLEUTIAUX.
- Communications.* — Notre collègue, M. MARÉCHAL, nous adresse la communication suivante :
 " La mention **Fn. nov. sp.** par laquelle on désigne dans les publications de notre société les espèces nouvellement découvertes en Belgique, ne nous paraît pas opportune. Tout d'abord, elle ne dit pas ce qu'elle devrait dire : "**Faunae**" Quelle faune ? Nous sous-entendons "**belgicae**", mais l'étranger n'en fait pas autant, et le **Fn. nov. sp.** reste pour lui un rébus. Voici la deuxième fois qu'un savant étranger vient aux informations ; on se demande si **Fn.** veut dire **forma nova**, etc. Pour ces raisons, nous demandons de bien vouloir adopter **Belg. nov. sp.** (*Belgicae nova species*) qui aura l'avantage d'être aussi explicite que clair, et d'être compris hors frontières ".
 Plusieurs membres prennent part à la discussion relative à cette modification dont l'usage est laissé au choix des auteurs.
- M. THOMAS montre une série d'insectes intéressants dont *Corymbites cruciatus* L.
- M. LAMEERE fait une communication sur les tubes de Malpighi chez les Coléoptères à propos d'un récent travail de notre collègue, M. POLL et attire l'attention sur la valeur systématique de ces organes.
- La séance est levée à 18 h.