

flavipalpis WINN. — L. c., VI, 80, 77 (1852).

Gand.

nigritula ZETT. — *Ins. lapp.*, 820, 3 (1838).

Syn. *tenebricosa* GOETCH.

Hockai.

bicolor PANZ. — *Fauna germ.*, CIII, 13 (1806).

Gentbrugge, Overmeire, Postel.

transfuga STAEGER. — *Kroj. Tidsk.*, II, 598, 28 (1839).

Destelbergen.

pygmaea GOETCH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, VIII, fasc. 3 (1920).

Gand, Sy.

curtforceps GOETCH. — *Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXVIII, p. 233 (1928).

Houyet.

MATÉRIAUX

POUR SERVIR A L'ÉTABLISSEMENT D'UN NOUVEAU

Catalogue des Hyménoptères de Belgique

IV

PAR

AD. CRÈVECŒUR ET P. MARÉCHAL

Cette 4^e contribution (1) aborde l'examen des *Cynipidae* et des *Chalcidoidea*. Nos connaissances faunistiques sur ces deux groupes sont encore rudimentaires, et nos "Matériaux" ne constitueront qu'une modeste mise au point complétée par quelques données nouvelles qu'il nous a été donné de rassembler jusqu'ici.

Notre travail apporte un tribut de 39 espèces à la faune de Belgique.

* * *

Fam. CYNIPIDAE

Les seuls renseignements faunistiques importants que nous possédions sur cette famille, au point de vue belge, concernent presque uniquement les espèces *gallicoles* de la sous-famille des *Cynipinae*. VAN SEGVELT (1881) en a donné une 1^{re} liste, qu'il a complétée la même année. Le Frère FABIANUS (1900), POSKIN (1901), LAMEERE (1907) et BEQUAERT (1909) y ont ajouté quelques formes.

Les *Cynipides gallicoles* n'ont guère retenu notre attention jusqu'à présent, et nous y reviendrons ultérieurement. Nous y ajouterons toutefois dès maintenant :

***Aylax minor* Htg., Belg. nov. sp.** 6 expl., de galles de *Papaver Rhæas* L., provenant de Noville-sur-Mehaigne; éclos du 22 au 30-V-33 (Cr.).

(1) Voir notre programme dans nos "Matériaux I", même revue, 1931, t. 71, pp. 101-116.

Synergus umbraculus OL., Belg. nov. sp., des galls de *Cynips Kollari*; C à Chênée, quelques expl. de Chaudfontaine et d'Ans; éclosions du 12-V au 5-VI-33; en outre un expl. pris à Esneux sur les nectaires des stipules de *Sambucus racemosa*, le 19-VII-29 (M.).

S. Reinhardi MAYR., Belg. nov. sp. Des galls de *Cynips Kollari*; C à Chaudfontaine, quelques expl. d'Ans; éclosions du 15-V à juin, 1932-1933 (M.); C à Saint-André-Bruges, et environs de Bruxelles (CR.).

Actuellement, 59 esp. de *Cynipinae* ont été citées de Belgique.

* * *

Quant aux *Cynipides* parasites, nous donnons ci-dessous la liste provisoire, encore très incomplète, des 46 esp. repérées dans notre pays.

Nous remercions tout particulièrement M. le Dr H. HEDICKE, du Musée de Berlin, l'éminent spécialiste de ce groupe, qui à diverses reprises nous a aidés de ses conseils, et nous a prêté son concours précieux pour la détermination de certains exemplaires.

Subf. I. — *Ibaliinae*,

G. *IBALIA* LATR. — 1 espèce :

I. leucospoides HOCHENW. (LAMEERE, 1907). Cette esp., donnée comme RR par LAMEERE n'a pas, à notre connaissance, été signalée d'une manière précise de Belgique.

Subf. II. — *Anacharitinæ*

G. *ANACHARIS* DALM. — 3 espèces :

A. eucharoides DALM. Belg. nov. sp. 1 ♀ Waha, 12-VII-31 (L.), 1 ♂ Stockel, VII-32 (CANTENS).

A. immunis WALK. (LAM., 1907), 1 ♂ Uccle, VIII-27 (CANTENS).

A. typica WALK. (LAM., 1907), Tervueren, Crainhem, Weert-St-Georges, Ixelles, Wesembeek, Watermael (CANTENS, CR.).

G. *ÆGILIPS* WALK. — 2 espèces :

A. Dalmani REINH. (? *A. rufipes* WESTW.) (LAM., 1907), 1 ♀

Groenendael, 25-VIII-15 (LESTAGE, Mus. Brux.); 1 ♂ d'une galle de *Cyn. Kollari*, d'Ans, V-32 (M.); 1 ♀ Uccle et 1 ♂ Crainhem, IX-26 (CANTENS); nombreux ♂ ♀ Ixelles VII-VIII-31 et V-VI-32-33 (CR.).

A. rugicollis REINH. (FABIANUS 1900).

G. *XYALASPIS* HART. — 1 espèce :

X. armata GIR., Belg. nov. sp. 1 ♀ Tervueren, VII-27 (CANTENS).

Subf. III. — *Aspicerinae*

G. *ASPICERA* DAHLB. — 1 espèce :

A. scutellata VILL. (LAMEERE, 1907).

G. *CALLASPIDIA* DAHLB. (*Onychia* HAL.). — 2 espèces :

C. Defonscolombei DAHLB. (LAMEERE, 1907).

C. Dufouri GIR., Belg. nov. sp., 1 ♀ Rixensart, VIII-27 (CANTENS).

Subf. IV. — *Figitinae*

G. *SAROTHRUS* HART. — 2 espèces :

S. areolatus HART. (LAMEERE, 1907).

S. tibialis ZETT. (LAM., 1907), 1 ♂ Uccle, IX-26, 1 autre Weert-St-Georges, VI-26 (CANTENS).

G. *AMBLYNOTUS* HART. — 2 espèces :

A. granulatus HART., Belg. nov. sp., 1 ♂ Boitsfort 19-V-29 (CR.).

A. opacus HART. (LAM., 1907), 2 ♂ Boitsfort, 19-V-29, 1 ♂ ibid. 9-VII-32, 1 autre Forêt de Soignes, 11-VI-33 (CR.); 2 ♀ Tiège (Spa), 10-VII-33 (ROELOFS).

G. *ZYGOSIS* FÖRST. — 1 espèce :

Z. heteroptera HART. (LAMEERE 1907).

G. *FIGITES* LATR. — 3 espèces :

F. consobrinus GIR. (LAM. 1907), 1 ♂ Tiège, 10-VII-33 (ROELOFS).

F. scutellaris ROSSI (LAM., 1907), 1 ♀ Uccle, 6-VIII-32 (CR.).

F. striolatus HART., Belg. nov. sp., 1 ♀ Wesembeek, 26-VIII-32 (CR.).

Subf. V. — *Eucoilinae*

G. TRYBLOGRAPHA FÖRST. (*Cothonaspis* HART.). — 3 espèces :

T. diaphana HART., Belg. nov. sp., ♂ ♀, VI-IX, Sterrebeek, Wesembeek, Boitsfort, Tervueren, Crainhem, Waterloo, Vossem, Rixensart, St-André-Bruges, Rivière (CANTENS, CR.). Cette esp. nous paraît la plus C de la sous-famille.

T. octotoma THS., Belg. nov. sp., 1 ♀ Rixensart, VIII-27 (CANTENS), 1 autre St-André-Bruges, VII-31 (CR.).

T. (Eutrias) tritoma THS., Belg. nov. sp., 2 ♀, Rixensart, VII-VIII-27, une autre, Uccle, VIII-27 (CANTENS), 1 ♀, Boitsfort, 17-VIII-32, 1 autre, Damme, 26-VII-33 (CR.).

G. PSEUDEUCOILA ASHM. (*Eucoila* AUCT. nec WESTW.). — 6 espèces :

P. basalis HART. (LAMEERE, 1907).

P. cubitalis HART. (LAMEERE, 1907).

P. floralis DAHLB. (LAM., 1907), 1 ♀, Vossem, VIII-26; 1 ♂, Rixensart, VIII-27, 1 autre, Weert-St-Georges, VI-26 (CANTENS).

P. graciliclava KIEFF., Belg. nov. sp., 1 ♀, Lustin, VIII-33, 1 autre, Wesembeek, 26-VIII-32 (CR.).

P. heptoma HART. (LAMEERE, 1907).

P. longicornis HART. (LAMEERE, 1907).

G. CHRESTOSEMA FÖRST. — 2 espèces :

C. antennale KIEFF., Belg. nov. sp., 1 ♀, Vossem, VIII-26, 1 ♂ 1 ♀, Wesembeek, VII-32 (CANTENS), 1 ♀, Boitsfort, 17-VIII-32 (CR.).

C. erythropum FÖRST., Belg. nov. sp., 1 ♀, Bruxelles, VIII-31 (CANTENS), 1 autre, Sterrebeek, 30-VII-32 (CR.).

G. EUCOILA WESTW. (*Psilodora* FÖRST.). — 2 espèces :

E. crassinerva WESTW. (*maculata* HART.) (LAM., 1907), ♂ ♀

VII-IX, Boitsfort, Stockel, Uccle, Vossem, Tervueren, Rixensart (CANTENS, CR.).

E. trichopsila HART. (LAMEERE, 1907).

G. KLEIDOTOMA WESTW. — 2 espèces :

K. geniculata HART. (LAMEERE, 1907).

K. striaticollis CAM., Belg. nov. sp., 1 ♀, Méry, 3-VI-31 (L.).

G. DISORYGMA FÖRST. — 1 espèce :

D. divulgatum FÖRST., Belg. nov. sp., 2 ♀ Sterrebeek, 14-V-32, 1 ♂, Uccle, 29-IV-33 (CR.).

Subf. VI. — *Charipinae*

G. ALLOXYSTA FÖRST. — 4 espèces :

A. erythrothorax HART., Belg. nov. sp., 2 ♀ sur *Urtica*, Forêt de Soignes, 1-X-33 (CR.).

A. filicornis CAM., Belg. nov. sp., 1 ♂, Boitsfort, 19-IX-33 (CR.).

A. macrophadna HART. (LAMEERE, 1907).

A. Ullrichi GIR. (FABIANUS, 1900).

G. CHARIPS HAL. (*Allotria* WESTW.) — 6 espèces :

Ch. (Bothrioxysta) Carpentieri KIEFF., Belg. nov. sp., 1 ♀, Stockel, VII-27 (CANTENS).

Ch. melanogaster HART. (LAMEERE, 1907).

Ch. minutus HART. (LAMEERE, 1907).

Ch. pusillus KIEFF., Belg. nov. sp., f. *melanothorax* KIEFF., 1 ♀ dans une habitation, Liège, 18-V-30 (M.).

Ch. Tscheki GIR. (LAMEERE, 1907).

Ch. victrix WESTW. (FABIANUS 1900, sous le nom d'*Allotria erythrocephala* GIR.). Esp. C aux environs de Bruxelles (CANTENS, CR.).

G. PEZOPHYCTA FÖRST. — 1 espèce :

P. brachyptera HART. (LAM., 1907), 1 ♀, Tervueren, VII-27 (CANTENS), 1 ♂ 1 ♀, St-André-Bruges, mi-VIII-32 (CR.).

G. PHAENOGLYPHIS FÖRST. — 1 espèce :

P. Carpentieri KIEFF., déjà signalée par l'un de nous de St-André-Bruges. Vit en parasite ou en hyperparasite d'un puceron noir sur *Tropaeolum*.

* * *

Superfam. CHALCIDOIDEA

Jusqu'à présent, personne ne s'est encore occupé spécialement, en Belgique, de cette famille, la plus difficile, et probablement la plus riche en espèces, de tout l'ordre des Hyménoptères. Il est vrai que la petitesse de ces insectes, leur nombre considérable, l'absence d'un ouvrage d'ensemble, la dispersion et l'état fragmentaire des monographies, ne sont pas de nature à encourager les chercheurs !

A part l'une ou l'autre indication tout à fait isolée (PREUDHOMME DE BORRE [1887], WILLEM [1896-1897], FABIANUS [1900], BEQUAERT [1909], LESTAGE [1909], etc.), le seul relevé des espèces belges que nous possédions est celui de la Faune de LAMEERE (vol. III, 1907, pp. 201 à 247).

L'usage le plus généralement adopté depuis quelque temps, est d'admettre une superfamille des CHALCIDOIDEA, et d'élever au rang de familles les anciennes sous-familles. Il n'y a pas lieu de séparer les *Miscogasterinae* des *Pteromalinae* ; les *Miscogasterinae* resteront au rang de sous-famille dans les *Pteromalidae*. Par contre, les travaux de R. G. MERCET ont montré que la tribu des *Aphelinini* formait un groupe important et homogène, qu'il convenait de détacher des *Eulophidae* sous le nom de famille des *Aphelinidae*.

La subdivision de nos CHALCIDOIDEA se fera donc en 13 familles, savoir :

1. Chalcididae	5. Eurytomidae	10. Pteromalidae
2. Eucharididae	6. Cleonymidae	11. Eulophidae
3. Perilampidae	7. Eupelmidae	12. Trichogrammidae
4. Callimomidae	8. Encyrtidae	13. Mymaridae
(Torymidae)	9. Aphelinidae	

Dans la présente liste, nous nous bornerons à signaler les genres et les espèces nouveaux pour la Belgique, ainsi que des localités précises pour des espèces réputées plus ou moins rares en notre pays. Provisoirement, nous placerons les genres dans l'ordre alphabétique, sauf pour les *Callimomidae* dont nous ferons un relevé complet, à la manière habituelle.

Presque toutes les déterminations sont dues à l'extrême obligeance de M. L. MASI, du Museo Civico de Gênes ; celles des *Callimomidae* ont été confiées à M. E. B. HOFFMEYER, à Haslev (Danemark). Nous prions ces savants Collègues d'agréer l'expression de notre vive gratitude.

Fam. CHALCIDIDAE

Belaspidia nigra MASI. Rappelons que cette esp., décrite en 1927 (1), a été obtenue en un seul expl., dans un élevage d'*Apteron crenulella* BRD. (*Psychidae*) provenant de la Montagne Saint-Pierre, à Loën, le 9-VII-26 (M) (2). Malgré la récolte de nombreux fourreaux pendant plusieurs années, il n'a plus été possible de s'en procurer !

Brachymeria (Chalcis) minuta L. 1 expl. Martinrive, 19-VI-29 (M.), un autre, Loën, 21-VI-31 (L.).

Haltichella bispinosa SPIN., Belg. nov. sp., 1 ♂, Sy, 24-VII-31 (M.).

Fam. CALLIMOMIDAE

Elle comprend actuellement 5 genres, avec 25 espèces indigènes.

G. CALLIMOME SPIN. (*G. G. Syntomaspsis* FÖRST. et *Torymus* DALM. in LAM.). (18 esp. : *abbreviatum* BOH. [var. *macropterum* WALK.], *abdominale* BOH., et var. *nigricorne* BOH., *amoenum* BOH., *auratum* FONSC., *bedeguaris* L., *cyaneum* BOH., *druparum* BOH., *erucarum* SCHRK., *fastuosum* BOH., *fulgens* F., *hieracii* MAYR, *juniperi* L., *lazulinum* FÖRST., *littorale* WALK. [c'est le *Syntomaspsis saphirina* BOH. de LAM.], *nobile* BOH., *pygmaeum* MAYR, *tanaceticola* RUSCHKA et *ventrale* FONSC.).

C. abbreviatum BOH., Belg. nov. sp., var. *macropterum* WALK., 1 ♂, 1 ♀ de galles d'*Aulacidea Hieracii* BChé (Cynip.) de Gélivaux (Olne), IV-V-1929 (M.) ; 1 ♀ d'une galle même esp., de Sterrebeek, 8-V-32 (CR.).

C. amoenum BOH., Belg. nov. sp., 1 ♀, Waha, 19-VIII-30 (L.).

C. hieracii MAYR, Belg. nov. sp., quelques expl. ♂ ♀ de galles de la Tanaisie (produites par *Rhopalomyia tanaceticola* KARSH. [Cecidom.]), d'Esneux ; éclosions IV-V-29 (M.) ; 2 ♀ de galles semblables de Waha, 3-V-30 (L.).

C. tanaceticola RUSCHKA, Belg. nov. sp., nombreux expl. ♂ ♀

(1) Boll. Soc. Ent. italiana, anno LIX, 1927, nos 5-6.

(2) V. P. MARÉCHAL : L'*Apt. crenul.* à la Montagne S.-P. de Visé, *Lambillionea*, 1930, pp. 142-149.

sortis des mêmes galles de la Tanaïs, d'Esneux, du 1^{er} au 13-V-32 (M.).

C. ventrale FONSC., Belg. nov. sp., 1 expl., Comblain-au-Pont, 30-V-28 (M.).

G. MONODONTOMERUS WESTW. comprend 4 esp. belges, savoir :

M. aereus WALK., Belg. nov. sp., 1 expl. dans une habitation, à Liège, 18-VIII-30 (M.).

M. nitidus NEWP., Belg. nov. sp., 2 ♂, 20 ♀ obtenus de 2 cocons parasités d'*Osmia rufa* L., d'Ivoz-Ramet; éclos 1^{re} quinzaine VII, 1932 et 1933 (M.).

M. obscurus WESTW., Belg. nov. sp., quelques ♂ et nombreuses ♀, de nids d'*Osmia cornuta* LATR., de Tilff, VI-VII-28 (M.).

M. obsoletus F., AR d'après LAMEERE.

G. GLYPHOMERUS FÖRST. (*Oligosthenus* in LAM.), 1 esp. : *stigma* F., AC.

G. MEGASTICMUS DALM., 1 esp. : *dorsalis* F., AC suivant LAMEERE.

Il faudra presque certainement y ajouter *M. stigmatizans* F., qui serait une nouvelle acquisition pour notre faune. Un ♂ est sorti d'une galle de *Cyn. Kollari* de Chênée, le 30-IV-33 (M.), mais l'expl. est très petit, peu caractéristique, et laisse quelque doute. Nous attendrons capture confirmative pour prendre l'esp. en compte.

G. ORMYRUS WESTW. 1 esp. : *punctiger* WESTW., AR d'après LAMEERE.

N.-B. Nous ne voyons nulle part mention d'un "*Torymus ater* F.", fût-ce comme syn., dans le travail de HOFFMEYER sur les *Callimomidae* européens. Aussi ne citerons-nous pas cette esp. du F. FABIANUS. Quant à son "*Torymus purpurascens* BOH.", nous supposons qu'il s'agit de *Call. purpurascens* NEES, syn. de *C. abbreviatum* BOH. Le *purpurascens* BOH. n'est pas un *Torymus*, mais appartient au G. *Callimomus* (différent de *Callimome*) dont la présence en Belg. resterait à prouver.

Fam. EURYTOMIDAE

Decatoma biguttata SWED. 1 ♀, Méry, 26-IV-31 (L.).

D. submutica THS. Citée déjà (1) comme parasitant les galles

(1) v. P. MARÉCHAL, *Notes biolog.*, n° 13, *Lambillionea*, 1932, p. 254.

d'*Aulacidea Hieracii* BCHÉ (Cynip.), sur *Hieracium umbellatum* L., à Gélivaux (Olne); 45 expl. V-VIII, 1929 à 1931 (M.).

Eurytoma Mayri ASHM., nombreux expl. de galles de *Diastrophus rubi* HART. (Cynip.), sur *Rubus*, de La Xhavée (1) et de Ramioul (Ivoz-Ramet), en V-VI, 1928 et 1930 (L.).

Fam. CLEONYMIDAE

Chiropachys colon (L.) WESTW., Belg. nov. sp., 1 ♂ obtenu comme parasite d'une larve de Coléoptère des environs de Bruxelles (FRENNET).

Fam. EUPELMIDAE

Calosoter vernalis CURT., 1 ♀, Saint-André-Bruges, 30-VI-32 (CR).

Eupelmus spongipartus FÖRST., Belg. nov. sp., 4 ♀ de galles de *Cyn. Kollari*, de Chênée et de Chaudfontaine, écloses du 7 au 12-V-33 (M.).

N.-B. — RUSCHKA donne *azureus* RATZ. comme syn. de *spongipartus* FÖRST. partim. L'esp. *urozonus* DALM., citée par LAM., est probablement différente.

Polymoria coronata THS., Belg. nov. sp., 1 ♀, Waha, 17-VIII-30 (L.).

Fam. ENCYRTIDAE

Encyrtus lunatus DALM., 1 ♀, Méry, 3-IV-31 (L.).

Eucomys (Encyrtus) scutellata SWED., 2 expl. sur les *Vaccinium*, Mont-Xhoffsraix, 5-VII-31 (M.).

Litomastix truncatellus DALM. 1 expl., Gastuche, 17-VIII-27 (M., det. MERCET).

Fam. PTEROMALIDAE

Caenacis sp., Belg. nov. gen., des galles de *Cyn. Kollari*, de Chênée; 5 ♂, les 11 et 12-IV; 5 ♀ du 25 au 28-IV-33 (M.).

Callitula (Baeotomus) pyrrhogaster WALK. 1 ♀, La Rosière (Plainevaux), 25-IV-30 (M.).

(1) v. P. MARÉCHAL, *Notes biolog.*, n° 10, *Lambillionea*, 1932, pp. 40-42.

Caratomus megacephalus F. 1 ♀, Buysinghen, 20-VI-14 (coll. HONORÉ, Musée Bruxelles). LAM. cite l'esp. comme R. M. MASI nous écrit qu'elle est RR et qu'il ne doit y avoir que 4 ou 5 expl. connus; la biologie est inconnue.

Conomorium (Pteromalus) eremita FÖRST., Belg. nov. sp., 1 expl., Sy, 26-III-32 (M.).

Diglochis omniivorus WALK., 1 expl., Waha, 12-VII-31 (L.).

Homoporus fulviventris WALK., Belg. nov. sp., 1 expl., Sy, 12-VIII-32 (M.).

Lariophagus distinguendus FÖRST., Belg. nov. sp., 1 expl. dans une habitation, Liège, 28-VIII-29 (M.). Connu comme parasite de *Calandra*, peut-être aussi de *Bruchus* et d'*Anobium paniceum*.

Micromelus (Baeotomus) plagiatus NEES, 1 expl., Lierre, 10-V-30 (ANT. BALL). Cet expl. a les pattes 1 entièrement rousses.

Pteromalus (?) liparae GIR. Esp. déjà signalée par BEQUAERT (1909); 2 expl. de galles de *Lipara lucens* (Dipt. Chlorop.) sur *Phragmites*, de Boitsfort (forêt de Soignes); éclos le 1-VI-33 (CR.).

Cette esp. devra être revue au point de vue systématique, car ses caractères ne la rattachent guère au G. *Pteromalus*. GIRAUD lui-même avait fait des réserves sur ce point.

Stenomalus crassicornis THS. 1 ♀, Sy, 27-VII-28 (M.).

Stictomischus sp., Belg. nov. gen. 1 ♂, Tilff, 1-V-27 (M.).

Systasis longicornis THS. (*encyrtoides* WALK. ?), 1 expl., Sy, 24-VII-31 (M.).

Trichomalus sp., Belg. nov. gen. Plusieurs expl., Chaudfontaine, sur les fleurs de *Salix caprea*, et Beaumont (Esneux) (M.).

Fam. EULOPHIDAE

Necremnus sp., Belg. nov. gen., 1 expl. dans une habitation, Liège, 5-IX-29 (M.).

* * *

En y comprenant celles citées ci-dessus, 200 espèces environ de *Chalcidoidea* ont été signalées de Belgique. Ce nombre pourrait bien se trouver quintuplé si chercheurs et détermineurs concentraient leurs efforts sur ce groupe délaissé, dont l'importance économique est cependant considérable.

Two new species of *Staphylinidae* (Col.)

FROM THE BELGIAN CONGO

BY

MALCOLM CAMERON, M. B., R. N., F. R. E. S.

Bledius (Pucerus) africanus sp. n.

Head black, dull, the clypeus more shining, the antennal tubercles shining, yellow at apex. Thorax yellowish-red. Elytra yellow. Abdomen black. Antennae mouth parts and legs reddish-yellow. Length: 2,3 mm.

Build of *verres* ER. but much smaller and differently coloured.

♂. — Head strongly coriaceous, impunctate, the antennal tubercles well developed, the clypeus with two short, slender, scarcely diverging spines, the anterior border truncate. Antennae with the 1st joint very long, curved and gradually thickened at apex. 2nd to 7th joints elongate, gradually decreasing in length, the 8th to 10th moderately transverse. Thorax transverse, the sides almost straight and parallel for the anterior two-thirds, then obliquely truncate to the base, the angles rounded, along the middle with a fine impressed line, the puncturation moderately close, superficial and obsolete, finely coriaceous. Elytra about a third longer than the thorax with moderately fine, superficial rather close puncturation and short yellow pubescence. Abdomen extremely finely and extremely sparingly punctured, finely coriaceous and with scanty yellow pubescence.

Bena-Dibele, 10-VII-32 (N. CREPPE). Unique. In my collection.

Athela (s. str.) *creppei* sp. n.

Greasy lustrous, the head black, the rest pitchy black or pitchy-brown, the sides of the thorax narrowly and obscurely reddish. Antennae black, the first two joints and the legs reddish-yellow. Length: 3,75-4 mm.