

- Aleochara intricata* MANNH. — Calmpthout, Eeckeren, Lillo, Schilde, Wilryck.
Aleochara morion GRAV. — Anvers, Arlon, Bornhem, Hoboken, Santvliet, Westmalle.
Aleochara tristis GRAV. — Salm.
Aleochara sparsa HEER. — Hoboken, Schooten.
Aleochara lanuginosa GRAV. — Austruweel, Calmpthout, Deurne, Santvliet, Westmalle.
Aleochara fumata GRAV. — Schooten, Westmalle.
Aleochara moerens GYLH. — Calmpthout, Postel, Schooten.
Aleochara bilineata GYLH. — Anvers, Deurne, Hoboken, Schilde.
Aleochara verna SAY. — Hoboken.
Aleochara bipustulata L. — Hoboken, Morlanwelz, Schooten, Westmalle.
Aleochara algarum FAUV. — Lillo.
Trogophloeus memnonius ER. — Nieuwmoer.
Amauronyx Maerkeli AUB. — Santvliet.
Leptinus testaceus MULL. — Quatre-Bras.
Riolus cupreus MÜLL. — Hermeton.

ADDITIONS

A LA

Faune des Coléoptères et des Hémiptères

DE BELGIQUE

PAR

F. GUILLEAUME ET G. VREURICK

COLÉOPTÈRES

- Atheta cadaverina* Ch. BRIS. — 1 ex., Wellin, septembre 1933 (F. GUILLEAUME).
Hypocyrtus laeviusculus MARSCH. — 1 ex., Wellin, septembre 1933 (F. GUILLEAUME).
Omalius Allardi FAIRM. et BRIS. — 1 ex., Uccle, 30 juillet 1931 (G. VREURICK).
Reichenbachia haematica REICH. — Quelques ex., Wellin, septembre 1933 (F. GUILLEAUME).
Atomaria umbrina GYLH. — 1 ex., Wellin, septembre 1933 (F. GUILLEAUME).
Xyletinus pectinatus F. — Rabais (près Virton), 5 juin 1933 (P. MARÉCHAL).
Callidium aeneum DE G. — 1 ex., Torgny, 6 juin 1933. **Belg. nov. sp.** (P. MARÉCHAL). Ce beau Longicorne, voisin du *C. violaceum* L. n'est pas mentionné dans le catalogue LAMEERE. EVERTS (*Coleopt. Neerl.*, t. III, p. 412) le signale comme existant partout en Allemagne où il vit dans le bois de Chêne.
Dibolia Försteri BACH. — 1 ex., Villers-sur-Lesse, août 1933 (E. DERENNE).
Oliorrhynchus uncinatus GERM. — 2 ex. en tamisant des détritus végétaux et de la mousse, Wellin, septembre 1933. D'après HUSTACHE, cette espèce est commune dans les mousses des forêts, Danemark,

Allemagne, Autriche, Suisse. En France dans les massifs subalpins des Alpes, du Jura, des Vosges et des Pyrénées. Mentionnée par MATHIEU comme ayant été prise dans le Luxembourg et les Ardennes belges, sans autre précision (*Ann.*, t. II, p. 205) (F. GUILLEAUME).

Orchestes tomentosus OLIV. — 1 ex. au fauchoir, Wellin, 17 septembre 1933. Belg. nov. sp. (F. GUILLEAUME). D'après HUSTACHE, cet *Orchestes* d'Europe méridionale remonte jusqu'à Lyon où il est très abondant. Il vivrait sur une espèce de Centaurée. Serait-ce *Centaurea scabiosa*, plante fort répandue dans les environs de Wellin?

Ceuthorrhynchidius apicalis GYLH. — 1 ex. au fauchoir, Wellin, septembre 1933 (F. GUILLEAUME).

Ceuthorrhynchus moguntiacus SCHULTZE. — 1 ex., Uccle, 31 juillet 1931 (G. VREURICK).

HÉMIPTÈRES

Prostemma guttula F. — 1 ex. sous une pierre, Wellin, septembre 1933 (F. GUILLEAUME).

Spilostetus saxatilis SCOP. — En nombre, Wellin, septembre 1933 (F. GUILLEAUME).

Sur *Diaspis visci* (SCHR.) Löw.

ET DEUX DE SES PARASITES
NOUVEAUX POUR LA FAUNE BELGE

PAR

J. GHESQUIÈRE

Dernièrement, le Dr MOSERAY, assistant au Jardin Botanique de Bruxelles, me soumettait quelques branches de Genévrier (*Juniperus communis* L.), provenant de Anhée (Ardennes belges), attaquées par un Coccide que j'identifiai comme étant le *Diaspis visci* (SCHR.) Löw.; celui-ci n'avait, jusqu'à présent, jamais été signalé en Belgique, mais cette curieuse découverte, bien qu'intéressante au point de vue zoogéographique, n'était pas surprenante puisque cette Diaspine avait déjà été reconnue dans la plupart des pays avoisinants et, notamment dans le Duché de Bade et en Hollande. Voici, succinctement résumés, les quelques renseignements que j'ai réunis à son sujet.

Synonymie. — *Diaspis visci* (SCHR.) Löw. (1781) = *Diaspis carueli* TARG. (1869); *D. minima* TARG. (1869); *D. juniperi* (BCHÉ) SIGN. (1869); *D. fallax* HECK. (1902); *D. juniperi* var. *visci* LDGR. (1909); *D. purpuripennis* ANON. (1909); *D. taxicola* VAYSS. (1912).

Répartition géographique. — Ce Coccide possède une aire de dispersion assez étendue; on le signale en effet de l'Asie mineure aux îles Canaries en passant par l'Italie, le Midi de la France, la Corse, l'Algérie et Madère. Il a été récolté en outre dans toute l'Europe centrale ainsi qu'au Danemark, en Hollande, en Angleterre et en Russie, enfin il est bien connu d'Amérique sous le nom de *D. carueli* (FELT, 1905; MERCET, 1912; BANKS et COLCORD, 1905-1930). Sa dispersion semble donc suivre celle de ses plantes-hôtes spécifiques indigènes appartenant presque toutes au genre *Juniperus* (plus rarement *Taxus* et *Pinus*), dont 15 espèces différentes ont été reconnues