

b) dont les larves vivent dans le bulbe du Bananier; introduit du Bas-Congo :

Cosmopolites sordidus GERM. (Maniéma: Kindu 1924, J. GHESQUIÈRE).

c) dont les larves vivent dans les fleurs de *Baikiaea* :

Endaeus fuscirostris MSHL. (Stanleyville 1923, J. GHESQUIÈRE).

E. baikeae MSHL. (Stanleyville 1926, J. GHESQUIÈRE).

d) *Apoderus testaceus* VOSS. (Sankuru: Komi 1930, J. GHESQUIÈRE). Sur *Hymenocardia acida* :

Baris impolita BOH. (Luebo 1921, J. GHESQUIÈRE). Sur Caféier.

Paremydica insperata FST. (Lukoléla 1923, J. GHESQUIÈRE, et 1930 J. BREDO). Sur Cacaoyer.

Alcides dentipes OLIV. (Stanleyville 1925, J. GHESQUIÈRE). Sur Haricot.

2. Hémiptères *Miridae* :

Helopeltis Maynei GHESQ. (Dingila, Uélé 1932, J. VRYDAGH), espèce ombrophile, ainsi que l'a déjà constaté l'auteur de cette communication à l'Equateur, il y a quelques années.

— M. F. GUILLEAUME signale la découverte d'*Omalium validum* KRAATZ Belg. nov. sp., 1 ex. dans la collection du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, Grotte de Rochefort, 24 mai 1916 (SEVERIN); 2 ex., Menil-Favay (Hotton), sur des concrétions humides dans une petite grotte fréquentée par des blaireaux, 8 mai 1932 (R. LERUTH). D'après EVERTS, cette espèce a également été trouvée en Hollande à l'entrée de différentes grottes. Elle habite aussi les nids de bourdons, les terriers de lapins et, probablement, ceux de blaireaux. C'est un Staphilinide pholéophile typique chez lequel la réduction des yeux et la tendance à une diminution de la pigmentation constituent des caractères d'adaptation à un habitat privé de lumière.

— La séance est levée à 17 heures 40.

Liste d'Hémiptères intéressants

POUR NOTRE FAUNE

PAR

G. VREURICK

408. *Rubiconia intermedia* WLF. — Wellin, 5-9-32 (VREURICK).

807. *Liorhyssus hyalinus* F. — Laeken, 23-5-26 (VREURICK).

809. *Corizus maculatus* FIEB. — Hérenthals, 11-5-32 (DE RUETTE).

1336. *Drymus pilicornis* MLS. — Wellin, 9-32 (VREURICK).

1456. *Acalypta musci* var :

ditata PUT. — Wellin, 9-32 (VREURICK).

1592. *Catoplatus flavipes* HOW. — Wellin, 3-9-32 (VREURICK).

2474. *Alloeotomus gothicus* FALL. — Beverloo, 16-8-32 (DE RUETTE).

2527. *Bothynotus pilosus* BOH. — ♀ Wellin, 8-32 (F. GUILLEAUME).

2824. *Onychumenus decolor* FALL. — Sy., 24-7-31 (P. MARÉCHAL).

3832. *Macropsis microcephala* (H. S.) — Wellin, 4-9-32 (VREURICK).

3936. *Strongylocephalus agrestis* FALL. — Eppegem, 4-10-25 (VREURICK).

4008. *Deltocephalus socialis* FL. — Verlée, 14-8-32 (P. MARÉCHAL).

4315. *Thamnotettix frontalis* (H. S.). — Groenendael, 21-9-32 (VREURICK).

4735. *Kelisia vittipennis* J. SAHLB. — Verlée, 14-8-32 (P. MARÉCHAL).

4754. *Eurya lurida* FIEB. — La Panne, 26-7-31 (VREURICK).

4765. *Delphax pellucida* F. — Waha, 22-8-30 (P. MARÉCHAL).

4822. *Delphax spinosa* FIEB. — Loën, 27-4-30, R. (LERUTH).

5060. *Tettigometra impressopunctata* DUF. — Wellin, 3-9-32 (VREURICK).

Nous devons à la bonne obligeance de M. le Docteur RIBAUT, Professeur à l'Université de Toulouse, la détermination de ces insectes. Nous le prions de recevoir ici, tous nos plus vifs remerciements. Les numéros en marge sont ceux du catalogue de M. OSHANIN.