

ADDITIONS
AU
Catalogue des Coléoptères de Belgique

PAR
G. FAGEL

- Tachinus fimetarius* FAB. — Droogenbosch, 31 mars 1934, un exemplaire.
- Bryocharis analis* FAB. — Forest, 24 mars 1927, un exemplaire et Forest, 27 mars 1934, un exemplaire.
- Lesteva fontinalis* KSWT. — Java lez Bas-Oha, septembre 1924, un exemplaire.
- Nitidula flavomaculata* ROSSI, **Belg. nov. sp.** — Forest, août 1925, sept exemplaires.
Cette espèce n'était pas prévue pour notre faune. Elle a été capturée en Silésie et est répandue dans la zone méditerranéenne.
- Sclerophaedon carniolicus* GERM., **Belg. nov. sp.** — Java lez Bas-Oha, septembre 1924, cinq exemplaires.
Espèce connue de Rhénanie, Westphalie et Nassau.
- Ochrosis ventralis* ILLIG. — Java lez Bas-Oha, septembre 1924, trois exemplaires.
- Phyllotreta consobrina* GURTIS. — Java lez Bas-Oha, septembre 1924, deux exemplaires.
- Oxystoma ochropus* GERM. — Java lez Bas-Oha, septembre 1924, quatre exemplaires.
- Apion flavofemoratum* HST. — Java lez Bas-Oha, septembre 1924, trois exemplaires.
- Apion laevigatum* PAYK. — Jauchette lez Jodoigne, juillet 1926, deux exemplaires.
- Apion penetrans* GERM. — Java lez Bas-Oha, septembre 1924, deux exemplaires.
- Apion colombinum* GERM. — Java lez Bas-Oha, septembre 1924, quatre exemplaires.
- Apion platalea* GERM. — Java lez Bas-Oha, septembre 1924, trois exemplaires.
- Apion pavidum* GERM. — Furfooz, mai 1924, trois exemplaires.

Notes sur l'entomofaune indochinoise
IV. — Une nouvelle *Climaciella* du Tonkin
(*Climaciella Leopoldi*)

ET
Remarques sur le rôle des Mantispides
en phytopathologie

PAR
J. A. LESTAGE

I. — Introduction

L'unique exemplaire que j'ai étudié fait partie d'un lot capturé par M. NANTA, Directeur du laboratoire d'entomologie (section de phytopathologie) de la Station expérimentale de Phu-Ho, au Tonkin. Ce matériel trop restreint ne me permet pas d'affirmer si tout ce que je dirai de ce spécimen, au point de vue de la coloration et de la nervation, se retrouvera en entier chez tous les autres exemplaires.

KUWAYAMA SATORU (1) a publié, en 1925, une étude critique sur la variabilité spécifique des Mantispides, variabilité qui frappe la taille, la coloration, la nervation, et même certains caractères sexuels secondaires, au point que les deux sexes d'une même espèce furent attribués parfois à deux espèces et même à deux genres différents.

Pour plus ample certitude, j'ai communiqué mon exemplaire à mon excellent ami le P. NAVAS, l'auteur le mieux informé, pour le comparer aux espèces voisines et surtout à *Climaciella Lacolombierei*, forme chinoise récemment décrite par lui et appartenant au Musée Heude, à Changhaï (2). Le savant spécialiste m'a assuré que les deux espèces étaient bien différentes. Je l'en remercie cordialement.

(1) KUWAYAMA. — Notes on the Japanese *Mantispidae*, with special Reference to the morphological characters. (*Journ. Coll. Agric. Hokkaido Univ., Sapporo*, XV, 4, 1925).

(2) NAVAS. — Névroptères, et Insectes voisins, de la Chine et pays environnants. (*Notes d'entom. chin., Musée Heude, fasc. VII, 1931, p. 3*).