

Liste de Coléoptères intéressants

PAR

G. VREURICK ET F. GUILLEAUME

- Atheta complana* MAN. — Tervueren, 16-4-26 (VREURICK); Wellin, 7-34 (F. GUILLEAUME). **Belg. nov. sp. ?**
- Atheta tomlii* JOY. — Nieuport, 16 9-29 (VREURICK). Cette détermination devrait être corroborée par l'examen de nouvelles captures. Cette espèce a été recueillie en un seul exemplaire en Hollande. **Belg. nov. sp. ?**
- Atheta mallens* JOY. — Forest, 7-3-29 (VREURICK). N'a pas encore été recueillie en Hollande. **Belg. nov. sp.**
- Atheta nigripes* THS. — Wellin, 9-33 (F. GUILLEAUME).
- Atheta aquatica* THS. — Jette, 24-8-21 (VREURICK).
- Atheta oblonga* ER. — Uccle, 15-3-33 (VREURICK).
- Atheta gagatina* BAUD. — Wellin, 6-33 (VREURICK).
- Atheta laticeps* THS. — Genval (BONDROIT). **Belg. nov. sp.**
- Leptusa angusta* AUBÉ. — Groenendael, 1-8-19 (BONDROIT).
- Aleochara moerens* GYLL. — Rhonet, 19-10-09 (VREURICK).
- Aleochara haemoptera* KR. — Jette, 7-5-24 (VREURICK).
- Aleochara sanguinea* LIN. — Jauchelette, 19/26-6-27 (G. FAGEL).
- Catops grandicollis* ER. — Wellin, 9-32 (VREURICK).
- Maltinus bilineatus* KIESW. — Wellin, 7-34 (F. GUILLEAUME). **Belg. nov. sp.** Cet insecte est exclusivement connu de France méridionale et Jura (Dôle).

Ces déterminations ont été faites ou confirmées par MM. les Docteurs VANDERWIEL d'Amsterdam et WUSTHOFF d'Aix-la-Chapelle. Nous les en remercions bien sincèrement.

Eucnemididae et *Elateridae* nouveaux

PAR

E. FLEUTIAUX

EUCNEMIDIDAE

Melanocoleus BONVOULOIR, 1871-1872

Génotype : *M. grossus* BONVOULOIR

M. imuganus n. sp. — 10 1/2 à 12 mm. Allongé, atténué; noir opaque, moins foncé sur le dos des élytres, côtés du pronotum et base des élytres roux; pubescence rousse sur la tête, de la couleur du fond sur le reste du corps. Tête convexe, finement et densément ponctuée; carène interoculaire interrompue au milieu; épistome plus étroit à la base que l'espace susantennaire. Antennes filiformes, dépassant peu les angles postérieurs du pronotum, rousses, noires à la base. Pronotum plus long que large, peu rétréci en avant, convexe, déprimé en arrière; noir au milieu largement roux sur les côtés; finement, uniformément et densément ponctué. Elytres très atténués de la base au sommet, finement ponctués, non striés, à peine distinctement en arrière. Dessous finement ponctué; pubescence rousse. Prosternum roux, bordé de noir en arrière, pointe prosternale et reste du corps noirs. Episternes métathoraciques parallèles. Epimères visibles. Hanches postérieures anguleuses, à peu près aussi larges en dehors que les épisternes. Dernier arceau ventral tronqué. Pattes grêles, noirâtres; tarses postérieurs aussi longs que le tibia; griffes dentées.

Luzon, Imugan. Ma collection.

Aspect d'un *Fornax*. Beaucoup plus étroit que *M. grossus* BONVOULOIR; pronotum plus long, nullement globuleux; élytres moins convexes, très atténués, non striés; pointe prosternale sur le même plan que le prosternum; hanches postérieures plus nettement anguleuses; dernier arceau ventral tronqué.

ELATERIDAE

Lacon CASTELNAU, 1836

Adelocera LATREILLE 1834 (non 1829)Génotype : *Elater atomarius* FABRICIUS

L. novus n. sp. — 9 mm. Ellipsoïdal, allongé ; brun peu brillant ; pubescence squamiforme jaune, assez longue sur la tête, le pronotum et la base des élytres, courte en arrière. Tête sillonnée au milieu, fortement déprimée en avant ; ponctuation forte et dense. Antennes brunes, rougeâtres vers le bout. Pronotum plus long que large, rétréci en avant, arrondi aux angles antérieurs, sinué sur les côtés en arrière, convexe sur le dos, déclive sur le tiers postérieur ; ponctuation forte et peu serrée ; angles postérieurs courts, divergents. Elytres faiblement arrondis et atténués, non striés, mais couverts de points égaux sans ordre sur le milieu, alignés longitudinalement vers l'extrémité. Dessous également brun. Pattes moins foncées.

Luzon, Mont-Banahao. Ma collection.

Petite espèce plus étroite que *L. philippinus* FLEUTIAUX ; brun foncé. Pronotum relativement plus long moins arrondi sur les côtés et moins convexe.

L. incommodus n. sp. — 15 mm. Ellipsoïdal, allongé ; brun noirâtre peu brillant ; pubescence jaune, plus longue sur la tête et le pronotum. Tête déprimée en avant, fortement ponctuée. Antennes brun rougeâtre. Pronotum un peu plus long que large, arrondi sur les côtés et rétréci en avant, assez convexe, faiblement sillonné en arrière, fortement et densément ponctué ; angles postérieurs courts, légèrement divergents. Elytres arrondis sur les côtés et atténués dans la seconde moitié, aplatis sur le dos, striés de gros points en rangées régulières et dans les intervalles de points plus fins. Dessous de même couleur. Pattes moins foncées.

Mindanao, Davao (BAKER). Ma collection.

Plus grand et plus large que *L. novus* ; pronotum plus arrondi sur les côtés et plus convexe sur le dos ; élytres aplatis en dessus, ponctuation plus forte, en rangées régulières avec des points moins gros dans les intervalles.

Adelocera LATREILLE, 1829Génotype : *Elater ovalis* GERMAR.

A. Mac-Gregori n. sp. — 15 mm. Étroit ; noir peu brillant ; pubescence grise formant des marbrures un peu moins rapprochées

sur les élytres. Tête déprimée en avant, densément ponctuée. Antennes brunes à la base, testacées vers le bout. Pronotum plus long que large, sinué sur les côtés, brusquement rétréci près des angles antérieurs, peu convexe, fortement et densément ponctué ; angles antérieurs saillants et obtus ; postérieurs larges, divergents et arrondis. Elytres plus larges que le pronotum, longs, graduellement rétrécis en arrière et arrondis au sommet, striés de gros points en rangées régulières, intervalles rugueux. Dessous de même couleur ; pubescence jaune régulière. Pattes brunes ; tarses plus clairs.

Philippines : Panay (R. C. MAC GREGOR). Ma collection.

Rappelle pour la forme *A. truncata* HERBST. ; mais l'absence de sillons tarsaux sur les propleures et sur le métasternum, le place dans le sous-genre *Archontas* GOZIS. Pour cette raison il faut le ranger près de *A. colonica* CANDÈZE ; plus étroit ; tête moins largement déprimée au milieu ; pronotum plus long que larges ; élytres plus larges que le pronotum.

Brachylacon MOTSCHULSKY, 1858Génotype : *B. microcephalus* MOTSCHULSKY

B. oblongus n. sp. — 6 1/2 mm. Oblong ; brun plus clair sur les bords latéraux du pronotum et des élytres ; pubescence jaune pâle, squamules des élytres plus courtes et parfois brunes. Tête plate fortement et densément ponctuée. Antennes testacées, premier article brun. Pronotum aussi long que large, parallèle en arrière, arrondi dans le quart antérieur, convexe, notablement déclive dans la moitié postérieure ; ponctuation forte, peu serrée ; bords externes tranchants ; angles postérieurs droits, aigus, aplatis. Elytres aussi larges que le pronotum, très légèrement élargis jusqu'à la moitié, arrondis postérieurement, convexes, couverts de rangées rapprochées de points moins gros que ceux du pronotum. Dessous brun ; pubescence courte. Pattes testacées.

Manille. Ma collection.

Plus grand et plus allongé que *B. microcephalus* MOTSCHULSKY ; pubescence ne formant pas de fascies.

Simodactylus CANDÈZE, 1859Génotype : *Aeolus cinnomomeus* BOISDUVAL

S. luzonicus n. sp. — 16 à 18 1/2 mm. Allongé ; brillant, jaune, tête et écusson noirs, une bande médiane sur le pronotum rétrécie en arrière, également noire ; pubescence jaune très légère.

Tête peu convexe fortement et densément ponctuée; pubescence noire. Antennes noires, ne dépassant pas les angles postérieurs du pronotum; serriformes; 3^e article égal au suivant et de même forme. Pronotum plus long que large, graduellement rétréci en avant, peu convexe, sillonné au milieu en arrière; ponctuation fine et espacée; limites latérales entières; angles postérieurs longs, aigus, bicarénés, faiblement divergents. Elytres graduellement rétrécis, faiblement arrondis sur les côtés, déhiscent au sommet et terminés en épine, peu convexes, striés-ponctués; interstries finement pointillés. Dessous brillant. Propectus jaune avec la pointe prosternale noire et effilée; ponctuation peu serrée. Arrière-corps noir; ponctuation plus fine et peu serrée; dernier arceau ventral testacé à l'extrémité. Pattes noires.

Luzon, Mont Banahao. Ma collection et Experiment Station, Honolulu.

Aspect plus brillant que *S. suturalis* SCHWARZ, jaune plus pâle; tête noire; élytres unicolores et divariqués au sommet; dessous de l'arrière-corps entièrement noir.

S. philippinensis n. sp. — 18 mm. Allongé; jaune brillant, tête écusson et suture des élytres jusqu'au tiers postérieur noirs; pubescence légère, noire sur la tête, jaune sur le reste du corps. Tête peu convexe; ponctuation forte, moins serrée sur le milieu. Antennes noires, n'atteignant pas les angles postérieurs du pronotum, serriformes; 3^e article un peu plus long que le suivant et de même forme. Pronotum plus long que large, graduellement rétréci en avant, peu convexe; ponctuation fine et écartée; limites latérales entières; angles postérieurs aigus, bicarénés. Elytres graduellement rétrécis, faiblement arrondis sur les côtés, déhiscent au sommet et terminés en épine, peu convexes, légèrement ponctués-striés, très finement vers le bout; interstries très finement pointillés; la bande noire suturale occupe à la base les deux premiers interstries, se rétrécit graduellement pour se terminer au dernier tiers. Dessous brillant; pubescence très légère, de la couleur du fond. Propectus jaune avec la pointe prosternale effilée. Arrière-corps plus finement ponctué, noir avec le sommet du dernier arceau ventral testacé. Pattes noires.

Mindanao, Surigao (BAKER). Ma collection.

Plus grand que *S. luzonicus*; pronotum entièrement jaune; non sillonné au milieu en arrière; suture des élytres noire jusqu'au tiers postérieur, stries plus légères; quatrième article des tarses largement dilaté.

S. pallidus n. sp. — 14 mm. Allongé; entièrement jaune pâle,

assez brillant; pubescence de même couleur. Tête aplatie, déprimée sur le bord antérieur; celui-ci largement arrondi et brunâtre; ponctuation assez serrée. Antennes ne dépassant pas les angles postérieurs du pronotum, légèrement serriformes; 3^e article presque égal au suivant. Pronotum un peu plus long que large, graduellement rétréci en avant, peu convexe, sillonné au milieu en arrière; ponctuation moins grosse que sur la tête et moins serrée; limites latérales entières; angles postérieurs aigus, divergents, bicarénés. Elytres légèrement arqués sur les côtés et rétrécis au-delà de la moitié, brièvement tronqués au sommet, peu convexes, ponctués-striés; interstries pointillés. Dessous de même couleur. Pattes plus pâles.

Iles Mariannes. Ma collection.

Diffère de *S. tasmani* CANDÈZE, par sa couleur uniformément jaune pâle et la ponctuation du pronotum et des élytres plus légère.

Melanoxanthus (ESCHSCHOLTZ) CASTELNAU, 1836

Génotype: *Elater melanocephalus* FABRICIUS

M. grandis n. sp. — 16 1/2 mm. Allongé, étroit; pubescence jaune. Tête noire, un peu rougeâtre en avant, peu convexe, impressionnée au milieu, finement et densément ponctuée. Antennes noires, n'atteignant pas le sommet des angles postérieurs du pronotum, sub-filiformes; 3^e article plus long que le 2^e et plus court que le 4^e. Pronotum notablement plus long que large, rétréci en avant, presque droit sur les côtés, peu convexe, brusquement déclive près de la base; brun, plus clair sur le bord antérieur; ponctuation fine et serrée; limites latérales entières; angles postérieurs noirs, longs, aigus, légèrement divergents, bicarénés. Elytres plus larges que le pronotum, longs, atténués, notablement échancrés au sommet; noirs, jaunes à la base; striés-ponctués; interstries pointillés. Ponctuation fine et serrée en dessous; pubescence jaune. Propleures jaunes, noirs à la base, brunâtres sur le côté en avant. Prosternum noir. Arrière-corps jaune, brun-noirâtre sur le milieu. Hanches postérieures étroites, à peine plus larges en dedans qu'en dehors. Pattes grêles, noirâtres.

Luzon. Bacio. Ma collection.

Grande espèce voisine de *M. promecus* CANDÈZE; moins brillant; pubescence jaune plus apparente; antennes à peine comprimées; pronotum brun, plus rétréci en avant; élytres jaunes à la base; prosternum noir; arrière-corps jaune, brun noirâtre sur le milieu, hanches postérieures plus étroites.

M. ornatus n. sp. — 4 mm. Ellipsoïdal; noir, pronotum ferru-

gineux, élytres avec une tache jaune au milieu de la base, une bande transversale au premier tiers ne touchant ni la suture ni le bord externe, et une tache ronde au milieu, avant l'extrémité; pubescence de la couleur du fond. Tête convexe, bord antérieur arrondi et rebordé; ponctuation forte, régulière et serrée. Antennes n'atteignant pas la base du prothorax, noires, avec les trois premiers articles ferrugineux; 2^e et 3^e égaux plus étroits que les autres; suivants beaucoup plus longs, comprimés et graduellement épaissis vers le bout. Pronotum ample, plus long que large, arqué sur les côtés et rétréci en avant, convexe, brusquement déclive à la base; ponctuation très régulière, très serrée, peu profonde; limites latérales entières; angles postérieurs grands, aigus, carénés. Elytres graduellement atténués, subtronqués au sommet, convexes, brillants, rugueux, fortement striés-ponctués. Dessous noir; ponctuation serrée, assez forte sur le prosternum, un peu moins sur le métasternum, fine sur l'abdomen. Propleures jaunes; ponctuation espacée, effacée en arrière. Pattes jaunes.

Luzon: Imugan, Mont Banahao. Ma collection et Experiment Station, Honolulu. Luzon: Mont Limay; Mindanao, Davao; île Sibuyan (BAKER). Ma collection.

Ressemble beaucoup à *M. decemmaculatus* CANDEZE; le pronotum est roux avec les angles postérieurs plus pâles et quelquefois deux bandes longitudinales obscures sur le dos; les deux taches submédianes des élytres sont remplacées par une bande transversale, les propleures entièrement jaunes.

Megapenthes KIESENWETTER, 1858

Génotype: *Elater lugens* REDTENBACHER

M. Bakeri n. sp. — 6 à 8 1/2 mm. Oblong; noir peu brillant; bord antérieur de la tête jaune, ainsi que les angles antérieurs et la base du pronotum, élytres ornés d'une bande médiane jaune occupant les 2^e, 3^e, 4^e et 5^e interstries jusqu'au premier tiers, d'une tache allongée correspondante sur le bord externe et d'une autre, également sur le bord externe, occupant le dernier tiers; pubescence jaune légère. Tête convexe, ponctuation ombiliquée, serrée. Antennes testacées, ne dépassant pas la base du prothorax, subfiliformes; 3^e article plus long que le 2^e et un peu moins que le 4^e. Pronotum plus long que large, arqué sur les côtés, peu rétréci en avant, convexe, fortement déclive à la base; ponctuation plus nette que sur la tête et également serrée, un peu rugueuse sur les côtés; limites latérales entières; angles postérieurs aigus, non divergents, unicarénés.

Elytres parallèles jusqu'au delà de la moitié, rétrécis ensuite et conjointement arrondis à l'extrémité, convexes, fortement striés-ponctués; interstries rugueux. Propectus jaune; arrière-corps brun. Pattes testacées.

Mindanao: Kolambugan, île Samar. (BAKER). Ma collection.

Très variable pour le dessin; les taches jaunes sont plus ou moins confuses et certains exemplaires deviennent presque entièrement jaunes. Sa place est dans le voisinage de *M. lacer* SCHWARZ qui présente un peu le même aspect comme dessin; mais chez *M. Bakeri* le 3^e article des antennes est nettement plus court que le 4^e et les angles postérieurs du pronotum unicarénés. Ressemble aussi à *M. sexmaculatus* CANDEZE.

Odontocardus FLEUTIAUX, 1932

Génotype: *Cardiotarsus Vitalisi* FLEUTIAUX

O. Zwaluwenburgi n. sp. — 9 mm. Oblong; brun-noirâtre; pubescence jaune. Tête presque plate, finement et densément ponctuée. Antennes brun pâle. Pronotum à peine plus long que large, régulièrement arqué sur les côtés, légèrement plus étroit en avant qu'en arrière, convexe; ponctuation fine, égale et serrée; sillons basilaires presque nuls; angles postérieurs courts, comprimés, non divergents; limites latérales inférieures effacées en avant. Elytres arqués sur les côtés, fortement striés-ponctués; interstries plats sur le dos, à ponctuation très fine et espacée. Dessous noir, très finement et densément ponctué. Pattes brun pâle.

Mindanao, Surigao. Ma collection.

Plus petit que *O. Vitalisi* FLEUTIAUX; pronotum moins arrondi sur les côtés, ponctuation uniforme, plus fine, très serrée, non rugueuse.

Agonischius CANDEZE, 1863

Génotype: *A. pectoralis* CANDEZE

A. nigerrimus n. sp. — 7 à 7 1/2 mm. Allongé, fusiforme; entièrement noir brillant; pubescence noire en dessus, grise en dessous. Tête convexe, grossièrement ponctuée. Antennes noires, fortes, dépassant la base du prothorax, seriformes, élargies vers le bout. Pronotum aussi long que large à la base, trapézoïdal, convexe, brusquement déclive en arrière; ponctuation assez forte et peu serrée en avant, moins grosse et écartée sur le dos, effacée en arrière; angles postérieurs courts. Elytres un peu plus larges que le pronotum,

graduellement atténués de la base au sommet, conjointement arrondis à l'extrémité, convexes, non striés, mais avec des lignes irrégulières de points très légers. Pattes noires.

Luzon, Imugan. Ma collection et Experiment Station, Honolulu.

Appartient au groupe du génotype *A. pectoralis* CANDEZE. Même forme que *A. basalis* et *A. bilaterus* CANDEZE, mais entièrement noir.

New species of *Staphylinidae* (Col.)

FROM THE CONGO AND SIERRA LEONE

BY

MALCOLM CAMERON, M. B., R. N., F. R. E. S.

OXYTELINAE

Eleusis lunduensis sp. n.

Shining, black, the elytra obscurely and indeterminately reddish-brown along the suture. Antennae ferruginous red. Legs reddish-yellow, the femora pitchy. Length: 6 mm.

Size and build of *motoensis* BERNH. but differs in the more obscurely coloured elytra, the colour of the antennae which however are similarly constructed and the very fine uniform ground sculpture of the fore-parts. Head a little broader than long, feebly rounded behind the small eyes, quadrate, flat, extremely finely, not closely punctured, the ground sculpture very fine, uniform and longitudinal except in front and at the base where it is more or less transverse. Penultimate joints of the antennae slightly transverse. Thorax transverse, the sides parallel for about the anterior 2/3rds, then retracted and furnished with a distinct tooth, along the middle with very fine smooth line, the puncturation and ground sculpture as on the head. Elytra longer than the thorax (7 : 5) with similar ground sculpture but more sparing puncturation.

Mayumbe : Lundu, 11-VII-26.

PAEDERINAE

Medon leonensis sp. n.

Depressed, dull, black, the elytra and abdomen greasy lustrous the latter pitchy-black. Antennae yellowish-red, the first four or five joints sometimes partly pitchy. Legs yellowish-red. Length: 5 mm.