

longuement dépassée; les autres nervures presque invisibles (les exemplaires sont conservés dans l'alcool); extrémité de $r_4 + s$ atteignant le




Fig. 1. — Adulte ♀.

Fig. 2. — Palpe.

Fig. 3. — Antenne.

milieu du bord antérieur de l'aile, qui est nue, non ponctuée et beaucoup plus courte que l'abdomen.

Diffère de *S. brevipennis* HOLMGR. par les ailes qui sont hyalines au lieu d'être enfumées et par les pattes qui sont jaunâtres au lieu d'être brunes.

2 exemplaires ♀ ♀ trouvés à Chaudfontaine, le 30 juin 1934.

Catalogue des Chironomides de Belgique

PAR

M. GOETGHEBUER

V. — CHIRONOMINAE

Tribu des *Chironomini*

GENRE *DOLICHOPELMA* KIEFFER.

pusillum KIEFF. — *Ent. Mitt.*, VII, p. 36 (1918).

Les exemplaires capturés en Belgique appartiennent à la variété *nigriventris* GTGH. (*Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXIII, p. 210 [1933]).

GENRE *PSEUDOCHIRONOMUS* MALLOCH.

prasinalis STAEG. — *Kröj. Tidsk.* II, 568, 26 (1836).

Syn. *ploenensis* KIEFF.

Overmeire, Heide (Anv.), Genck, Postel.

GENRE *STICTOCHIRONOMUS* KIEFFER.

maculipennis MEIG. — *Syst. Besch.*, I, 38, 38 (1818).

Virton.

pictulus MEIG. — *Syst. Besch.*, VI, 244 (1830).

Virton.

histrio FAB. — *Ent. Syst.*, IV, 244, 51 (*Tipula*) (1794).

Postel (SÉVERIN), Mont-St-Guibert.

GENRE *ZAVRELIELLA* KIEFF.

marmoratus V. D. WULP. — *Tijds. v. Ent.*, II, 9 (sine descr.), 166, 7 (1858).

Syn. *flexilis* BAUSE. (? LIN.), *clavatricrus* KIEFF.

Heusden, Virton.

GENRE *MICROTENDIPES* KIEFF.

- tarsalis* WALK. — *Inst. brit.*, III, 170, 176 (1856).
 Syn. *formosus* GOETGH.
 St-Job, Rouge-Cloître, Linkebeek, Houyet, Buzenol, Virton.
confinis MEIG. — *Syst. Besch.*, VI, 253, 104 (1830).
 Syn. *zonarius*, *perreptans*, *lentulus*, *obvertus*, *separatus* WALK.,
pseudopedellus GOETGH.
chloris MEIG. — *Syst. Besch.*, I, 28, 17 (1818).
 Syn. *discrepans* WALK.; ? *abbreviatus* KIEFF.
 Destelbergen, Heusden.
 Var. *lividus* MEIG. (*Syst. Besch.*, VI, 246, 82 [1830]) (*cinerei-*
ventris GOETGH.).
 Virton, Heusden.
pedellus DEG. — *Ins.*, VI, 146, 17 (1776).
 Syn. *cantans* HUB., *littoralis* SCHR.
 Gand, Destelbergen, Overmeire, Bellem, La Panne, Falaën,
 Habay-la-Neuve, Virton, Chiny, Florenville.

GENRE *POLYPEDILUM* KIEFF.

- albicorne* MEIG. — *Syst. Besch.*, VII, 6, 130 (1838).
 Syn. *pullum* (ZETT.) GOETGH.
 Hockai, Virton.
arundineti GOETH. — *Mém. Mus. Hist. nat. Belg.*, XXXI, p. 139
 (1921).
 La Panne, Destelbergen.
convictum WALK. — *Ins. brit.*, III, 161, 37 (1856).
 Syn. *blandum* V. D. W.; *nympha* KIEFF.
 La Panne, Falaën, Chiny, Florenville, Virton.
maculipes GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXIII, p. 209
 (1933).
 Sy.
cultellatum GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXI, p. 212,
 (1931).
 La Panne, Heusden.
acutum KIEFF. — *Broteria*, XIII, p. 82 (1913).
 Heusden.
nubeculosum MEIG. — *Syst. Besch.*, I, 37, 57 (1818).
 Syn. *enotatum* WALK.; *emarginatum* KIEFF.
 Gand, Destelbergen, Heusden, Bruges (BEQUAERT).

- pedestre* MEIG. — *Syst. Besch.*, VI, 246, 81 (1830).
 Syn. ? *fuscipennis* MEIG.; *pictipes* ZETT.; *palens* WALK.
 Mont-St-Guibert, Grimbergen, Houyet, Falaën, Yvoir, Eprave,
 Thuin, Virton.
scalaenum SCHRANK. — *Faun. boica*, III, 23, 24 (*Tipula*) (1803).
 Gand, Overmeire, Destelbergen, Uccle, Houyet, Chiny, Virton.
quadrinaculatum MEIG. — *Syst. Besch.*, VII, 10, 142 (1838).
 Virton.
laetum MEIG. — *Syst. Besch.*, I, 38, 39 (1818).
 Syn. *nubilipenne* MEIG., *falcigerum* KIEFF.
 Mont-St-Guibert, Virton.

GENRE *KRIBIOXENUS* KIEFF.

- Brayi* GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. nat. Belg.*, XXXI, p. 133
 (1921).
 Virton, Chiny.

GENRE *PARATENDIPES* KIEFF.

- albimanus* MEIG. — *Syst. Besch.*, I, 40, 45 (1818).
 Gand, Nukerke, Linkebeek, Mont-St-Guibert, Houyet, Chiny,
 Virton.
plebejus MEIG. — *Syst. Besch.*, I, 40, 44 (1818).
 Mont-St-Guibert, Virton.

GENRE *STENOCHIRONOMUS* KIEFF.

- gibbus* FAB. — *Ent. Syst.*, IV, 245, 54 (*Tipula*) (1794).
 Syn. *flexilis* AUCT. nec LIN.; *fasciatus* GEOFFR.; ? *occultus*
 KIEFF.
 Gand, forêt de Soignes, Eprave (LESTAGE), Yvoir, Falaën,
 Houyet, Virton.

GENRE *ENDOCHIRONOMUS* KIEFF.

- tendens* FAB. — *Ent. Syst.*, IV, 243, 47 (*Tipula*) (1794).
 Syn. *trichopus* WALK.; *nymphoides* KIEFF.; *xantholabis* KIEFF.
 La Panne, Gand, Destelbergen Heusden, Overmeire.
dispar MEIG. — *Syst. Besch.*, VI, 247, 85 (1830).
 Syn. *flavicoxis* KIEFF.
 Gand, Destelbergen, Heusden, Overmeire, Bellém, Hockai,
 Chiny.

albipennis MEIG. — *Syst. Besch.*, VI, 248, 87 (1830).

Destelbergen, Overmeire.

lepidus MEIG. — *Syst. Besch.*, VI, 247, 83 (1830).

Syn. *notabilis* MACQU. ; *brevimanus* KIEFF.

Overmeire.

intextus WALK. — *Ins. brit.*, III, 176, 104 (1855).

Syn. *coracellus* KIEFF.

Overmeire.

GENRE *DEMEIJREA* KRUSEMAN.

rufipes LIN. — *Faun. suec. Ed.*, II, 439, 1778 (*Tipula*) (1761).

Syn. *bifasciatus* MEIG. ; *pulcher* ZETT.

Gand, Destelbergen, Herstaël (GÉRARD), forêt de Soignes (LESTAGE).

GENRE *GLYPTOTENDIPES* KIEFFER.

Le type du genre est *Gl. sigillatus* KIEFF. qui est probablement synonyme de *foliicola* KIEFF. Ce genre se subdivise en 2 sous-genres :

Espèces robustes : impressions dites " en raquette " présentes sur les tergites 2-6, celle du 6^e segment très allongée, atteignant environ la moitié du tergite ; antennes ♀ de 7 articles . . .

. . . s. g. *Phytotendipes* nov.

Espèces moins robustes : impressions " en raquette " présentes seulement sur les tergites 3-6, celle du 6^e segment pas beaucoup plus longue que les autres, ou bien impressions nulles ; antennes ♀ de 6 articles s. g. *Glyptotendipes* s. str.

SOUS-GENRE *PHYTOTENDIPES* nov.

paripes EDW. — *Trans. of the Ent. Soc. of Lond.*, p. 392 (1929).

Syn. ? *tristis* V. D. W. ; ? *hypogaeus* KIEFF. ; *subglaucus* GOETGH.

La Panne, Postel (SÉVERIN).

pallens MEIG. (KRUSEM.). — *Syst. Besch.*, I, 22, 5 (1818).]

Syn. *obscuripes* MEIG. ; *fossicola* KIEFF. ; *ripicola* KIEFF. ; *longifilis* KIEFF. ; *stagnicola* KIEFF.

Type inconnu de Belgique.

var. *glaucus* MEIG. — *Sept. Besch.*, I, 27, 14 (Lobules frontaux absents).

Syn. *nudifrons* KIEFF. ; *brevifilis* KIEFF. ; *abstrusus* KIEFF. ; *norde-nayanus* KIEFF.

La Panne, Gand, Destelbergen, Knocke, Overmeire, Postel, Thuin.

Griepkoveni KIEFF. — *Bull. Soc. Hist. nat. Metz*, p. 22 (1913).

La Panne, Knocke, Heusden, Destelbergen, Overmeire, Genck.

var. *gracilis* KIEFF. — *Ent. Mitteil.*, VII, p. 95 (1918). (Lobules frontaux présents).

Heusden, Destelbergen, Overmeire.

SOUS-GENRE *GLYPTOTENDIPES* s. str.

foliicola KIEFF. — *Ent. Mitteil.*, VII, p. 95 (1918).

Syn. *niveipennis* KIEFF. nec ZETT. ; ? *sigillatus* KIEFF.

Gand, Destelbergen, Heusden, Bellem, Hockai.

caulicola KIEFF. — *Bull. Soc. Hist. nat. Metz*, p. 23 (1913).

Heusden, Destelbergen,

viridis MACQU. — *Hist. nat. Dipt.*, I, 52, 21 (1834).

Syn. *leucoceras* KIEFF.

Gand, Destelbergen, Heusden.

annulimanus GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. nat. Belg.*, 31, p. 175 (1921).

Laethem-St-Martin.

severini GOETGH. — *Ann. biol. lac.*, XII, p. 115 (1922).

Syn. ? *imbecillis* WALK. ; ? *fulvofasciatus* KIEFF. ; *viridis* V. D.

W. nec SCHINER.

Heusden, Postel (SÉVERIN).

varipes GOETGH. — *Ann. biol. lac.*, XV, p. 98 (*Phytochironomus*) (1927).

Bellem.

GENRE *TRICHOCHIRONOMUS* GOETGHEBUER.

signaticollis GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. nat. Belg.*, VIII, p. 140 (1921).

Gand.

GENRE *CHIRONOMUS* MEIGEN.

Syn. *Tendipes* MEIG.

SOUS-GENRE *LIMNOCHIRONOMUS* KIEFFER.

notatus MEIG. — *Syst. Besch.*, I, 25, 11 (1818).

Syn. *nigrimanus* AUCT. nec STAEG. ; *heterolabis* KIEFF.

Gand, Mont-St-Amand, Vinderhaute, Heusden, Linkebeek, Genck.

var. *rufolineatus* GOETGH. — *Faune de France*, 18, p. 51 (1928).
Gand, Heusden, Bellem.

nervosus STAEG. — *Dipt. dan.*, 567, 25 (1839).

Syn. *brevitibialis* ZETT.; *Goetghebueri* KIEFF.; *futilis* WALCK.;
falciformis KIEFF.

Gand, Destelbergen, Heusden.

lobiger KIEFF. — *Bull. Soc. Hist. nat. Moselle*, p. 71 (1921).

Syn. *brevitibialis* KIEFF. nec. ZETT.; *miriforceps* KIEFF. (var.).

Gand, Heusden, Overmeire, Bellem.

SOUS-GENRE *XENOCHIRONOMUS*

xenolabis KIEFF. — *Arch. f. Hydrobiol.*, Suppl. II, p. 526 (1916).

Syn. *Rousseaui* GOETGH.

Heusden, Bruges (BEQUAERT, M.), Houyet, Hockai.

SOUS-GENRE *CAMPTOCHIRONOMUS* KIEFF.

tentans FAB. — *Sept. Antl.*, 38, 3 (1805).

Syn. *aprilinus* KIEFF. nec MEIG.; ? *subaprilinus* KIEFF.; *atrofasciatus* KIEFF.

La Panne, Bellem, Destelbergen, Heusden.

pallidivittatus MALLOCH. — *Bull. Illin. Stat. Labor.*, X.

La Panne, Bellem, Tronchiennes, Destelbergen.

SOUS-GENRE *CHIRONOMUS* s. str.

pilicornis FAB. — *Ent. syst.*, IV, 243, 45 (1794).

Syn. *niveipennis* FAB. nec KIEFF.; *niger* WIED. nec MACQU.;
moerens WALK.; *dalens* WALK.

Postel (SEVERIN).

plumosus LIN. — *Syst. nat. Ed.*, X, 587, 19 (*Tipula*) (1758).

Syn. *hebesens* WALK.; *fluminalis* KIEFF.; *diplosis* KIEFF.

Knocke, Gand, Destelbergen, Overmeire, Postel, Ixelles,
Bruxelles, Bullange.

var. *grandis* MEIG. — *Syst. Besch.*, I, 21, 2 (1818).

Gand, Overmeire, Nukerke.

var. *flaveolus* MEIG. — *Syst. Besch.*, I, 23, 7 (1918) (Syn. *ferrugineovittatus* ZETT.).

Gand.

aprilinus MEIG. nec KIEFF. — *Syst. Besch.*, VI, 246, 78 (1830).

Syn. *salinarius* KIEFF.

La Panne, Knocke.

dorsalis MEIG. — *Syst. Besch.*, I, 25, 10 (1818).

La Panne, Bellem, Gand, Destelbergen, Heusden, Melle, Oostacker, Nukerke, Bruxelles, Postel, Falaën, Houyet, Sy, Hockai, Butgenbach, Bullange, Virton.

var. *atrolineatus* GOETGH. — *Faune de France*, XVIII, p. 65 (1928).

Hockai.

var. *viridicollis* V. D. W. — *Tydsch. v. Ent.*, II, 161, 2 (1858).

Diepenbeck.

var. *riparius* MEIG. — *Klass.*, I, 13, 6 (1803) (Syn. *rubriparius* KIEFF., *curtibarba* KIEFF.; *annularius* MACQU.; ? *viridipes* MACQU.; *helochares* KIEFF.).

Gand, Destelbergen, Heusden, Melle, Lembeke, Linkebeek, Thuin, Butgenbach.

Thummi KIEFF. — *Bull. Soc. Hist. nat. Metz.*, p. 35 (1913).

syn. ? *gregarius* KIEFF.; *pentatomus* KIEFF.; *Meigeni* KIEFF.

Gand, Destelbergen, Heusden.

var. *griseus* GOETGH. — *Ann. d. Naturhist. Mus. in Wien*, XLVI, p. 100 (1931).

Gand, Vinderhoute.

sordidatus KIEFF. — *Bull. Soc. Hist. nat. Metz.*, p. 24 (1913).

var. *tricolor* GOETGH. (KRUSEMAN.) nec V. DE WULP, *Mém. Mus. Hist. nat. Belg.*, VII, p. 156 (1921).

corniger GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. nat. Belg.*, VIII, p. 144 (1921).
Destelbergen.

cingulatus MEIG. — *Syst. Besch.*, VI, 245, 77 (1830).

Syn. *versicolor*, *sanguineus*, *angustiforceps* KIEFF.; ? *microthrix* KIEFF.; ? *subulatus* KIEFF.

Destelbergen, Bellem, Sy.

var. *venustus* STAEG. — *Naturhist. Tidsk.*, II, 562, 8 (1839).

Gand, Thuin.

var. *rusticus* MEIG. — *Syst. Besch.*, VII, 3, 118 (1838) (Syn. *nigroviridis* MACQ.).

Bellem, Destelbergen, Heusden.

var. *nigricans* GOETH. — *Ann. biol. lac.*, XI, 98 (1927) (Syn. *longiforceps* KIEFF.).

Falaën.

var. *longistylus* GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. nat. Belg.*, VIII, p. 152 (1921).

Spa.

- annularius* MEIG. — *Syst. Besch.*, L, 21, 3 (1818).
Heusden, Magnée, Virton.
var. *intermedius* STAEG. — *Naturhist. Tidsk.*, II, 559, 3 (1839).
(Syn ? *Horni* KIEFF.).
Leysele (Fl. occ.), Bellem, Bullange.
obtusidens GOETH. — *Mém. Mus. Hist. nat. Belg.*, VIII, p. 151
(1921).
Gand, Heusden.
inermifrons GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. nat. Belg.*, VIII, p. 151
(1921).
Vinderhoute.

SOUS-GENRE *EINFELDIA* THIENEM.

- dilatata* GOETGH. — *Faune de France, Chironomariae*, XVIII, p. 67
(1928).
Syn. *pulsus* GOETGH. nec WALK.
Vinderhoute, Postel.
longipes STAEG. — *Dipt. danica*, 570, 38 (1840).
Syn. *Bequaerti* GOETGH.
Gand, Overmeire, Heusden.
paganus MEIG. — *Syst. Besch.*, VII, 7, 35 (1838).
Syn. *latidens* GOETGH.
Gand, Destelbergen, Heusden, Falaën.

SOUS-GENRE *CRYPTOCHIRONOMUS* KIEFF.

GROUPE *Cryptochironomus* s. st.

- psillacinus* MEIG. — *Syst. Besch.*, VI, 247, 84 (1830).
Syn. *armillatus* STAEG.
Virton.
albofasciatus STAEG. — *Kroj. Tidsk.*, II, 560, 28 (1840).
Syn. *biannulatus* V. D. W. nec KIEFF.
Gand, Destelbergen, Overmeire.
nigrotibialis GOETGH. — *Mém. Mus. hist. nat. Belg.*, mém. 31,
p. 157 (1921).
Gand, Virton.
denticulatus GOETGH. — *Lóc. cit.*, p. 174 (1921).
Virton.
vulneratus ZETT. — *Ins. lapp.*, 814, 28 (1840).

- Syn. *nigrimanus* STAEG.; *longicauda* GOETGH.
Overmeire, Postel, Forêt de Soignes.
supplicans MEIG. — *Syst. Besch.*, VI, 248, 86 (1830).
Syn. *chlorolobus* KIEFF.
Destelbergen.
rostratus KIEFF. — *Bull. Soc. hist. nat. Moselle*, XXIX, p. 67
(1921).
Syn. *virtunensis* GOETGH.
Virton.

GROUPE *Parachironomus* LENZ.

- longiforceps* KIEFF. — *Bull. Soc. hist. nat. Metz*, XXIX, p. 66
(1921).
Syn. *Lhoneuxi* GOETGH.
Postel; Falaën, Virton.
biannulatus STAEG. — *Dipt. dan.*, 9551, 76, (1839) (non
MACQU.).
Syn. *viridanus* RUTHE; *malceus* WALK.
Gand, Destelbergen, Overmeire, Genck.
vitiosus GOETGH. — *Mém. Mus. hist. nat. Belg.*, mém. 31, p. 162
(1921).
Bellem, Destelbergen, Overmeire, Genck.
bacilliger KIEFF. — *Bull. Soc. scient. Brux.*, XLI, p. 357 (1922).
Syn. *monochromus* GOETGH., nec V. D. W., nec KRUSEM.; *tenui-*
caudatus MALL.
Destelbergen.
arcuatus GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, mém. 31, p. 163
(1921).
Syn. ? *gracilior* KIEFF.
Destelbergen, Heusden, Overmeire, Falaën.
parilis WALK. — *Ins. brit.*, III, 161, p. 35 (1856).
Syn. *irrectitus* WALK. ♀; *mucronatus* GOETGH.
Gand, Destelbergen, Heusden, Afsné.
varus GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, mém. 32, p. 162
(1921).
Destelbergen, Heusden.
major GOETGH. — *loc. cit.*, p. 63 (1921).
Destelbergen.
atriforceps GOETGH. — *Faune de France*, 18, p. 84 (1928).
Houyet.

cinctellus GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Belg.*, mém. 31, p. 161 (1921).

Bellem.

Mauricii KRUSEM. nov. nom (KRUSEM).

Syn. *littorellus* GOETGH. — *Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXI, p. 214 (1931).

La Panne.

monochromus V. D. W. (KRUSEM) nec GOETGH. — *Tijdsch. v. Ent.*, XVII, p. 129 (1874).

Syn. *unicolor* V. D. W.; *claviforceps* EDW.

Bellem, Overmeire.

pseudotener GOETGH. — *Ann. Biol. lac*, XI, p. 38 (1922).

Houyet, Virton.

GROUPE *Harnischia* KIEFF.

viridulus FAB. — *Syst. Ant.*, 44, 33 (1805).

Gand, Destelbergen.

virescens MEIG. — *Syst. Besch.*, I, 31, 23 (1818).

Gand, Genck.

pseudosimplex GOETGH. — *Ann. Biol. lac*, XII, p. 116 (1923).

Postel (SEVERIN).

fuscimanus KIEFF. — *Bull. Soc. Hist. nat. Moselle*, XXIX, p. 64 (1921).

Syn. *simplex* GOETGH.

Falaën, Sy.

overmeirensis GOETGH. — *Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXII, p. 129 (1932).

Syn. *virescens* EDW. nec MEIG.

Overmeire. (Probablement variété foncée de *Cr. Edwardsi* KRUSEM.)

mutilus GOETGH. — *Bull. Soc. Ent. Belg.*, III, p. 674 (1921).

Overmeire.

Tribu des *Tanytarsini*

GENRE *KIEFFERULUS* GOETGHEBUER

tenaipediformis GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. nat. Belg.*, mém. 31, p. 106 (1921).

Destelbergen, Andenne.

GENRE *PENTAPEDILUM* KIEFFER

SOUS-GENRE *PHAENOPSECTRA* KIEFF.

punctipes WIED. — *Zool. Mag.*, I, 1, 65 nec V. D. W. (1817).

Syn. *abdominalis* STAEG.; *semiviridis* GOETGH.

Gand, Destelbergen, Heusden.

flavipes MEIG. nec KIEFF. — *Syst. Besch.*, I, 50, 67 (1878).

Syn. *albipes* ZETT.; *tenellus* ZETT.; *albiforceps* GOETGH.; *leucolabis* KIEFF.

Gand, Overmeire, Bellem, Hockai.

SOUS-GENRE *PENTAPEDILUM* s. str.

sordens V. D. W. — *Tijdsch. v. Ent.*, XVII, 141, 7 (1873).

Syn. *riparium* KIEFF.

uncinatum GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. nat. Belg.*, mém. 31, p. 110 (1921).

Melle, Vinderhoute, Heusden.

tritum WALK. — *Ins. Brit.*, III, 162, 39 (1856).

Syn. ? *stratiotale* KIEFF.; *longiseta* KIEFF.

La Panne, Heusden, Destelbergen.

GENRE *ZAVRELIA* KIEFF.

nigritula GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. nat. Belg.*, mém. 31, p. 131 (1921).

Heusden.

GENRE *MICROPSECTRA* KIEFF.

fusca MEIG. — *Syst. Besch.*, I, 52, 73 (1818).

Syn. *Tonnoiri* GOETGH.

Postel (SEVERIN).

praecox MEIG. (sec. typ.). — *Syst. Besch.*, I, 49, 64 (1818).

Syn. *brunnipes* ZETT.; *appositus*, *intrudens*, *nactus*, *notescens*, *occipiens*, *affectus* WALK.; *gmundensis* EGG.; *inermipes* KIEFF.; *hemipsilus* KIEFF.; *insularis* KIEFF.; *tetratomus* KIEFF.; etc.

La Panne, Gand, Melle, Eecloo, Bullange, Chiny.

globulifera GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. nat. Belg.*, mém. 31, p. 123 (1921).

Melle, Falaën.

subviridis GOETGH. — *Loc. cit.*, p. 124 (1921).

Virton.

atrofasciata KIEFF. — *Bull. Soc. Hist. nat. Metz*, p. 59 (1911).

Syn. *sexannulata* GOETGH.

Melle, Postel, Virton, Hockai.

retusa GOETGH. — *Loc. cit.*, p. 128 (1921).

Heusden.

recurvata GOETGH. — *Faune de France*, 18, p. 111 (1928).

Hockai.

bidentata GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. nat. Belg.*, mém. 31, p. 172 (1921).

Mont-Saint-Guibert, Bullange, Francorchamps, Virton.

GENRE *LUNDSTROEMIA* KIEFFER

pseudopraecox GOETGH. (sub nom. *praecox*). — *Loc. cit.*, p. 114 (1921).

roseiventris KIEFF. — *Bull. Soc. Hist. nat. Metz*, p. 50 (1909).

Hockai.

GENRE *PHAENOPELMA* KIEFF.

intricata GOETGH. — *Loc. cit.*, p. 121 (1921).

La Panne; Genval (TONNOIR).

GENRE *STEMPELLINA* BOUSE

saluum GOETGH. — *Loc. cit.*, p. 115 (1921).

Destelbergen, Heusden.

paludosa GOETGH. — *Ann. d. Naturhist. Mus. in Wien*, p. 114 (1931).

Heusden.

minor EDW. — *Trans. of the Ent. Soc. of Lond.*, p. 420 (1929).

Chiny: rocher du Hat, sur la Semois.

GENRE *TANYTARSUS* V. D. WULP.

A. — Pulvilles bien développés.

SOUS-GENRE *CALOPSECTRA* KIEFF.

gregarius KIEFF. — *Bull. Soc. Hist. nat. Metz*, p. 50 (1909).

Syn. *lobatifrons* KIEFF.; ? *bathophilus* KIEFF.

B. — Pulvilles nuls ou très petits.

SOUS-GENRE *RHEOTANYTARSUS* BAUSE

Articles terminaux de l'hypopyge avec l'extrémité étroite et pointue.

photophilus GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. nat. Belg.*, mém. 31, p. 116 (1921).

Gand.

SOUS-GENRE *TANYTARSUS* s. str.

Ailes pubescentes au moins dans leur 2^e moitié, toujours de nombreux macrotriches dans la cellule Cu₁.

Groupe I. — Tibias postérieurs à peignes à peine séparés, munis de courts éperons.

tenuis MEIG. — *Syst. Besch.*, VI, 255, 112 (1830).

Syn. *affinis* WALK.; *perlevis* WALK.

Destelbergen.

similis GOETGH. — *Faune de France*, 18, p. 139 (1928).

Heusden, Overmeire.

laetipes ZETT. — *Dipt. Scand.*, IX, 3587, 123 (1850).

Syn. *punctipes* GOETGH. nec WIED.

Destelbergen, Heusden, Overmeire.

tenullulus GOETGH. — *Loc. cit.*, p. 122 (1921).

Vinderhoute.

Groupe II. — Tibias postérieurs à peignes bien séparés.

holochlorus EDW. — *Trans. of the Ent. Soc. of Lond.*, p. 114 (1929).

Overmeire.

ejuncidus WALK. — *Ins. Brit.*, III, 155, 6 (1856).

Syn. *Brayi* GOETGH.

Virton, Postel.

eminulus WALK. — *Ins. brit.*, III, 196, 9 (1856).

Genck.

arduennensis GOETGH. — *Ann. biol. lac.*, XI, p. 43 (1922).

Syn. *Gotchi* GOETGH.

Virton.

verruculosus GOETGH. — *Loc. cit.*, XI, p. 45 (1922).

Falaën.

Lestagei GOETGH. — *Ann. Biol. lac.*, XI, p. 47 (1922).

Overmeire, Bellem; Postel (SÉVERIN).

- curticornis* KIEFF. — *Bull. Soc. Hist. nat. Metz*, p. 53 (1911).
 Sy, Chiny.
- chinyensis* GOETGH. — *Loc. cit.*, LXXIV, p. 292 (1934).
 Chiny.
- inaequalis* GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. nat. Brux.*, mém. 31, p. 118 (1921).
 Overmeire.
- signatus* V. D. W. — *Tijdsch. f. Ent.*, II, 169 (1873).
 Syn. *bicinctus* GOETGH.
 Overmeire, Chiny.
- lactescens* EDW. — *Trans. of the Ent. Soc. of Lond.*, p. 416 (1929).
 Heusden.
- pallidicornis* WALK. — *Ins. brit.*, III, 169, 71 (1856).
 Syn. *subaequalis* GOETGH.
 Destelbergen.
- junci* MEIG. — *Syst. Besch.*, I, 50, 68 (1918).
 Syn. *semivillosus* GOETGH.
 Gand, Deslelbergen, Heusden, Virton.
- heusdensis* GOETGH. — *Ann. Biol. lac.*, XII, p. 118 (1923).
 Heusden, Destelbergen.
- cornutus* GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. nat. Belg.*, mém. 31, p. 113 (1921).
 Heide.
- nigrofasciatus* GOETGH. — *Loc. cit.*, p. 125 (1921).
 Gand, La Panne, Destelbergen.
- Parenti* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXI, p. 214 (1931).
 La Panne.
- paschalis* GOETGH. — *Loc. cit.*, LXXIII, p. 212 (1933).
 La Panne.
- securifer* GOETGH. — *Loc. cit.*, LXXIV, p. 293 (1934).
 Chiny.
- curtistylus* GOETGH. — *Mém. Mus. Hist. nat. Belg.*, Mém. 31, p. 122 (1921).
 Forêt de Soignes.
- bipectinatus* GOETGH. — *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.*, LXXII, p. 212 (1933).
 Hasselt (DEBAUCHE et KOCH).
- triangularis* GOETGH. — *Faune de France*, XVIII, p. 137 (1928).
 Heusden.

SOUS-GENRE *GYMNOTANYTARSUS* nov.

Ailes glabres sauf quelques macrotriches dans R_5 et M_1 ; app. 2 de l'hypopyge plié à angle, app. 2a en queue de vache; L. R. = 1,2.
sylvaticus V. D. WULP. — *Tijdsch. v. Ent.*, II, 168, 9.

SOUS-GENRE *CLADOTANYTARSUS* KIEFF.

Ailes glabres, excepté à la pointe et souvent quelques macrotriches rares dans Cu_1 ; app. 2a à poils rameux; L. R. = 1,7 au moins.

mancus WALK. — *Ins. brit.*, III, 161, 36 (1856).

Syn. *modicellus* WALK.; *rufovittatus* GOETGH.

La Panne, Overmeire, Sy.

var. *nigrovittatus* GOETGH.

La Panne, Overmeire.

van der Wulpi EDW. — *Trans. of the Ent. Soc. of Lond.*, p. 418 (1929).

Chiny.