

— M. le Président signale qu'il s'est fait notre interprète pour présenter à M. Paul PELSENEER, Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale de Belgique, les félicitations de notre Société à l'occasion de son élection, le 21 novembre 1934, en qualité de Président d'honneur de la *Société Royale Zoologique de Belgique*.

— Le *Museo Argentino de Ciencias Naturales*, à Buenos-Ayres, nous fait part du décès de son ancien Directeur, M. le Prof. Dr Angel GALLARDO. (Condoléances).

— La *Fondation pour favoriser l'étude scientifique des Parcs nationaux du Congo belge* nous envoie un exemplaire de ses statuts.

— M. VAN DEN BRUEL nous communique sa nouvelle adresse : 102, rue Jules Besme, à Koekelberg.

Bibliothèque. — L'Indian Office nous a fait don de *The Fauna of British India, Odonata*, vol. II (FRASER). Des tirés à part ont également été reçus de MM. FLEUTIAUX (1), HUSTACHE (8), LESTAGE (1), D'ORCHYMONT (1), TURATI (6) et VAN DEN BRUEL (1). (Remerciements).

Travaux pour les Bulletin et Annales. — L'assemblée décide l'impression des travaux contenus dans le présent fascicule.

Communications. — M. PASSAURO montre deux exemplaires de *Rhinomias Eldae* PASSAURO (Coléopt.), espèce qu'il décrit plus loin.

— Revenant sur une communication de M. VAN DEN BRUEL, faite à la séance précédente, M. DERENNE nous écrit qu'*Anarsia lineatella* ZELLER (Lépid.) a déjà été signalée de Belgique et se trouve reprise dans les Catalogues LAMBILLION (1900) et DE CROMBRUGGHE (1906).

— M. THOMAS exhibe à nouveau le *Ctenus* sp. qu'il conserve à l'état vivant depuis plusieurs mois. Il donne quelques explications sur la manière dont il soigne son Araignée. En ce moment où les Mouches sont rares, c'est à l'aide d'asticots et de vers de farine qu'il la nourrit.

— M. CRÉVECEUR signale la capture d'*Aphidius ephippium* HAL. (Hym.) Belg. nov. sp. 1 ♀, Forêt de Soignes, 17-IX-1933 (détermination confirmée par M. QUILIS PEREZ).

— La séance est levée à 18 h.

Une nouvelle espèce de *Rhinomias*

PAR

EDDY PASSAURO

Rhinomias Eldae n. sp.

Dans la table de FORMANEK sur les *Rhinomias* publiée dans le *Münchener Koleopterologische Zeitschrift*, Band II, 1904-1906, cette espèce se place tout près de *forticornis* par la même distinction d'avoir chez le mâle une épine aux trochanters des pattes antérieures et chez les femelles une petite bosse, mais elle diffère nettement par la forme du pénis (fig. 1 et 2) qui, vers le milieu de la longueur, se resserre rapidement. Les bords supérieurs de la partie inférieure du canal sont recourbés presque jusqu'à la pointe aiguë. Le corps est plus étroit et plus allongé. Les yeux sont beaucoup plus petits que chez le *forticornis* et la largeur des tempes est supérieure au diamètre de l'œil. Le rostre est plus court. La largeur du prothorax se trouve exactement au milieu, au lieu de celle du *forticornis* qui est déplacée en arrière. Le bord antérieur du prothorax a la même largeur que le postérieur contre les élytres. Dans le *forticornis*, le bord postérieur est plus large. La structure dans les interstices des élytres est ruguleuse et les poils élevés sont plus minces et plus nombreux, et de plus la ligne continue des poils est souvent doublée.

Longueur : 3-3,2 mm.

Castellnuovo, Dalmatie.

Deux exemplaires sont déposés au Musée d'Histoire naturelle, à Bruxelles, et deux au Musée "Pietro Rossi", à Duino, Italie.

Fig. 1 et 2