

Liste de Coléoptères intéressants

PAR

G. VREURICK ET F. GUILLEAUME

- Atheta complana* MAN. — Tervueren, 16-4-26 (VREURICK); Wellin, 7-34 (F. GUILLEAUME). **Belg. nov. sp. ?**
- Atheta tomlini* JOY. — Nieuport, 16 9-29 (VREURICK). Cette détermination devrait être corroborée par l'examen de nouvelles captures. Cette espèce a été recueillie en un seul exemplaire en Hollande. **Belg. nov. sp. ?**
- Atheta mallens* JOY. — Forest, 7-3-29 (VREURICK). N'a pas encore été recueillie en Hollande. **Belg. nov. sp.**
- Atheta nigripes* THS. — Wellin, 9-33 (F. GUILLEAUME).
- Atheta aquatica* THS. — Jette, 24-8-21 (VREURICK).
- Atheta oblonga* ER. — Uccle, 15-3-33 (VREURICK).
- Atheta gagatina* BAUD. — Wellin, 6-33 (VREURICK).
- Atheta laticeps* THS. — Genval (BONDROIT). **Belg. nov. sp.**
- Leptusa angusta* AUBÉ. — Groenendael, 1-8-19 (BONDROIT).
- Aleochara moerens* GYLL. — Rhonet, 19-10-09 (VREURICK).
- Aleochara haemoptera* KR. — Jette, 7-5-24 (VREURICK).
- Aleochara sanguinea* LIN. — Jauchelette, 19/26-6-27 (G. FAGEL).
- Catops grandicollis* ER. — Wellin, 9-32 (VREURICK).
- Maltinus bilineatus* KIESW. — Wellin, 7-34 (F. GUILLEAUME). **Belg. nov. sp.** Cet insecte est exclusivement connu de France méridionale et Jura (Dôle).

Ces déterminations ont été faites ou confirmées par MM. les Docteurs VANDERWIEL d'Amsterdam et WUSTHOFF d'Aix-la-Chapelle. Nous les en remercions bien sincèrement.

Eucnemididae et *Elateridae* nouveaux

PAR

E. FLEUTIAUX

EUCNEMIDIDAE

Melanocoleus BONVOULOIR, 1871-1872

Génotype : *M. grossus* BONVOULOIR

M. imuganus n. sp. — 10 1/2 à 12 mm. Allongé, atténué; noir opaque, moins foncé sur le dos des élytres, côtés du pronotum et base des élytres roux; pubescence rousse sur la tête, de la couleur du fond sur le reste du corps. Tête convexe, finement et densément ponctuée; carène interoculaire interrompue au milieu; épistome plus étroit à la base que l'espace susantennaire. Antennes filiformes, dépassant peu les angles postérieurs du pronotum, rousses, noires à la base. Pronotum plus long que large, peu rétréci en avant, convexe, déprimé en arrière; noir au milieu largement roux sur les côtés; finement, uniformément et densément ponctué. Elytres très atténués de la base au sommet, finement ponctués, non striés, à peine distinctement en arrière. Dessous finement ponctué; pubescence rousse. Prosternum roux, bordé de noir en arrière, pointe prosternale et reste du corps noirs. Episternes métathoraciques parallèles. Epimères visibles. Hanches postérieures anguleuses, à peu près aussi larges en dehors que les épisternes. Dernier arceau ventral tronqué. Pattes grêles, noirâtres; tarses postérieurs aussi longs que le tibia; griffes dentées.

Luzon, Imugan. Ma collection.

Aspect d'un *Fornax*. Beaucoup plus étroit que *M. grossus* BONVOULOIR; pronotum plus long, nullement globuleux; élytres moins convexes, très atténuées, non striées; pointe prosternale sur le même plan que le prosternum; hanches postérieures plus nettement anguleuses; dernier arceau ventral tronqué.