

Captures intéressantes

PAR
G. VREURICK

COLÉOPTÈRES

- Harpalus politus* DEJ. — La Panne, 29-7-31, **Belg. nov. sp.** (VREURICK).
Myrmedonia funesta GRAV. — Wellin, 8-34 (F. GUILLEAUME).
Myrmedonia humeralis GRAV. — Wellin, 8-34 (F. GUILLEAUME).
Myrmedonia laticollis MARK. — Wellin, 8-34 (F. GUILLEAUME).
Platynus ericeti PANZ. — Sutendael, 25-8-33 et Hautes-Fagnes, 9-7-33 (DEPRÉ).
Cychramus quadripunctatus HERBST. — Chiny, 23-7-34 (Dr GOET-GHEBUER).
Trox scaber LIN. — Forest, 4-34, en nombre (VREURICK).
Serica brunnea LIN. — T. C. autour d'une ampoule électrique, Martinive, 8-7-34, 23 h. (P. MARÉCHAL).
Necrobia rufipes DEG. — 5-10-33 (P. MARÉCHAL).
Leptura 4-fasciata LIN. — Barvaux s/O., 6-8-33 (P. MARÉCHAL).
Cassida hemisphaerica HERBST. — Hony, 29-8-33 (P. MARÉCHAL).
Magdalis asphaltina BOH. — Florallée, 12-6-32 (DEPRÉ).
Gymnetron thapsicola GERM. — Marche, 25-5-31, **Belg. nov. sp.** (DEPRÉ).
Balaninus venosus GRAV. — Barvaux s/O., 6-8-33 (P. MARÉCHAL).

HÉMIPTÈRES

- Berytus minor* H. S. — Wellin, 8-34 (F. GUILLEAUME).
Derephysia foliacea FALL. — 8-34 (F. GUILLEAUME).

Tableau des *Abacetus* du Congo belge

(COL. CARABIDAE)

PAR
L. BURGEON

TSCHITSCHÉRINE a donné en 1898, dans les *Hor. Soc. Ent. Ross.*, p. 419, un tableau des espèces congolaises du genre *Abacetus* DEJEAN figurant dans les collections du Musée de Bruxelles. Je crois utile de faire à nouveau ce tableau, le nombre d'espèces ramenées du Congo ayant doublé depuis : j'en cite 40 au lieu des 23 énumérées par TSCHITSCHÉRINE dont deux ne sont que des variantes ; deux autres, provenant du Congo français, n'ont pas été retrouvées dans notre colonie.

Les *Abacetus* font partie de la tribu des *Pterostichini* ; ils se différencient aisément des autres genres de la tribu par leurs antennes excentrées, l'article deux étant inséré hors de l'axe du premier vers l'arrière ; le menton est faiblement bisinué ; le pronotum est trisillonné, portant un long et profond sillon de chaque côté de l'axe à la base ; les élytres n'ont pas de striole juxtasculaire. Il y a souvent un appareil stridulatoire comprenant des grains diversement disposés sur le prosternum et des rides ou saillies à la face avant des fémurs antérieurs.

1. — Les quatre tarses postérieurs ayant leurs articles plurisillonnés en dessus, les cinquièmes articles non sétulés en dessous.

- 1 (8). Éperon des tibias antérieurs tricuspidé. Métépisternes plus longs que larges.
 2 (5). Corps pubescent, stries des élytres crénelées.
 3 (4). Antennes et pattes foncées. 11 à 12,5 mm. 1. **A. pubescens** DEJ.
 4 (3). Antennes et tibias roux ; ponctuation du dessus plus fine ; pronotum plus rétréci en arrière, plus petit, 10 mm. var. **Tschoffeni** TSCH.