

Description d'une espèce nouvelle paléarctique

(RHINOPHORINAE)

PAR LE

D^R J. VILLENEUVE DE JANTI

Euplesina Ringdahli n. sp. ♂, ♀.

Taille et coloration d'*E. insularis* VILLEN. auquel il ressemble encore par l'absence de soies marginales médianes au tergite abdominal I et la présence d'une paire de petites acrosticales présuturales; la longueur de la nervure transverse postérieure est voisine de sa distance à la petite transverse.

Mais la tête est bien distincte: hormis la soie préverticale et quelques cils minuscules épars vers la partie antérieure des orbites, celles-ci n'ont aucune soie orbitaire externe chez le ♂; la ♀ n'a qu'une soie orbitaire, laquelle est proclive. Les palpes sont d'un roux sale et terne. Les antennes noires sont roussâtres à la base et même, chez la ♀, sur une partie du 3^e article.

L'aile brunâtre à sa base l'est davantage au long du bord antérieur, avec un court éclaircissement après la cellule médiastinale, laquelle est toujours foncée. La transverse postérieure, qui est perpendiculaire chez *E. insularis*, est ici plus ou moins oblique. Les cuillerons sont blanchâtres; l'inférieur a son bord externe largement rembruni. Balanciers à massue noire. L'aile de la ♀ est un peu éclaircie aussi au-devant de la cellule médiastinale.

0 soie verticale externe, 3 dc., st. = 1 + 1 robustes. 1 long cil unique, parfois remplacé par 2-3 cils courts, au nœud de la nervure III.

Taille: 4-5 mm.

Un ♂ et une ♀ pris, le 27 juillet 1933, sur des fleurs d'Angélique, à Skärålid (Suède méridionale), par M. O. RINGDAHL qui m'en a fait don. Je suis heureux de lui dédier cette espèce en témoignage de ma gratitude et aussi de mon admiration pour ses savants travaux sur les *Anthomyidae*.

Descriptions de Myodaires supérieurs africains

(CALLIPHORINAE)

PAR LE

D^R J. VILLENEUVE DE JANTI

1. *Gymnadichosia novella* n. sp. ♀.

Yeux nus; orbites peu larges, comme le péristome, obscures ou gris blanc suivant la lumière, ayant une forte et très longue soie arbitraire proclive accompagnée d'une soie postérieure, courte et presque pili-forme; soies ocellaires courtes et graciles. Face blanche; antennes jaunes (3^e article = 3 — 4 fois le 2^e) avec chête d'un jaune sale longuement cilié, devenant nu avant le tiers distal; palpes jaunes. Tout le corps d'un jaune un peu brillant, le thorax sans linéation, le scutellum à reflet sombre, l'abdomen allongé, cylindrique marqué d'une macule noire médiane et triangulaire sur le tergite II, plus grande sur le tergite III et envahissant largement le tergite sur le dernier segment; enfin, le prolongement conique apical (comme chez *Paurothrix*) entièrement noir. Pattes jaunes à tarses noirs. Ailes longues, ocracées, à nervation rappelant le genre *Dexopollenia* et à 1^{re} cellule postérieure ouverte à l'apex; transverse postérieure submédiane, à peine sinueuse; cuillerons plus ocracés, le thoracique nu et non régressif; balanciers jaune pâle.

Chétotaxie: thorax ayant 3 dc.; st. = 2 + 1; 3^e paire acrosticale présuturale manquant et les 2 dernières paires préscutellaires présentes; dernière posthumérale développée. Scutellum ayant 3 longues soies marginales subégales dont les apicales sont croisées. Abdomen ayant le tergite I nu, les tergites II et III portant une paire de soies discales et le tergite IV une rangée complète mais avec la paire médiane plus avancée. Ailes à épine costale moyenne; quelques petits cils seulement au nœud de la nervure III. Tibias II ayant une forte soie antéro-dorsale unique et une ventrale pareille.

Taille: 8 mm.

Une ♀ provenant du Mont Mlanje, 26-VIII-1913 (S. A. NEAVE) déposée au British Museum.