

Communications. — M. BURGEON montre le type de *Parachlaenius biarticulatus* décrit plus loin, ainsi que des exemplaires de *P. trochantericus* KLB. et *P. ruandanus* BURG. (Coleopt.).

— M. GOETGHEBUER fait circuler un exemplaire d'*Hypoderma diana* BRAUER (Dipt.), **Belg. nov. sp.** capturé par M. MARÉCHAL à La Gileppe, le 21-V-34. Cette espèce est parasite du Chevreuil et du Cerf.

A ce propos, M. MAYNÉ rapporte qu'au cours de ces dernières années, de nombreux Chevreuils auraient été tués par une myiase produite par *Oestrus ovis* L.

— M. COLLART signale l'apparition particulièrement précoce cette année de *Melolontha vulgaris* L. dont 2 exemplaires ont été observés, fin février, dans les environs de Liège.

— M. THOMAS extrait d'un ouvrage récent un passage relatif à une nouvelle définition de l'espèce, fondée sur l'isochronie du développement. Cette définition, de même que les vues de l'auteur au sujet de la nomenclature tri- ou quadriminomiale, donne lieu à une discussion à laquelle prennent part plusieurs membres.

— M. LAMEERE signale que, selon notre collègue M. LERUTH, les considérations qu'il a émises il y a quelque temps (1934, p. 327) à propos de *Machilis polypoda* L. sont aussi valables par *Campodea staphylinus* WESTW. (Thysanoures). Des recherches sur ces insectes délicats seraient vivement à souhaiter.

— En l'agrémentant de projections, M. A. BALL fait une intéressante relation de son dernier voyage au Maroc. Notre collègue montre ensuite des exemplaires du curieux *Mesopsocus dromedarius* BALL, espèce nouvelle découverte au cours de cette randonnée, ainsi qu'un spécimen d'*Apus cancriformis* SCHÄFF. (Crustacés, Branchiopodes).

— La séance est levée à 18 h. 40.

Un nouveau Chlaenien congolais

PAR

L. BURGEON

Parachlaenius biarticulatus n. sp.

♂. — 20 mm.

Diffère des autres espèces connues par la présence de deux articles dilatés aux tarses antérieurs du mâle, caractère extraordinaire chez les *Chlaeniini*; le pronotum est d'une forme spéciale.

Tête noire, pronotum noir verdâtre, élytres d'un bleu-vert métallique sombre; appendices d'un brun rougeâtre ainsi que presque tout le dessous; pilosité semblable à celle des autres espèces.

Tête large, les yeux écartés et très saillants, plus rétrécie en arrière que chez *ruandanus* BURG., sa surface aplatie, portant deux dépressions longitudinales sur le front et fortement déprimée transversalement après les yeux; labre portant dix pores sétigères à l'avant, qui est sinué comme chez *ruandanus*; articles des palpes ni noueux, ni élargis à leur extrémité, le dernier des maxillaires plus long que le précédent; antennes longues avec l'article 3 égalant le double de la longueur du 4.

Pronotum à peine rétréci en arrière, ses côtés presque parallèles à l'axe du corps jusqu'au milieu, puis notablement rétrécis en courbe vers l'avant; angles antérieurs aigus, s'appliquant contre le cou, les postérieurs droits; rebord latéral plus étroitement explané que chez *trochantericus* KLB. et *ruandanus*; dépression transversale antérieure plus marquée.

Elytres bombés, étroits, plus longs que chez *trochantericus*; intervalles à ponctuation piligère abondante.

Fémurs ayant en dessous deux arêtes longitudinales denticulées (section *Parachlaenius* s. str.); tibias intermédiaires très courbés, avec une frange de poils au côté interne; tibias postérieurs presque droits,

mais évasés au côté externe à l'extrémité; trochanters postérieurs terminés en pointe mousse, sans les épines des *Euchlaenius*; tarses antérieurs ayant les deux premiers articles très dilatés, portant une semelle de poils, le premier en large triangle, le second en rectangle long, le troisième triangulaire, aussi étroit que le 4 et sans semelle de poils.

Un mâle récemment reçu au Musée du Congo, provenant de Kipushi-Katanga (I-32; SEYDEL).

P. ruandanus m. est une espèce du groupe *Euchlaenius*, ressemblant à *trochantericus* KLB., de couleur plus vive, de taille moindre, de forme moins robuste et qui s'en distingue de suite par la présence de six pores sétigères à l'avant du labre au lieu d'une douzaine; sa description détaillée paraîtra sous peu.

SECTION D'ENTOMOLOGIE APPLIQUÉE

Réunion mensuelle du 16 février 1935

Présidence de M. R. MAYNÉ

— La séance est ouverte à 17 h. 10.

Excusés: MM. A. BALL, CRÈVECŒUR, D'ORCHYMONT, PYNAERT et SCHEERLINCK.

— La Commission de la Section d'Entomologie appliquée doit désigner parmi ses membres un Président et un Secrétaire. M. MAYNÉ propose d'élire M. PYNAERT Président et M. VAN DEN BRUEL Secrétaire. Approuvé.

En l'absence de M. PYNAERT, qui est souffrant, M. MAYNÉ prend la présidence de la séance.

— M. MAYNÉ donne lecture du "Programme de la Section d'Entomologie appliquée" et le commente. Il propose de donner aux séances trois orientations principales:

- 1° exposition mensuelle des actualités entomologiques;
- 2° échanges de vue au sujet des grandes invasions entomologiques de Belgique et du Congo belge;
- 3° l'étude des mesures phytosanitaires internationales.

— M. LESTAGE souligne l'intérêt des réunions de la Section d'Entomologie appliquée qui sont susceptibles de créer des relations et des collaborations plus étroites avec les entomologistes phytopathologistes étrangers. M. MAYNÉ appuie cette observation.

— M. MAYNÉ annonce que trois Journées nationales pour la Défense des Végétaux se tiendront soit en juillet, soit en septembre à l'Albertain de l'Exposition de Bruxelles. Au cours de ces Journées