

Bibliothèque. — M. GOETGHEBUER fait don à la bibliothèque d'une soixantaine de tirés à part accompagnés d'une liste récapitulative. (*Remerciements*).

Collections. — Mme Olga SCALON, d'Irkoutsk, vient de nous faire parvenir une très intéressante collection d'une quarantaine d'espèces de Thysanoptères de la Sibérie. Ces spécimens, soigneusement montés en préparations microscopiques, sont, pour la plupart, cités dans les deux travaux publiés ici même par notre Collègue, au début de cette année. Une lettre de remerciements a été adressée à la donatrice.

Travaux pour les Bulletin et Annales. — L'assemblée décide l'impression d'une note de M. BURGEON. Un travail de M. LERUTH paraîtra dans le fascicule VII.

Communications. — M. CRÈVECEUR montre un lot d'Arthropodes, non encore déterminés, provenant de l'île de Pâques. Ce matériel a été obligeamment recueilli par un de ses amis, M. Emile VAN LIL, Lieutenant au long cours, chef d'équipe à bord du "Mercator".

— M. BURGEON fait circuler un exemplaire de *Scatophaga sterco-raria* L. (Dipt.) dont les ailes offrent une nervure transversale entre les deux rameaux du secteur de la radiale.

— M. MAYNÉ présente les Coléoptères ci-dessous :

Melasis buprestoïdes L., capturé en grand nombre dans du chêne mort, à Vonèche, le 21-V-35.

Callidium alni L., Gembloux, 30-V-34.

Orsodacne Cerasi L., et de nombreuses variétés à Han s/ Lesse, le 20-V-35.

Carabus auroniensis F. var. *Putzeysi* MORS., Forêt de Soignes, 27-V-35.

Platycerus caraboides HERBST. var. *rufipes*, Suxy, 21-V-35.

— M. WARLAND signale la capture à Mazy, le 27-V-35, du rare *Caenoptera minor* L. (Col.).

— Enfin M. COLLART annonce la découverte, par M. GHESQUIÈRE, au Congo belge, d'une nouvelle espèce de *Microsania* (Dipt.) qu'il se propose de décrire incessamment sous le nom de *M. Ghesquierei*. L'insecte a été capturé, lors d'un incendie de forêt, sur des cendres dont la température n'était pas inférieure à 50°.

— La séance est levée à 18 heures 10.

Notes synonymiques SUR LES *HARPALINI* AFRICAINS

PAR

L. BURGEON

Diatypus Dorhni MURR.

D'après les types ♀ du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, du Zoologisches Museum der Universität de Berlin et les spécimens ♂ qui les accompagnent, le genre *Diatypus* est voisin d'*Anisodactylus* et nullement de *Daptus*, les tarses des ♂ étant dilatés comme dans le premier genre et ayant la même semelle pileuse continue. Le même insecte figure en outre dans les deux collections, ainsi qu'au Musée du Congo, sous le nom, manifestement erroné, de *Anoplogenus cyanesens* THOMS. N'ayant pas vu le type de THOMSON, je ne suis pas certain de la synonymie qui est vraisemblable, rien dans la description ne l'empêchant.

Anisodactylus picinus CHAUD. appartient vraisemblablement au même genre, d'après un spécimen donné par M. ALLUAUD.

Dichirotrichus Kolbei KUNTZ.

Le type ♀ unique m'a été communiqué par le Z. M. B. Il y a une striole aux élytres ; chez des ♂ très voisins du Congo, il n'y a pas de fossette feutrée à la base du ventre, les articles élargis des tarses ont deux files d'écaillés. C'est un *Hyparpalus* voisin d'*audens* PÉR., de *Casperi* KUNTZ., ayant comme eux, outre la soie normale vers le milieu du pronotum, deux ou trois petites soies aux angles antérieurs et une aux postérieurs.

Anisodactylus moestus CHAUD.

D'après le type ♂ du M. B., n'est pas congénérique avec les *Anisodactylus* paléarctiques : les pièces buccales sont différentes, les tarses pileux en dessus ; le pronotum porte deux soies de chaque côté, l'une

au quart avant, l'autre au quart arrière. Il se rapproche plutôt du genre oriental *Gnathaphanus*, sauf que les paraglosses ne se réunissent pas au devant de la languette, disposition qu'on trouve à peu près chez *A. incrassatus* BOH. *Ochropus* DEJ., *limbatus* QUED, *piceus* DEJ., etc., sont du même type que *moestus*, ainsi que *Selenophorus aeruginosus* DEJ., et que

Anisodactylus planicollis PUTZ.

Enuméré au Catalogue de CSIKI parmi les espèces européennes ; il a été décrit de Duque de Bragança, une localité de l'Angola, proche de Malange.

Anisodactylus gracilis HAR.

D'après un exemplaire ♂ du Z. M. B. (non typique), ne serait pas un *Anisodactylus*, mais un *Harpalina*.

Harpalus latiusculus KLB.

Le type du Z. M. B. est une femelle ; ce n'est pas un *Harpalus*, mais une race occidentale, très proche, de *Diatypus* (sub. *Anisodactylus*) *picinus* CHAUD.

Bradybaenus DEJ.

Les auteurs ne parlent pas des nombreux pores à longues soies qui se trouvent aux segments ventraux de ces insectes ; on retrouve ces pores chez *Ooidius* CHAUD. et *Pseudoselenophorus* PÉR.

Pseudoselenophorus imitator PÉR.

J'ai vu la série du Z. M. B. Les spécimens de Windhoek (HELLER) sont distincts des autres et appartiennent au genre *Omostropus* PÉR., qui ne possède, aux segments ventraux, que les pores normaux.

Pangus senegalensis DEJ.

A été rattaché par CSIKI au genre indien *Xenodus* ANDR. Il faudrait y ajouter *sudanicus* ALL. (non SJÖST. comme le dit CSIKI), *Selenophorus exaratus* DEJ., *corvinus* KL. *Approximatus* KLB. et *dilatatus* KL. dont j'ai vu les types du Z. M. B. sont, par contre, des *Anisodactylina*.

Harpalidium punctigerum KLB.

Le type unique, une ♀ immature, m'a été communiqué par le Z.

M. B. Le genre de KOLBE est un synonyme d'*Hypolithus* DEJ., nom remplacé par *Hyparpalus* ALL. L'absence relative de dent dans l'échancrure du menton (il y a un épaississement au milieu du bord) n'est pas un caractère générique chez les *Harpalini* et la présence d'une rangée de pores sur les intervalles impairs des élytres est un caractère normal chez les *Hyparpalus*.

Aulacoryssus ALL.

A mon avis le genre d'ALLUAUD n'est qu'une section d'*Hyparpalus*.

Platymetopus DEJ.

Contrairement à ce que dit ANDREWES, les *Platymetopus* ont une rangée de points sur les intervalles impairs des élytres, quoique beaucoup plus petits que chez les *Dioryche*.

Dioryche laevigata KUNTZ.

D'après l'examen des types, ce serait un *Amblystomus*, le labre étant très asymétrique, cachant les mandibules, la sculpture et le facies très différents de celui des *Dioryche*.

Hyparpalus ALL.

LACORDAIRE n'en fait qu'une section d'*Harpalus* ; d'après CSIKI, c'est un sous-genre de *Trichotichnus* A. MOR., dont il diffère par les élytres densément ponctués et portant une file de pores sur les intervalles impairs. Le caractère important qui, outre l'absence de pilosité aux paraglosses, sépare cette coupe des *Harpalus* est la présence de deux pores seulement à l'arrière des fémurs postérieurs. J'ai vu cependant une espèce congolaise qui en a fréquemment trois. La ponctuation dense des élytres s'atténue parfois et disparaît chez une espèce congolaise. La pilosité du dessus des tarsi n'est pas un caractère constant non plus. Le dessus du corps est pubescent chez certaines espèces, glabre chez d'autres ; selon BARKER, le ♂ de *H. caffer* BOH. est glabre, tandis que sa ♀ a les élytres pubescents. Il n'y a donc pas lieu de créer un sous-genre pour les espèces glabres. Le nom d'*Harpalidium* KLB. a la priorité sur *Hyparpalus* ALL.